

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Καθηγήτρια ΛΩΡΕΤΤΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ



Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής περιλαμβάνει:

- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



παις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ Λωρέττα Θωμαΐδου

Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παιδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Θηβών & Λεβαδείας, Γουδί, Αθήνα, 11527

Τηλ: 213 2009186, 213 2009198, Φαξ: 213 2009361

www.developunit.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΩΡΕΤΤΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ - ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
μπορούν τώρα έγκαιρα να αναγνωρισθούν

Ενημερωθείτε



παις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ Λωρέττα Θωμαΐδου

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

- > Η συχνότητα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος στην Ελλάδα, από πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, ανέρχεται στα **1 στα 87 παιδιά**.^[1]
- > Αυτό σημαίνει ότι οι Αυτιστικές Διαταραχές δεν είναι σπάνιες. Αντίθετα, είναι πιο συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα, γεγονός που καθιστά τον Αυτισμό **σημαντικό πρόβλημα υγείας**.
- > Την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί ιδιαίτερα ο αριθμός των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, που απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες.
- > Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συχνότητας του προβλήματος, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά προληπτικό έλεγχο για την ανίχνευση αυτιστικών διαταραχών στα παιδιά στην ηλικία των 18-36 μηνών.^[2]

Η **Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής** της κλινικής μας δημιούργησε και στάθμισε μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών αυτιστικού φάσματος για παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών, τη δοκιμασία **παις**^[3],^[4]

^[1] Thomaidis Loretta et al. Autism Spectrum Disorders in Greece: Nationwide Prevalence in 10-11 Year-old Children and Regional Disparities. J Clin Med. 2020 Jul 8;9(7):2163

^[2] Council on Children With Disabilities. Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders Johnson CP, Myers SM; American Academy of Pediatrics. Pediatrics.2007;120 :1183– 1215. Reaffirmed 2010;2014.

^[3] Early screening of autism: Is age a confounding factor when screening for autism? Thomaidis L, Kyprianou M, Choleva A. J Paediatr Child Health. 2015 Oct;51(10):1046.

^[4] Thomaidis L, Choleva A, Kyprianou M. Age-related issues of instruments screening for autism in young children. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016 Dec 5;12:3093-3095.

- > Η δοκιμασία **παις**
Αποτελεί πρότυπη αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος.
- > Η δοκιμασία **παις**
Δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
- > Η δοκιμασία **παις**
Σταθμίστηκε αποκλειστικά σε ελληνικό πληθυσμό.
- > Η δοκιμασία **παις**
Χορηγείται από Παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας, μετά από ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.
- > Η δοκιμασία **παις**
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 4 ετών.
- > Η δοκιμασία **παις**
Ανιχνεύει τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος:
 - Πρώιμα και έγκαιρα
 - Σε παιδιά μικρής ηλικίας (18 έως 48 μηνών).
 - Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο.
 - Είναι φιλική και ευχάριστη για το παιδί.

παις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ Λωρέττα Θωμαΐδου