


Третіс ісорропіес миаң докоу


Се леіо орізонтіо епіпедо үрекеі миа омогеніс докоу AB мήкоус 4м кай үароус 400N. Се миа стигмі на ақро A ти докоу, аскоуме миа катақоруфы дұнама, ми форы үрекс та пано, мәтре F=80N кай паратетроруыме өти ү саніда сунеғізей на үрекеі.



- На үрекеі ү дұнама үрекеі ү аскеі ү епіпедо ү докоу, кайтас ү үрекеі ү роопті үрекс ү кеңтре майдас K ү докоу.
- Пояна ү мегисте үміті F_1 үрекеі ү пәреи ү мәтре ү дұнама ү аутіс, үшіріс ү пайвеи ү докоу ү ісорропеі;
- Метабаллонтац ү мәтре ү дұнама ү аутіс, үшіріс ү анастеконуиме ү докоу, ферновонтац ү ти ү ісорропеі ү миа үея үтесі, үпен үшіматізей ү то орізонтіо епіпедо үшініа θ, үпен үто като үшіма. На үполоғыстес ү мәтре ү дұнама ү F_2, ү сунартилес ү ти үшініа θ.

Апантенс:

- Ни кайтети үнтідрасты ү епіпедо ү ендеи ү профана ү катақоруфы, үнв үпен үни үнвітікі Στ=0, үи кайтес ү симеі, үра үи үи то месон K ү докоу, үмпераінуме өти ү кайтети үнтідрасты ү епіпедо ү ден үскетац ү месон ү докоу, алла ү кепто ү симеі Γ, үзія ү K, ү апостаси x, үпен үто үшіма. Етси үпен ү ти ү ісорропіа ү докоу ү пайронуме:




$$SF = 0 \rightarrow F + N - w = 0 \rightarrow N = mg - F = 400N - 80N = 320N \text{ үи}$$

$$\Sigma t_K = 0 \rightarrow N \cdot x + w \cdot 0 - F \cdot \frac{l}{2} = 0 \quad (1) \xrightarrow{\text{antikatástash}}$$

$$320x = 80 \cdot 2 \rightarrow x = 0,5m \quad \dot{x}$$

$$\tau_{K,N} = 320x = 160Nm$$

- Апен ү ти үзісівше (1) үрекуити өти үсі үзінется ү мәтре ү дұнама ү аскоуменіс F, үсі үзінется ү апостаси x ү форе ү N үпен ү кеңтре майдас K. Алла ү ти үзінется ү сунеғізес ү мәтре ү F, ү кепто ү стигмі ү N үа үтаси ү ақро B ү докоу, үрізма үрекс ү симаіні ү практика өти ү докоу үржетаси ү епаки ү то орізонтіо епіпедо, үнде ү кепто ү ақро B үи үнде үтаси ү архізес ү пеірістреме. Үзініа үпен ү ти ү ісорропіа ү докоу ү пайронуме:




$$\Sigma t_K = 0 \rightarrow N_I \cdot \frac{l}{2} + w \cdot 0 - F_I \cdot \frac{l}{2} = 0 \rightarrow N_I = F_I \quad (2)$$

$$SF = 0 \rightarrow N_1 + F_1 = w \xrightarrow{(2)} 2F_1 = w \rightarrow F_1 = \frac{1}{2}w = 200N$$

iii) Сто схήμα έχουν σημειωθεί οι δυνάμεις που ασκούνται στη δοκό για μια τυχαία γωνία θ , που σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο. Από την ισορροπία της δοκού στην θέση αυτή, θα έχουμε για τις ασκούμενες ροπές:

$$\Sigma\tau_K = 0 \rightarrow N_2 \cdot \frac{\ell}{2} \sigma v n \theta + w \cdot 0 - F_2 \cdot \frac{\ell}{2} \sigma v n \theta = 0 \rightarrow N_2 = F_2 \quad (3)$$



Ενώ αντίστοιχα από την ισορροπία των δυνάμεων θα έχουμε:

$$SF = 0 \rightarrow N_2 + F_2 = w \xrightarrow{(3)} 2F_2 = w \rightarrow F_2 = \frac{1}{2}w = 200N$$

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η δύναμη που απαιτείται για να ισορροπεί η δοκός, είναι ανεξάρτητη της γωνίας θ . Το δε μέτρο της είναι το ίδιο και για $\theta=0^\circ$, όπως υπολογίστηκε στο 2° ερώτημα.

dmargaris@gmail.com