


ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΖΟΥΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

Ιππίας ο Ηλείος (5ος αι. π.Χ.)



Ο **Ιππίας ο Ηλείος** ήταν σοφιστής των χρόνων του [Σωκράτη](#), σύγχρονος του [Πρωταγόρα](#) (5ος π.Χ. αι.). Δίδαξε στην [Αθήνα](#). Έργα του, "Τρωικός λόγος", "*Ολυμπιονικών αναγραφή*" και "*Εθνών ονομασίες*". Σημαντικές πληροφορίες για τον Ιππία παρέχονται από τους διαλόγους του Πλάτωνα "*Ιππίας μείζων*" και "*Ιππίας ελάσσων*". Η αυθεντικότητα του δεύτερου έργου αμφισβητείται.


Ο Ιππίας ασχολήθηκε επίσης με τα μαθηματικά. Ο [Πρόκλος](#) αναφέρει στα "Σχόλια στο 1ο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη" ότι ο Ιππίας ασχολήθηκε με τη Γεωμετρία και δοξάστηκε από αυτή.

Στον Ιππία αποδίδεται η λύση της διαίρεσης μιας γωνίας σε αυθαίρετο αριθμό ίσων μεταξύ τους γωνιών. Το γενικό αυτό πρόβλημα έχει τη ρίζα του σε ένα πιο συγκεκριμένο, αυτό της τριχοτόμησης μιας γωνίας. Η διχοτόμηση μιας γωνίας είχε στην αρχαιότητα γνωστή γεωμετρική λύση με γνώμονα και διαβήτη, πλην όμως η τριχοτόμηση της όχι. Ο σοφιστής Ιππίας έδειξε πως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη χρήση μιας καμπύλης γραμμής, της επονομαζόμενης τετραγωνίζουσας που φέρει το όνομα του Ιππία.

Πηγή: Wikipedia

Ιδέα του Ιππία


Έστω ένα τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο το A και ακτίνα $A\Delta$ εντός του τετραγώνου γράφουμε τεταρτοκύκλιο. Η πλευρά $\Delta\Gamma$ ολισθίνει παράλληλα προς την AB εκτελώντας ομαλή ευθύγραμμη κίνηση με ταχύτητα u . Η πλευρά $A\Delta$ εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με κέντρο το A και το Δ διαγράφει το τόξο $\widehat{\Delta A}$.



Η κίνηση των πλευρών $\Delta\Gamma, A\Delta$ γίνεται ξεκινώντας ταυτόχρονα έτσι ώστε κατά την κίνησή τους να τέμνονται και να τερματίζουν πάνω στην AB . Το σημείο τομής M των κινούμενων πλευρών διαγράφει μία καμπύλη από το Δ μέχρι την πλευρά AB . Η καμπύλη αυτή ονομάζεται τετραγωνίζουσα και χρησιμοποιήθηκε από τον Ιππία για την τριχοτόμηση γωνίας.

Σπύρος Γιαννακόπουλος

Ας θεωρήσουμε ότι τη χρονική στιγμή t έχουμε το παρακάτω σχήμα:



Έχουμε $(\Delta\Delta') = vt$ (1)

Έστω ω η γωνιακή ταχύτητα της κίνησης της πλευράς $\Delta\Delta'$, τότε είναι $\varphi = \omega t$ (2).

Με διαίρεση κατά μέλη των (1),(2) παίρνουμε:

$$\frac{(\Delta\Delta')}{\varphi} = \frac{v}{\omega} \Leftrightarrow \frac{\alpha - y}{\frac{\pi}{2} - \theta} = \frac{v}{\omega} \quad (3), (v, \omega \text{ σταθερά}).$$

Παρατηρούμε λόγω της (3) ότι ο λόγος $\frac{\alpha - y}{\frac{\pi}{2} - \theta}$

είναι σταθερός οπότε όταν τερματίζεται η κίνηση


$$\text{θα έχουμε } \frac{\alpha - y}{\frac{\pi}{2} - \theta} = \frac{\alpha}{\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow (\text{ιδιότητα αναλογιών}) \frac{\alpha}{\frac{\pi}{2}} = \frac{\alpha - (\alpha - y)}{\frac{\pi}{2} - (\frac{\pi}{2} - \theta)} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\frac{\pi}{2}} = \frac{y}{\theta} \Leftrightarrow (\text{ιδιότητα αναλο-}$$

$$\text{γιών}) \frac{y}{\alpha} = \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}} \quad (I).$$

Τριχοτόμηση γωνίας με την τετραγωνίζουσα

(Λύση του Ιππία)

Έστω τυχαία γωνία $\hat{x}\hat{A}y$ με μέτρο θ . Στην πλευρά της Ax παίρνουμε τμήμα AB μήκους α και κατασκευάζουμε το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έτσι ώστε η πλευρά Ay να τέμνει το τετράγωνο. Η καμπύλη ΔM (κόκκινο χρώμα) είναι η τετραγωνίζουσα. Η πλευρά Ay της γωνίας τέμνει την τετραγωνίζουσα στο σημείο E .



Από το E φέρουμε παράλληλη ευθεία προς την AB που τέμνει τις πλευρές AD, BG στα σημεία K, Λ αντίστοιχα. Στο τμήμα AK παίρνουμε

σημείο Σ έτσι ώστε $(A\Sigma) = \frac{1}{3}(AK)$ και φέ-

ρουμε $\Sigma T // AB$ που τέμνει την τετραγωνί-

ζουσα στο σημείο P ,

Με βάση τη σχέση (I) έχουμε:

$$\frac{(AK)}{\alpha} = \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}} \text{ και } \frac{(A\Sigma)}{\alpha} = \frac{\theta_1}{\frac{\pi}{2}} \text{ όπου } \theta_1 \text{ το μέτρο}$$

της γωνίας $\hat{B}\hat{A}P$. Διαιρώντας κατά μέλη τις δύο τελευταίες σχέσεις παίρνουμε:

$$\frac{(AK)}{(A\Sigma)} = \frac{\theta}{\theta_1} \Leftrightarrow 3 = \frac{\theta}{\theta_1} \Leftrightarrow \theta_1 = \frac{1}{3}\theta. \text{ Έτσι η γωνία } \theta \text{ έχει τριχοτομηθεί.}$$

