

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΤΑΞΗ: Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 1^ο

A.

α. Σωστό.

β. Σωστό.

γ. Λάθος.

δ. Λάθος

ε. Λάθος.

B. Ας θεωρήσουμε τώρα δύο διανύσματα $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{b} = (x_2, y_2)$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντιστοίχως. Τότε έχουμε τις ισοδυναμίες:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 .$$

Επομένως, η συνθήκη παραλληλίας για δύο διανύσματα και \vec{a} και \vec{b} με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 διατυπώνεται ως εξής:

$$\boxed{\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2}$$

ΘΕΜΑ 2^ο

A. Για να ορίζουν τα σημεία $A(\kappa, \kappa+1)$, $B(1, \kappa)$, $\Gamma(0, \kappa+2)$, $\kappa \in \mathbb{R}$ τρίγωνο πρέπει να μην είναι συνευθειακά. Επομένως τα διανύσματα $\vec{A\Gamma}$, $\vec{A\Gamma}$ δεν πρέπει να είναι συγγραμμικά. Άρα πρέπει να ισχύει:

$$\det(\vec{A\Gamma}, \vec{A\Gamma}) \neq 0$$

Έχουμε $\vec{AB} = (1 - \kappa, -1)$ και $\vec{A\Gamma} = (-\kappa, 1)$. Έτσι έχουμε διαδοχικά:

$$\det(\vec{AB}, \vec{A\Gamma}) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 - \kappa & -1 \\ -\kappa & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 1 - \kappa - \kappa \neq 0 \Leftrightarrow \kappa \neq \frac{1}{2}$$

B.

α. Για $\kappa = 1$ τα μη συνευθειακά σημεία είναι $A(1, 2)$, $B(1, 1)$, $\Gamma(0, 3)$.

Οι συντεταγμένες του μέσου M της $B\Gamma$ είναι $M\left(\frac{1}{2}, 2\right)$. Άρα το μήκος της διαμέσου AM του

τριγώνου $AB\Gamma$ είναι:

$$(AM) = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

β. Έχουμε:

$$\vec{AB} = (0, -1)$$

$$2\vec{B\Gamma} - \vec{\Gamma A} = 2(-1, 2) - (1, -1) = (-3, 5)$$

Επομένως το ζητούμενο εσωτερικό γινόμενο είναι:

$$\vec{AB} \cdot (2\vec{B\Gamma} - \vec{\Gamma A}) = 0 \cdot (-3) + (-1) \cdot 5 = -5$$

ΘΕΜΑ 3^ο

A. Για να είναι οι ευθείες $\varepsilon_1: (\kappa + 2)x - 3y - 24\kappa = 0$ και $\varepsilon_2: 4x - 3y + 2 = 0$, $\kappa \in \mathbb{R}$

παράλληλες πρέπει:

$$\frac{\kappa + 2}{3} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \kappa + 2 = 4 \Leftrightarrow \kappa = 2$$

B.

α. Έχουμε:

$$\delta \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_\delta \cdot \lambda_{\varepsilon_2} = -1 \Leftrightarrow \lambda_\delta \cdot \frac{4}{3} = -1 \Leftrightarrow \lambda_\delta = -\frac{3}{4}$$

Επομένως η εξίσωση της ευθείας δ που είναι κάθετη στην ε_2 και διέρχεται από το σημείο

$A(1, 2)$ είναι:

$$y - 2 = -\frac{3}{4}(x - 1) \Leftrightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{11}{4} \Leftrightarrow 3x + 4y - 11 = 0$$

Οι συντεταγμένες του σημείου τομής της ευθείας δ με την ευθεία ε_1 είναι η λύση του συστήματος:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 11 = 0 \\ 4x - 3y - 48 = 0 \end{cases}$$

Η οποία είναι $(x, y) = (9, -4)$. Άρα το ζητούμενο σημείο είναι $B(9, -4)$.

β. Η απόσταση των ευθειών $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι το μήκος του κάθετου τμήματος AB στις ευθείες ε_1 και ε_2 . Επομένως:

$$(AB) = \sqrt{(9-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{64+36} = 10$$

γ. Ο κύκλος ο οποίος εφάπτεται στις ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ στα σημεία B, A έχει διάμετρο AB.

Επομένως έχει κέντρο K το μέσο του AB και ακτίνα το ίση μισό του μήκους του AB.

Άρα έχουμε:

$$K\left(\frac{9+1}{2}, \frac{-4+2}{2}\right) \text{ ή } K(5, -1) \text{ και } \rho = \frac{10}{2} = 5$$

Άρα η εξίσωση του ζητούμενου κύκλου είναι:

$$(x-5)^2 + (y+1)^2 = 25$$

ΘΕΜΑ 4^ο

A. Για την υπερβολή $C_1 : 16x^2 - 9y^2 = 144$ έχουμε:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1, \text{ με } a = 3 \text{ και } b = 4, \text{ οπότε } \gamma^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow \gamma^2 = 16 + 9 \Leftrightarrow \gamma = 5$$

Επομένως οι εστίες της υπερβολής C_1 είναι $E(5, 0)$ και $E'(-5, 0)$.

Οι ασύπτωτες της υπερβολής C_1 είναι $y = \frac{4}{3}x$ και $y = -\frac{4}{3}x$.

B. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$x^2 + y^2 - 6x - 2y + 9 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 1 \Leftrightarrow (x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$$

Η τελευταία εξίσωση είναι εξίσωση κύκλου με κέντρο το σημείο $\Lambda(3, 1)$ και ακτίνα $\rho = 1$.

Γ. Η ασύμπτωτη της υπερβολής που σχηματίζει οξεία γωνία με τον $x'x$ είναι η $y = \frac{4}{3}x$.

Η σχετική θέση του κύκλου C_2 και της ασύμπτωτης της υπερβολής $y = \frac{4}{3}x$ προσδιορίζεται

από τη λύση του επόμενου συστήματος:

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-1)^2 = 1 \\ y = \frac{4}{3}x \end{cases}$$

Από το σύστημα παίρνουμε (με αντικατάσταση):

$$25x^2 - 78x + 81 = 0, \text{ με } \Delta = -2016 < 0$$

Επομένως, ο κύκλος C_2 και η ασύμπτωτη $y = \frac{4}{3}x$ της υπερβολής C_1 δεν έχουν κανένα κοινό σημείο.

Δ. Αφού οι ζητούμενες εφαπτομένες του κύκλου διέρχονται από την αρχή των αξόνων θα είναι της μορφής $y = \lambda x$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Τότε το μη γραμμικό σύστημα:

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-1)^2 = 1 \\ y = \lambda x \end{cases}$$

πρέπει να έχει μόνο μία λύση (τις συντεταγμένες του σημείου επαφής). Με αντικατάσταση της 2^{ης} σχέσης στην εξίσωση του κύκλου έχουμε:

$$(x-3)^2 + (\lambda x - 1)^2 = 1 \Leftrightarrow (\lambda^2 + 1)x^2 - 2(\lambda + 3)x + 9 = 0$$

Έτσι για την τελευταία εξίσωση 2^{ου} βαθμού, ως προς x , πρέπει να ισχύει:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow -32\lambda^2 + 24\lambda = 0 \Leftrightarrow \left(\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = \frac{3}{4} \right)$$

Επομένως:

- Για $\lambda = 0$ έχουμε την εφαπτομένη στον κύκλο C_2 $y = 0$, δηλαδή το άξονα $x'x$, ενώ
- Για $\lambda = \frac{3}{4}$ έχουμε εφαπτομένη στον κύκλο C_2 , την $y = \frac{3}{4}x$.

Επιμέλεα λύσεων: Κατραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών