

Καραγιάννης Ιωάννης
Συντονιστής ΕΕ Μαθηματικών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Με τις αναλυτικές-υποδειγματικές λύσεις τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Καραγιάννης Ιωάννης
Τηλ. 2241068945
e-mail: iokaragi@sch.gr
Ιστότοπος: blogs.sch.gr/iokaragi (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ)
ΡΟΔΟΣ 2018

Σελίδες: 267

Σχήμα: 17x24

ISBN: 978-618-00-0641-4

Εκδότης: Γιάννης Καραγιάννης (ID:12897)

© Copyright: Γιάννης Καραγιάννης

Νοέμβριος 2018

Φιλολογική Επιμέλεια: Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά

Επιμέλεια εξωφύλλου: Γιάννης Καραγιάννης

Έκδοση: 1^η

Εκτύπωση: Lichnos Print House

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μερική ή ολική έστω και μιας σελίδας του βιβλίου αυτού με οποιαδήποτε μέθοδο (μηχανική, ηλεκτρονική, φωτοτυπική κ.α. (Ν. 2121/93 και 2557/97). Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

Αγαπητή μαθήτριά, αγαπητέ μαθητή,

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου γράφτηκε αποκλειστικά για σένα, για να σε βοηθήσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ώστε μετά από τη συστηματική μελέτη του να είσαι έτοιμος να γράψεις άριστα. Για να γίνει αυτό απαιτείται η βαθιά κατανόηση των εννοιών, των ορισμών και των θεωρημάτων-προτάσεων του σχολικού σου βιβλίου.

Στο βιβλίο αυτό δεν θα βρεις θεωρία, αφού το σχολικό σου βιβλίο είναι αυτό που θα σε καθοδηγήσει στην κατανόησή της. Όταν λοιπόν έχεις μελετήσει πλήρως το σχολικό σου βιβλίο, μαζί με τις περισσότερες από τις ασκήσεις που προτείνονται σε αυτό, μπορείς να μελετήσεις και το παρόν βιβλίο.

Στο βιβλίο αυτό, στο 1^ο Κεφάλαιο θα βρεις **Προτεινόμενα Διαγωνίσματα** στο επίπεδο, στο ύψος και στη διάρθρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και όλα τα θέματα των **Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016-2018** για όλους τους τύπους σχολείων στις κανονικές και στις επαναληπτικές εξετάσεις. Ξεκίνησε λοιπόν προσπαθώντας να λύσεις τα προτεινόμενα διαγωνίσματα σε χρόνο 3 ωρών το καθένα.

Κατόπιν, κοίταξε τις **αναλυτικές λύσεις** που δίνονται στο 2^ο Κεφάλαιο και σύγκρινέ τις με τις δικές σου. Σε δεύτερο επίπεδο προσπάθησε μόνος σου να λύσεις τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων πάλι σε διάρκεια 3 ωρών. Μετά πάλι κοίταξε τις αναλυτικές λύσεις που δίνονται στο 2^ο Κεφάλαιο. Εντόπισε τις αδυναμίες σου και διόρθωσέ τις.

Η διάρθρωση και η δομή των θεμάτων είναι τέτοια, ώστε να καλύπτεται σχεδόν ολόκληρη η εξεταστέα ύλη και να επιμένει σε σημεία «κλειδιά».

Ευχαριστώ θερμά τον Μαθηματικό **Αναστάσιο Κόρρα** για τις διορθώσεις του και τις επισημάνσεις του καθώς και τον φοιτητή του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης **Καραγιάννη Βασίλειο** για την κατασκευή συγκεκριμένων θεμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ^ο	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	
	1.1	Προτεινόμενα Διαγωνίσματα.....11-67
	1.2	Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.....70-117

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ^ο	ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ	
	2.1	Προτεινόμενα Διαγωνίσματα120-196
	2.2	Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων199-266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

1.1. Προτεινόμενα Διαγωνίσματα

1.2. Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

1.1. Προτεινόμενα Διαγωνίσματα

1^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Πότε μία συνάρτηση f λέγεται «1-1» σε ένα σύνολο A ;

Μονάδες 4

A2. Αν $c > 0$, τότε ποιο εμβαδόν εκφράζει το $\int_{\alpha}^{\beta} c dx$ ($\alpha < \beta$);

Μονάδες 4

A3. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Μονάδες 7

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

β. Αν η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ με $f(\alpha) < 0$ και υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$, ώστε $f(\xi) = 0$, τότε κατ' ανάγκη $f(\beta) > 0$.

γ. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} και δεν είναι αντιστρέψιμη, τότε υπάρχει κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$, στο οποίο η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος του Rolle.

δ. Αν μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα σύνολο A είναι συνεχής στο A και $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του A , τότε η f είναι πάντα σταθερή σε όλο το σύνολο A .

ε. Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, τότε ισχύει:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = 2\ln \frac{x+1}{1-x} + 3$$

B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 4

B2. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 4

B3. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να μελετήσετε την f^{-1} ως προς τη συνέχεια στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τα όρια: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln|x|}, & \text{αν } x \neq 0, x \neq 1 \text{ και } x \neq -1 \\ \kappa, & \text{αν } x = 1 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

και $g(x) = f(x) \ln\left(\frac{1}{x^2}\right), x > 0$.

Γ1. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ καθώς και την τιμή του $\kappa \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο $\mathbb{R} - \{-1\}$.

Μονάδες 6

Γ2. α. Να μελετήσετε την συνάρτηση g ως προς την μονοτονία της.

Μονάδες 4

β. Να αποδείξετε ότι:

$$e^{-x^2+1} \leq \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}-1)}{2(x-1)}, \text{ αν } x > 1 \text{ και}$$

$$e^{-x^2+1} \geq \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}-1)}{2(x-1)}, \text{ αν } 0 < x < 1$$

Μονάδες 4

Γ3. α. Να μελετήσετε την συνάρτηση g ως προς τα κοίλα της στο διάστημα $(0, +\infty)$ και να βρείτε τα σημεία καμπής της.

Μονάδες 5

β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της g στα σημεία $A(2, g(2))$ και $B(1, g(1))$ αντίστοιχα και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι:

$$e^{-4}(7-3x) \leq e^{-x^2}(x-1), \text{ για κάθε } x \in \left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, +\infty\right) \text{ και}$$

$$e^{-x^2} \geq e^{-1}, \text{ για κάθε } x \in \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, 1\right).$$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A = (0, +\infty)$ με σύνολο τιμών

$f(A) = \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε: $e^{f(x)}(f^2(x) - 2f(x) + 3) = x$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f .

Μονάδες 6

Για τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 δίνεται ότι: $f^{-1}(x) = e^x(x^2 - 2x + 3)$, $x \in \mathbb{R}$.

Δ2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f^{-1} ως προς την κυρτότητα. Στη συνέχεια, να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f^{-1} , την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f^{-1} στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $x = 1$.

Μονάδες 8

Δ3. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ θεωρούμε τα σημεία $A(x, f^{-1}(x))$, $B(f^{-1}(x), x)$ των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f^{-1} και f αντίστοιχα.

α. Να αποδείξετε ότι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης των εφαπτομένων των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f^{-1} και f στα σημεία A και B αντίστοιχα, είναι ίσο με 1.

Μονάδες 6

β. Να βρείτε για ποια τιμή του $x \in \mathbb{R}$ η απόσταση των σημείων A, B γίνεται ελάχιστη, και να βρείτε την ελάχιστη απόστασή του.

Μονάδες 5

2^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μίας συνάρτησης f στο διάστημα Δ ;

Μονάδες 5

A2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Fermat και να το αποδείξετε.

Μονάδες 10

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ , τότε η εφαπτομένη της C_f σε κάθε σημείο είναι «κάτω» από τη C_f εκτός από το κοινό τους σημείο.

β. Αν η f είναι συνεχής σε διάστημα Δ και $\alpha, \beta, \gamma \in \Delta$, τότε ισχύει:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx$$

γ. Αν υπάρχουν στο \mathbb{R} τα όρια των συναρτήσεων f και g , τότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \text{ εφόσον } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$$

δ. Αν το $(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση στο x_0 , τότε $f''(x_0) = 0$.

ε. Αν f', g' είναι συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, τότε:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)g(x) dx$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση f με: $f(x) = 4\sqrt{e^x - 2} + 3$ και $g(x) = \frac{1}{x^2} + 2$

B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 4

B2. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f καθώς και το πλήθος των ριζών της.

Μονάδες 6

B3. Να ορίσετε την f^{-1} .

Μονάδες 5

B4. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g δεν είναι αντιστρέψιμη.

Μονάδες 4

B5. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = (x^2 + 1) \cdot \ln x$, $x > 0$.

Γ1. Να δείξετε ότι: $2x \ln x + \frac{1}{x} > 0$, για κάθε $x > 0$.

Μονάδες 5

Γ2. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 0$$

Μονάδες 5

Γ3. Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$ τέτοιο, ώστε το σημείο

$A(x_0, f(x_0))$ να είναι σημείο καμπής της C_f .

Μονάδες 6

Γ4. α. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

Μονάδες 4

β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική

παράσταση της C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες: $x = \frac{1}{e}$, $x = e$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , με:

$$f'(0) = f(0) = 0,$$

η οποία ικανοποιεί τη σχέση:

$$e^x (f'(x) + f''(x) - 1) = f'(x) + xf''(x), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \ln(e^x - x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

Δ2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 6

Δ3. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής

Μονάδες 5

Δ4. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\ln(e^x - x) = \sin x$$

έχει ακριβώς μία λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Μονάδες 5

Δ5. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^1 (e^x - 1) \frac{f(x)}{e^x - x} dx$$

Μονάδες 4

3^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του $y = f(x)$ ως προς το x στο σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της f ;

Μονάδες 5

A2. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Μονάδες 10

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A θα λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) ελάχιστο, το $f(x_0)$, όταν $f(x) < f(x_0)$ για κάθε $x \in A$.

β. Ανάμεσα σε δύο ρίζες μιας πολυωνυμικής συνάρτησης υπάρχει τουλάχιστον μια ρίζα της παραγώγου της.

γ. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε διάστημα Δ και $\alpha, \beta \in \Delta$, τότε ισχύει:

$$\int_{\beta}^x f(t)dt = \int_{\alpha}^x f(t)dt + c, c \in \mathbb{R}$$

δ. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα σύνολο της μορφής:

$$(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$$

και l ένας πραγματικός αριθμός. Τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - l) = 0$$

ε. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δεν μηδενίζεται σ' αυτό, τότε αυτή είναι θετική για κάθε $x \in \Delta$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \ln(3e^x + 1) - 2$$

B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 5

B2. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

Μονάδες 5

B3. Να ορίσετε την f^{-1} .

Μονάδες 8

B4. Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x) < f^{-1}(\ln 5 - 2) - 2.$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται συνάρτηση:

$$f(x) = e^x - \ln(x+1) - 1$$

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 5

Γ2. α. Να βρείτε το σύνολο τιμών της και να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

β. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 10

Γ3. Αν για τους αριθμούς $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $2\alpha + \beta > 0$ και $\alpha + 2\beta - 1 > 0$, ισχύει:

$$e^{2\alpha+\beta-1} - \ln(2\alpha + \beta) + e^{\alpha+2\beta-2} - \ln(\alpha + 2\beta - 1) \leq 2,$$

να υπολογίσετε τους α, β .

Μονάδες 5

Γ4. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και την ευθεία $x = 1$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο $(1, +\infty)$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x > 1$ που ικανοποιεί τη σχέση:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1 + x \ln x}{x \ln x}, \text{ για κάθε } x > 1 \text{ με } f(e) = e^e$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = e^x \cdot \ln x$, $x > 1$ καθώς και ότι οι συναρτήσεις:

$$g(x) = e^x, h(x) = \ln x$$

δεν έχουν κοινό σημείο στο $(1, +\infty)$.

Μονάδες 4

Δ2. α. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία της και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 4

β. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης: $f(x) = \frac{\lambda}{x}$ με $\lambda \in \mathbb{R}$, $x > 1$.

Μονάδες 8

Δ3. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή και να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο της $A(e, f(e))$.

Μονάδες 4

Δ4. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha. \frac{f(x)}{e^{e-1}} \geq (1+e)x - e^2, \text{ για κάθε } x > 1 \quad \beta. \int_2^3 f(x) dx \geq e^{e-1} \cdot \frac{5+5e-2e^2}{2}$$

Μονάδες 2x3= 6

Δ5. Να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

για κάθε $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$ με $x_1 < x_2$

Μονάδες 3

4^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[α, β]$;

Μονάδες 4

A2. Τι ονομάζουμε κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μίας συνάρτησης f ;

Μονάδες 4

A3. Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ'ένα διάστημα $(α, β)$, με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν $f'(x) > 0$ στο $(α, x_0)$ και $f'(x) < 0$ στο $(x_0, β)$, τότε να αποδείξετε ότι το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f .

Μονάδες 7

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για κάθε συνάρτηση f συνεχή με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [α, β]$, ισχύει:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \neq 0 .$$

β. Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα $(α, β)$, τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (A, B) , όπου: $A = \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ και $B = \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x)$.

γ. Αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ «κοντά» στο x_0 .

δ. Αν μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ έχει συνεχή πρώτη παράγωγο και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι γνησίως μονότονη στο \mathbb{R} .

ε. Έστω συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ . Στα εσωτερικά σημεία του Δ όπου η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο, η γραφική παράσταση C_f της f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x + \kappa\eta\mu x}{x - x^2}, & \text{αν } x < 0 \\ \lambda, & \text{αν } x = 0 \\ \sqrt{8x^2 + x + 16} - 3x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

B1. Να δείξετε ότι $\kappa = 2$ και $\lambda = 4$.

Μονάδες 8

B2. Να υπολογίσετε τα όρια: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Μονάδες 10

B3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) = 2\ln(8x + 1)$$

έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Έστω μία συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη η οποία ικανοποιεί τις επόμενες συνθήκες:

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1$$

$$2f(x) + 4xf'(x) + x^2f''(x) = 2\ln x + 3, \quad \text{για κάθε } x > 0.$$

Δίνεται επίσης η συνάρτηση:

$$g(x) = 2xf(x) + x^2f'(x) - x(2\ln x + 1), \quad x > 0.$$

Γ1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

Μονάδες 5

Γ2. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \ln x, x > 0$.

Μονάδες 5

Γ3. α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης C_f της f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Μονάδες 4

β. Αν ένα σημείο $M(x(t), y(t))$, όπου t ο χρόνος σε sec και $x(t) > 1$, κινείται πάνω στην καμπύλη της γραφικής παράστασης C_{fof} της $f \circ f$ με σταθερό ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του και ίσο με 1 cm/sec , να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του σημείου M τη χρονική στιγμή t_0 , κατά την οποία $x(t_0) = 2 \text{ cm}$.

Μονάδες 6

Γ4. Να αποδείξετε ότι:

$$\left| f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \right| < \sqrt{f(\alpha) \cdot f(\beta)} \text{ για κάθε } \alpha, \beta \in \left(0, \frac{1}{e}\right] \text{ με } \alpha < \beta.$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = x^5 + x^3 + x, x \in \mathbb{R}$

Δ1. α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι αντιστρέψιμη.

Μονάδες 3

β. Να αποδείξετε ότι:

$$e^{5x} + e^{3x+2} + e^{x+4} \geq e^5 \cdot x \cdot (x^4 + x^2 + 1), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 4

Δ2. α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει μοναδική ρίζα $x_0 \in (0, 1)$

Μονάδες 4

β. Να λύσετε την ανίσωση:

$$2x^6 + 3x^4 + 6x^2 - 12x \geq 2x_0^6 + 3x_0^4 + 6x_0^2 - 12x_0$$

Μονάδες 4

Δ3. Να αποδείξετε ότι:

$$3 < \frac{\int_{\xi_1}^{\xi_2+1} f(t) dt}{\xi_2 - \xi_1} < 42, \text{ με } 0 < \xi_1 < \xi_2 < 1.$$

Μονάδες 4

Δ4. α. Να αποδείξετε ότι: $3 \int_0^1 e^{x^2} dx \geq 4$

Μονάδες 3

β. Να υπολογίσετε, συναρτήσει του x_0 , το ολοκλήρωμα: $\int_0^1 |f^{-1}(x)| dx$.

Μονάδες 3

5^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Τι ορίζουμε ως εφαπτομένη (όχι κατακόρυφη) της γραφικής παράστασης C_f μίας συνάρτησης f στο σημείο της $A(x_0, f(x_0))$;

Μονάδες 4

A2. Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες;

Μονάδες 4

A3. Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^v, v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} και ότι ισχύει: $f'(x) = vx^{v-1}$, δηλαδή $(x^v)' = vx^{v-1}$.

Μονάδες 7

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

β. Αν $f(x) = \int_2^4 \sqrt{2+t^2} dt$, τότε $f'(3) = 0$.

γ. Μια συνάρτηση f είναι «1-1», αν και μόνο αν κάθε οριζόντια ευθεία (παράλληλη στον $x'x$) τέμνει τη γραφική παράστασή της σε ένα τουλάχιστον σημείο.

δ. Αν η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ε. Αν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης έχει στο $+\infty$ οριζόντια ασύμπτωτη, τότε δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) + 2f(x) = 2x + 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και } f(2) = 5$$

B1. Να βρείτε το $f(5)$.

Μονάδες 5

B2. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

Μονάδες 7

B3. Να βρείτε το $f^{-1}(2)$.

Μονάδες 6

B4. Να λύσετε την εξίσωση: $f(f^{-1}(2x^2 + 7x) - 1) = 2$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με g παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$, για τις οποίες ισχύουν οι επόμενες σχέσεις:

$$f(x) = x(x + \alpha) - x + 1 \text{ με } \alpha, x \in \mathbb{R},$$

$$f(x) - 1 \geq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και}$$

$$g'(x) \ln x = \frac{2g(x)}{x}, \text{ για κάθε } x > 1$$

Γ1. Να δείξετε ότι $\alpha = 1$.

Μονάδες 3

Γ2. Αν $g(e) = -1$, να δείξετε ότι: $g(x) = -\ln^2 x$, για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

Μονάδες 5

Γ3. Αν $g(x) = -(\ln x)^2$ σε όλο το διάστημα $(0, +\infty)$.

α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδική τιμή $x_0 \in (0, 1)$, για την οποία η διαφορά $f(x) - g(x)$ γίνεται ελάχιστη.

Μονάδες 5

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό ζεύγος σημείων M, N με $M(\xi, f(\xi))$ σημείο της γραφικής παράστασης C_f της f και $N(\xi, g(\xi))$ σημείο της γραφικής παράστασης C_g της g με $\xi \in (0, +\infty)$, στα οποία οι C_f και C_g δέχονται παράλληλες εφαπτομένες στα σημεία M και N αντίστοιχα.

Μονάδες 4

Γ4.

α. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{(x-1)^x}{\eta\mu(x-1) + \frac{g(x)}{f(x)}} \right]$$

Μονάδες 4

β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των f και g αντίστοιχα και των ευθειών $x=1$, $x=e$

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη στο \mathbb{R} , με συνεχή πρώτη παράγωγο για την οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$f(x) + f(1-x) = 0, \quad f'(x) \neq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Δ1. Να βρείτε την μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μονάδες 4

Δ2. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε: $f'(x_0) = 2f(1)$.

Μονάδες 3

Δ3. Έστω η συνάρτηση: $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$, $x \in \mathbb{R}$.

Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g , στο σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα $x'x$, σχηματίζει με αυτόν γωνία 45° .

Μονάδες 4

Δ4.

α. Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^1 f(x)dx = 0$$

Δίνεται επιπλέον ότι $\int_0^1 f'(x)dx = 1$ καθώς και ότι η συνάρτηση f^{-1} είναι συνεχής στο \mathbb{R} .

Μονάδες 3

β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν $E(\Omega)$ του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική

παράσταση της f^{-1} και τις ευθείες $x = -\frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{2}$.

Μονάδες 4

Δ5.

α. Να υπολογίσετε την παράσταση :

$$K(\lambda) = \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} f(x)dx + \int_0^{f(\lambda)} f^{-1}(x)dx, \text{ όπου } \lambda > \frac{1}{2}.$$

Μονάδες 4

β. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{K(\lambda) \cdot \ln \lambda}{f(\lambda) \cdot e^\lambda}$$

Μονάδες 3

6^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. α. Να διατυπώσετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών (**Μονάδες 2**) και στη συνέχεια να το αποδείξετε (**Μονάδες 4**)

β. Να δώσετε ένα παράδειγμα, σχεδιάζοντας ένα πρόχειρο σχήμα, μιας συνάρτησης f που δεν είναι συνεχής στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, η οποία δεν παίρνει υποχρεωτικά όλες τις ενδιάμεσες τιμές ανάμεσα στα $f(\alpha), f(\beta)$ (**Μονάδες 2**).

A2. Να βρείτε το λάθος στον επόμενο συλλογισμό (**Μονάδες 2**). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (**Μονάδες 2**).

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+\frac{1}{u^2}} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = -\int_{-1}^1 \frac{1}{1+u^2} du = -I \quad (\text{θέσαμε } x = \frac{1}{u},$$

οπότε $dx = -\frac{1}{u^2} du$). Άρα $I = -I$, οπότε $I = 0$. Αυτό, όμως, είναι άτοπο, αφού

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx > 0, \text{ επειδή } \frac{1}{1+x^2} > 0, \text{ για κάθε } x \in [-1, 1].$$

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Αν f, g, h είναι τρεις συναρτήσεις και ορίζεται η $h \circ (g \circ f)$, τότε ορίζεται και η $(h \circ g) \circ f$ και ισχύει $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

β) Για κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι $[f(\alpha), f(\beta)]$ ή $[f(\beta), f(\alpha)]$.

γ) Αν για κάθε συνάρτηση f και για ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$


τότε η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

δ) Μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ δεν έχει ασύμπτωτες.

ε) Για όλες τις συνεχείς στο \mathbb{R} συναρτήσεις $[\alpha, \beta]$ με: $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x)dx$ ισχύει $\beta = \gamma$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

Μονάδες 10

A4. Στο επόμενο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας συνάρτησης f στο διάστημα $[-2, 2]$. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (**Μονάδες 2**) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (**Μονάδα 1**)



Το σημείο $A(0, f(0))$ είναι:

- α. θέση τοπικού μέγιστου της f ,
- β. θέση τοπικού ελάχιστου της f ,
- γ. σημείο καμπής της C_f .

ΘΕΜΑ Β

Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$f(1 + f(x)) = 2x - 6 + f(x) \quad (1), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

B1. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

Μονάδες 8

B2. Να αποδείξετε ότι $f(3) = 2$

Μονάδες 7

B3. Να λύσετε την εξίσωση:

$$f\left(1+f\left(x^2+x+1\right)\right)=f\left(1+f(3)\right)$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = e^x + x^2 + x$, $x \in \mathbb{R}$

Γ1. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένας αριθμός $\alpha \in (-1, 0)$ τέτοιος, ώστε να ισχύει: $e^\alpha + 2\alpha + 1 = 0$.

Μονάδες 5

Γ2. Να δείξετε ότι:

$$f(x) \geq \alpha^2 - \alpha - 1 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

όπου α ο αριθμός του ερωτήματος Γ1.

Μονάδες 5

Γ3. Να βρείτε το πλήθος των πραγματικών ριζών της εξίσωσης: $f(x) = \frac{2017}{2016}$

Μονάδες 5

Γ4. Να αποδείξετε ότι:

$$f(x^2+1) + f(x^2+2) < f(x^2) + f(x^2+3), \text{ για κάθε } x > 0$$

Μονάδες 5

Γ5. Έστω ένα σημείο $M(x(t), y(t))$, όπου t ο χρόνος, το οποίο διατρέχει τη γραφική παράσταση της f με $x'(t) \neq 0$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει χρονική στιγμή t_0 , με $x(t_0) \in (-1, 0)$, ώστε ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης του M , ως προς τον χρόνο, να μηδενίζεται.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f'(x) = x\eta\mu x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ και } f(0) = 0$$

Δ1. α. Να δείξετε ότι: $f(x) = \eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Μονάδες 3

β. Να δείξετε ότι: $\eta\mu x > x\sigma\upsilon\nu x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Μονάδες 2

Δ2. Έστω επίσης η συνάρτηση:

$$g(x) = |x\epsilon\phi x - x^2|, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να μελετήσετε τη g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 4

Δ3. α. Αν $\alpha > 0$, να δείξετε ότι το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης $g(x) = \alpha$ είναι μηδέν.

Μονάδες 4

β. Έστω x_1, x_2, x_3 οι θετικές ρίζες των εξισώσεων: $g(x) = 1, g(x) = 2, g(x) = 3$

αντίστοιχα. Να δείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ με $\xi_1 < \xi_2$ τέτοια, ώστε:

$$(x_2 - x_1)g'(\xi_1) + (x_3 - x_2)g'(\xi_2) = 2$$

Μονάδες 4

Δ4. α. Να βρείτε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln[\eta\mu x - f(x)] - \ln x + x^2}{\eta\mu^2 x - x\sigma\upsilon\nu x + x}$

Μονάδες 3

β. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τις γραφικές

παραστάσεις των συναρτήσεων f και $-f'$ και την ευθεία $x = \frac{\pi}{2}$.

Μονάδες 5

7^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ . Αν ισχύουν:

- ♦ οι f, g είναι συνεχείς στο Δ ,
- ♦ $f'(x) = g'(x)$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ,

να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει:

$$f(x) = g(x) + c$$

Μονάδες 6

A2.

α. Έστω f μία συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ;

Μονάδες 3

β. Ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού; (Να κάνετε πρόχειρο σχήμα).

Μονάδες 6

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνάρτηση «1-1», αν και μόνο αν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή: αν $x_1 = x_2$, τότε $f(x_1) = f(x_2)$.

β. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $-f$ είναι συμμετρική, ως προς τον άξονα $x'x$, της γραφικής παράστασης της f .

γ. Αν $f(x) = \alpha^x$, $\alpha > 0$, τότε $f'(x) = \alpha^x$


δ. Αν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f έχει στο $+\infty$ οριζόντια ασύμπτωτη, τότε δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

ε. Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[\alpha, \beta]$. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο $[\alpha, \beta]$, τότε: $\int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt = G(\alpha) - G(\beta)$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : [-4, 0) \cup (0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο επόμενο σχήμα:



B1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη συνέχεια.

Μονάδες 3

B2. Να βρείτε το όριο: $\alpha. \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ και $\beta. \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

Μονάδες 4

B3.

$\alpha.$ Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα $(0, 5]$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

$\beta.$ Να βρείτε την παράγωγο της f , όταν $x \in (-4, -2)$.

Μονάδες 2

B4. Ποια από τα παρακάτω ολοκληρώματα ορίζονται;

$$I = \int_2^4 f(x)dx, \quad J = \int_{-1}^0 f(x)dx$$

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

B5. Δίνεται η συνάρτηση: $g(x) = x + 1$

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $fo g$.

Μονάδες 4

β. Να εξηγήσετε πως με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f μπορείτε να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $fo g$.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + x + 1, x \in \mathbb{R}$$

Γ1. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 5

Γ2. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο, το $A(-1, -1)$.

Μονάδες 4

Γ3. Να αποδείξετε ότι:

α. Ισχύει: $|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq |x - y| \leq |f(x) - f(y)|$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$

β. Η συνάρτηση f^{-1} είναι συνεχής στο \mathbb{R} .

Μονάδες 6

Γ4. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε να ισχύει:

$$f^{-1}(\xi) + 2\xi = 0$$

Μονάδες 6

Γ5. Αν για την παράγουσα F της f' ισχύει:

$$F^2(x) \geq F(x)F(2-x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

να βρείτε τον τύπο της F .

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f:(0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν οι επόμενες σχέσεις:

- ♦ $f(1) = -1$
- ♦ $f'(x) + f(x) + 4e^{x-1} = \ln x + \frac{1}{x} + x + 1$ για κάθε $x > 0$

Δ1. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \ln x + x - 2e^{x-1}$, $x > 0$

Μονάδες 4

Δ2. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 6

Δ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση: $f'(x) = \int_e^{e^2} \frac{f'(\ln t)}{t} dt$ έχει μια μόνο ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

Μονάδες 3

Δ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης: $h(x) = \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$ με $x > 0$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = \frac{1}{e}$, $x = 1$.

Μονάδες 5

Δ5. Δίνεται επιπλέον η συνάρτηση: $g(x) = -f(x)$, $x > 0$.

Αν η ευθεία $x = \lambda$, $\lambda > 0$ τέμνει τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g στα σημεία A_λ , B_λ αντίστοιχα, να βρείτε:

α. Την ελάχιστη τιμή των αποστάσεων $(A_\lambda B_\lambda)$.

Μονάδες 3

β. Τα όρια: $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{E(\lambda)}{\lambda^2 + 1}$ και $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{E(\lambda)}{\lambda^2 + 1}$,

όπου $E(\lambda)$ είναι το εμβαδόν του τριγώνου $OA_\lambda B_\lambda$ και O η αρχή των αξόνων.

Μονάδες 4

8^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;

Μονάδες 4

A2. α. Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι:

«Αν η f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ ».

Μονάδες 6

β. Ισχύει το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος; **(Μονάδες 1)**

Αν ναι να το αποδείξετε, αν όχι να δώσετε κατάλληλο αντίπαράδειγμα.

(Μονάδες 3)

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.

β. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ'ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, τότε η f είναι και παραγωγίσιμη στο x_0 .

γ. Αν το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0) = 0$.

δ. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ με $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$, τότε κατ'ανάγκη θα είναι $f(x) = 0$ για κάθε x στο $[\alpha, \beta]$.

ε. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, τότε ισχύει: «Το $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται πάνω από τον άξονα

$x \times x$ μείον το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x \times x$ ».

Μονάδες 10.

Για τις προτάσεις που χαρακτηρίσατε ως Λάθος, να βρείτε κατάλληλο παράδειγμα που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό σας (**Μονάδες 1**).

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $0 < f(x) < 1$ για κάθε

$$x \in \mathbb{R} \text{ και η συνάρτηση: } g(x) = \frac{f(x)}{f^2(x)+1}.$$

B1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g έχει το ίδιο είδος μονοτονίας με την f .

Μονάδες 6

B2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f \circ g$ είναι γνησίως αύξουσα και «1-1».

Μονάδες 4

B3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση: $f(g(x^3+1)) = f(g(4x^2+2x))$ έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες και μια αρνητική ρίζα.

B4. Να λύσετε την ανίσωση: $(f \circ g)(x^3+4) > (f \circ g)(3x^2)$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^3$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1» και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1}

Μονάδες 4

Επιβεβαιώστε γραφικά ότι η συνάρτηση f είναι «1-1», δίνοντας και μία γεωμετρική ερμηνεία για αυτό.

Μονάδες 2

Γ2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $f(\eta\mu x) > f\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)$

Μονάδες 9

Γ3. Ένα κινητό (θεωρήστε το ως σημείο) M κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = x^3$, $x \geq 0$ με $x = x(t)$ και $y = y(t)$ ως συναρτήσεις του χρόνου t . Να βρείτε σε ποιο σημείο της καμπύλης ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης $y(t)$ του M είναι ίσος με το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης $x(t)$, αν υποθεθεί ότι $x'(t) > 0$ για κάθε $t \geq 0$.

Μονάδες 3

Να δώσετε μία περιγραφή, με φυσική ερμηνεία, του παραπάνω προβλήματος.

Μονάδες 1

Γ4. Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και άρτια συνάρτηση, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δίνονται συνάρτηση $f: \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right] \rightarrow \mathbb{R}$ παράγουσα της $-3\eta\mu^3 x$ με $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ και συνάρτηση g τέτοια, ώστε:

$$g(x) = 3\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu^3 x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f , g είναι ίσες στο διάστημα $\Delta = \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

Μονάδες 3

Δ2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι άρτια και η g' είναι περιπτή στο $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Μονάδες 4

Δ3. α. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τα κοίλα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 4

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} και να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 3

Δ4. Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g , f^{-1} .

Μονάδες 3

Δ5. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη $C_{f^{-1}}$

και τις ευθείες: $(\varepsilon_1): x + y = 2$, $(\varepsilon_2): x + y = -\frac{\pi}{2}$.

Μονάδες 3

Δ6. α. Να αποδείξετε ότι το σημείο $A\left(\frac{5\sqrt{2}}{4}, -\frac{\pi}{4}\right)$ βρίσκεται πάνω στη $C_{f^{-1}}$

Μονάδες 2

β. Αν η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στα εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού της, να βρείτε την κλίση της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο A .

Μονάδες 3

9^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μία συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Πότε λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 :

Μονάδες 4

A2. α. Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν:

- ♦ Η f είναι συνεχής στο Δ και
- ♦ $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ,

τότε να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .

Μονάδες 6

β. Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Να χαρακτηρίσετε την επόμενη πρόταση ως Ψευδή ή Αληθή (**Μονάδες 1**)

«Αν η f είναι κυρτή στο Δ , τότε $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ».

Αν η πρόταση είναι αληθής να το αποδείξετε, ενώ αν είναι ψευδής να δώσετε κατάλληλο αντιπαράδειγμα.

Μονάδες 4

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κάθε συνάρτηση f που είναι «1-1» είναι και γνησίως μονότονη.

β. Αν $\alpha > 1$, τότε ισχύει $\lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x = 0$.

γ. Αν f είναι μια οποιαδήποτε συνεχής συνάρτηση στο $[\alpha, \beta]$ με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$.


δ. Κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της είναι και παραγωγίσιμη στο x_0 .

ε. Αν $c > 0$, τότε το $\int_{\alpha}^{\beta} c dx$ ($\beta > \alpha$) εκφράζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με βάση $\beta - \alpha$ και ύψος c .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

B1. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου μίας συνάρτησης f στο διάστημα $[-1, 10]$.



Να προσδιορίσετε:

α. τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα και γνησίως φθίνουσα.

Μονάδες 5

β. τα διαστήματα στα οποία η f είναι κυρτή και κοίλη.


Μονάδες 5

γ. τις θέσεις τοπικών ακροτάτων και των σημείων καμπής.

Μονάδες 5

Σε όλα τα ερωτήματα να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

B2. Στο επόμενο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C της συνάρτησης θέσεως $x = S(t)$ ενός κινητού που κινείται πάνω σε ένα άξονα. Αν η C παρουσιάζει καμπή τις χρονικές στιγμές t_1 και t_3 , να βρείτε:



α. Πότε το κινητό κινείται κατά τη θετική φορά και πότε κατά την αρνητική φορά.

Μονάδες 5

β. Πότε η ταχύτητα του κινητού αυξάνεται και πότε μειώνεται.

Μονάδες 5

Σε όλα τα ερωτήματα να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f: (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία, για κάθε $x > -2$

ισχύουν:

$$f(e^{f(x)}) = \ln(x+4) \text{ και } (f \circ f)(e^{f(x)}) = \ln(\ln(x+4)+2)$$

Γ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη στο $(-2, +\infty)$

Μονάδες 4

Γ2. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \ln(x+2)$, $x > -2$ και να δώσετε μία πρόχειρη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 6

Γ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση: $(f \circ f)(x) = f(e^{-x} + 2)$ έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(e^2 - 2, e^3 - 2)$.

Μονάδες 7

Γ4. Να αποδείξετε ότι για κάθε x_1, x_2 στο $(-2, +\infty)$ με $x_1 < x_2$, ισχύει:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = e^x (x^2 + x + 3)$ και η παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ έτσι, ώστε να ισχύουν:

$$g(2) + xg(x) - g(x+2) - (f(x) - 3)^2 \leq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2+h) - g(2-h)}{h} = 0$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι $g'(2) = 0$

Μονάδες 4

Δ2. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f για $x \rightarrow -\infty$

Μονάδες 5

Δ3. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 5

Δ4. Να βρείτε σημείο B της C_h με $h(x) = \sqrt{f(x)}$ ώστε το σημείο $A(2, 0)$ απέχει την ελάχιστη απόσταση από τη C_h και να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_h είναι κάθετη στην ευθεία AB .

Μονάδες 5

Δ5. Αν $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και $\int_{g(0)}^{g(\alpha)} f(x) dx = 0$, να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον

ένα $x_0 \in (0, \alpha)$ τέτοιο, ώστε:

$$g'(x_0) = g(x_0) \cdot \epsilon\phi x_0.$$

Μονάδες 6

10^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$. Αν:

- ♦ η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και
- ♦ $f(\alpha) \neq f(\beta)$.

Τότε, για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένας, τουλάχιστον, $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιος, ώστε $f(x_0) = \eta$.

Μονάδες 10

A2.

α. Διατυπώστε το Θεώρημα του Bolzano για μια συνάρτηση f η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$.

Μονάδες 3

β. Πότε μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της;

Μονάδες 2

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η εικόνα ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς συνάρτησης f είναι διάστημα

β. Αν f, g, h είναι τρεις συναρτήσεις και ορίζεται η $h \circ (g \circ f)$, τότε ορίζεται και η $(h \circ g) \circ f$ και αυτές είναι υποχρεωτικά ίσες.

γ. Μία συνάρτηση f είναι «1-1», αν και μόνο αν κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο.

δ. Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) \leq g(x)$ «κοντά»


στο x_0 , τότε: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

ε. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Ένας κολυμβητής K βρίσκεται στη θάλασσα 100ft μακριά από το πλησιέστερο σημείο A μιας ευθύγραμμης ακτής, ενώ το σπίτι του Σ βρίσκεται 300ft μακριά από το σημείο A . Υποθέτουμε ότι ο κολυμβητής μπορεί να κολυμβήσει με ταχύτητα 3ft/s και να τρέξει στην ακτή με ταχύτητα 5ft/s.



B1. Να αποδείξετε ότι για να διανύσει τη διαδρομή KMS του διπλανού σχήματος χρειάζεται χρόνο T :

$$T(x) = \frac{\sqrt{100^2 + x^2}}{3} + \frac{300 - x}{5}$$

Μονάδες 10

B2. Για ποια τιμή του x ο κολυμβητής θα χρειαστεί το λιγότερο δυνατό χρόνο για να φθάσει στο σπίτι του;

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Γ

Έστω η συνάρτηση: $f(x) = \ln(e^x - 1) - x$

Γ1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 3

Γ2. Να βρείτε το πρόσημο της f .

Μονάδες 4

Γ3. Μελετήστε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία..

Μονάδες 5

Γ4. Αποδείξτε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και βρείτε την $f^{-1}(x)$.

Μονάδες 4

Γ5. Αν $h(x) = \ln \frac{1}{x}$, αποδείξτε ότι υπάρχει $x_0 > 0$ τέτοιο, ώστε: $f(x_0) = h(x_0)$

Μονάδες 5

Γ6. Να βρείτε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(1)x^3 + x^2 + 2}{f(2)x^2 - x + 1}$

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Έστω f μία παραγωγίσιμη συνάρτηση ορισμένη στο \mathbb{R} για την οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$f'(x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1) \text{ και } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x)dx = 1 \quad (2)$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$ και $f'(0) = 1$.

Μονάδες 5

Δ2. Έστω η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$g(x) = f^2(x) + f^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

Να αποδείξετε ότι η g είναι σταθερή.

Μονάδες 5

Δ3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x)dx .$$

Μονάδες 5

Δ4. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = \frac{\pi}{2}$

Μονάδες 5

Δ5. Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(e^x)}{x}$$

Μονάδες 5

11° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι για κάθε πολυώνυμο:

$$P(x) = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0,$$

ισχύει: $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$ με $x_0 \in \mathbb{R}$.


Μονάδες 10

A2. Πότε μία συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ του πεδίου ορισμού της;

Μονάδες 5

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Δίνεται το παρακάτω σχήμα, τότε $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.



β. Αν η f δεν είναι αντιστρέψιμη, δεν είναι γνησίως μονότονη.

γ. Η f είναι «1-1» αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση $y = f(x)$ έχει ακριβώς μία λύση ως προς x .

δ. Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f στο σύνολο $A = [1, 4]$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [1, 4]$ και $f(3) = -2$. Τότε ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [1, 4]$

ε. Δίνεται η συνεχής και αντιστρέψιμη συνάρτηση f στο \mathbb{R} για την οποία ισχύει:

$$f^{-1}(-2015) = 4, \quad f^{-1}(1949) = -1,$$

τότε δεν υπάρχει $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) + 2f(x)\eta\mu x = x^2 + \sigma\upsilon\nu^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και } f(0) = 1$$

B1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) + \eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$$

διατηρεί σταθερό πρόσημο.

Μονάδες 10

B2. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \eta\mu x$

Μονάδες 5

B3. Να βρείτε τα όρια: $\alpha. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2 + \sigma\upsilon\nu x}{x}$ και $\beta. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \ln^2 x, & 0 < x < e \\ \alpha x + \ln(x - e + 1), & e < x \end{cases}$$

α. Να βρείτε τον αριθμό $\alpha \in \mathbb{R}$ έτσι, ώστε η συνάρτηση να είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 5

β. Αν $\alpha = \frac{3}{e}$, τότε η εξίσωση $f(x) = 6$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο διάστημα $(1, 2e)$.

Μονάδες 5

Γ2. Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύουν:

$$\diamond f(e^{f(x)}) = 4\ln x + 3, \text{ για κάθε } x > 0 \text{ και}$$

$$\diamond (f \circ f)(e^{f(x)}) = \ln(\ln x^4 + 3)^2 + 1, \text{ για κάθε } x > e^{-\frac{3}{4}}$$

α. Να αποδείξετε ότι η f είναι «1-1».

Μονάδες 5

β. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 3

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(f \circ f)(x) = f(e^{x-2014})$$

έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x, x \in \mathbb{R}.$$

Δ1. Να δείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 4

Δ2. Να βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης f στο $[0, +\infty)$.

Μονάδες 3

Δ3. Να δείξετε ότι $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$ (**Μονάδες 2**) και ότι η f είναι γνησίως

αύξουσα στο \mathbb{R} (**Μονάδες 5**).

Δ4. Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει:

$$\left(\sqrt{\alpha^2 + 1} + \alpha\right)\left(\sqrt{\beta^2 + 1} + \beta\right) = 1,$$

να αποδείξετε ότι $\alpha + \beta = 0$.

Μονάδες 5

Δ5. Να βρείτε την αντίστροφη της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

12^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ'ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

Μονάδες 10

A2. Πότε δύο συναρτήσεις f, g λέγονται ίσες;

Μονάδες 5

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

β. Αν η συνάρτηση f δεν είναι στο συνεχής x_0 , τότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

γ. Αν δεν υπάρχουν τα όρια των συναρτήσεων f, g στο x_0 , τότε δεν μπορεί να υπάρχει το όριο της $f + g$ στο x_0 .

δ. Αν υπάρχουν στο \mathbb{R} τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$, τότε υπάρχει και το όριο της g στο x_0 .

ε. Αν $f(x) = x^x$, $x > 0$, τότε $f'(x) = x \cdot x^{x-1}$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η γνησίως φθίνουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ώστε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να ισχύει η σχέση:

$$f(f(x)) = 2g(x) - x$$

B1. Να δείξετε ότι η g είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Μονάδες 5

B2. Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της συνάρτησης $h(x) = f(x) - g(x)$.

Μονάδες 5

B3. Έστω $x_0 \in \mathbb{R}$ με $f(x_0) = x_0$

α. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g τέμνονται σε ένα μόνο σημείο

Μονάδες 5

β. Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(f(x + x_0 - 2)) + x + x_0 = 2f(x + x_0 - 2) + 2$$

Μονάδες 5.

γ. Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(f(\ln x + x_0 + 1)) + \ln x + 1 < x_0$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{x+1}}{x}, & -1 \leq x < 0 \\ \alpha^2 \ln(x+e) + 2\alpha + (\beta^2 + \frac{1}{2})e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Γ1. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, να βρείτε τις τιμές των α και β

Μονάδες 8

Γ2. Αν $\alpha = -1$ και $\beta = 0$,

α. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x)+1}{x+1}$

Μονάδες 5

β. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον θετικό ημιάξονα Ox σε ένα τουλάχιστον σημείο.

Μονάδες 6

γ. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(xf(x) \eta \mu \frac{1}{x} \right)$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , της οποίας η γραφική παράσταση C_f διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$.

Δ1. α. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0} (xf'(x))$

Μονάδες 4

β. Να αποδείξετε ότι: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(2x) - 1}{x} = 4f'(0)$

Μονάδες 4

Δ2. Αν επιπλέον για την f ισχύει, $f^2(x) - 4f(x) = x^2 - 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε τον τύπο της.

Μονάδες 7

Δ3. Αν $f(x) = 2 - \sqrt{x^2 + 1}$, $x \in \mathbb{R}$

α. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f , οι οποίες διέρχονται από το σημείο $B\left(0, \frac{3}{2}\right)$.

Μονάδες 6

β. Έστω σημείο M της C_f με θετική τετμημένη. Αν η τετμημένη του M απομακρύνεται από την αρχή των αξόνων O με ταχύτητα 2cm/sec , να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου OAM .

Μονάδες 6

13° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Πότε η ευθεία $y = \lambda x + b$ λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$;

Μονάδες 4

A2. Έστω f, g συνεχείς συναρτήσεις στο $[\alpha, \beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των f, g και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$. Να ορίσετε το εμβαδόν του χωρίου Ω , αν η διαφορά $f(x) - g(x)$ δεν έχει σταθερό πρόσημο στο διάστημα $[\alpha, \beta]$.

Μονάδες 5

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνάρτηση 1-1, αν και μόνο αν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή: Αν $x_1 = x_2$, τότε $f(x_1) = f(x_2)$.

β. Αν για μία παραγωγίσιμη συνάρτηση f ισχύει $f(a) = f(b)$ με $a < b$, τότε ορίζεται η $\frac{1}{f'(x)}$ στο $[\alpha, b]$.

γ. Έστω η συνεχής συνάρτηση $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$.

Τότε η f παρουσιάζει ελάχιστο στο β .

δ. Κάθε συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα Δ έχει παράγουσα στο Δ .

ε. Για κάθε συνάρτηση f συνεχής στο $[\alpha, b]$ με $\int_{\alpha}^b f(x) dx > 0$ ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, b]$.

Μονάδες 10

A4.

α. Να χαρακτηρίσετε την επόμενη πρόταση ως Ψευδή ή Αληθή

«Για όλες τις συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f + g$ συνεχής στο $x_0 \in \mathbb{R}$, ισχύει ότι και η f και η g είναι επίσης συνεχείς συναρτήσεις στο x_0 ».


Μονάδες 2

β. Αν η παραπάνω πρόταση είναι αληθής να το αποδείξετε, ενώ αν είναι ψευδής να δώσετε κατάλληλο αντιπαράδειγμα.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Δύο πλοία Π_1 και Π_2 αναχωρούν συγχρόνως από ένα λιμάνι Λ . Το πλοίο Π_1 κινείται ανατολικά με ταχύτητα 15 km/h και το Π_2 βόρεια με ταχύτητα 20 km/h



B1. Να βρείτε τις συναρτήσεις θέσεως των $\Pi_1(t)$ και $\Pi_2(t)$ συναρτήσει του χρόνου t

Μονάδες 7

B2. Να βρείτε την απόσταση $d = (\Pi_1\Pi_2)$ των δύο πλοίων συναρτήσει του χρόνου t .

Μονάδες 8

B3. Να αποδείξετε ότι η απόσταση d αυξάνεται με σταθερό ρυθμό ως προς το χρόνο t τον οποίο και να προσδιορίσετε.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση g με $g(x) = f^2(x) - 4xf(x)$ έτσι, ώστε να ισχύουν:

$$\int_{\alpha}^x g(t)dt = 8 - x^3, \quad x, \alpha \in \mathbb{R} \quad (1) \quad \text{και} \quad f(-1) = -3 \quad \text{και} \quad f(1) = 1 \quad (2)$$

Γ1. Να αποδείξετε ότι η g έχει παράγουσα στο \mathbb{R} .

Μονάδες 4

Γ2. Αν η συνάρτηση G είναι παράγουσα της g στο \mathbb{R} , να βρείτε τον αριθμό α

Μονάδες 6

Γ3. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f

Μονάδες 8

Γ4. Αν $h(x) = e^x$, να κάνετε τη γραφική παράσταση της f και της h και να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C_f της f , τη γραφική παράσταση C_h της h και τις ευθείες $x = -1$ και $x = 1$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι «1-1».

Μονάδες 5

Δ2.

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα $x_0 \in (-2, 0)$

Μονάδες 5

β. Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(f(f(x))) > f(f(0)).$$

Μονάδες 5

Δ3. Αν για τη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(g(x) - 4x) = f(3 - x^2), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

να βρείτε το x_1 στο οποίο η συνάρτηση g παρουσιάζει μέγιστο.

Μονάδες 5

Δ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της της συνάρτησης $h = f^3 + f$ και τις ευθείες $x = -2$ και $x = 0$.

Μονάδες 5

14^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος του Rolle; Να δώσετε ένα σχετικό πρόχειρο σχήμα.

Μονάδες 6

A2. Έστω f μία συνεχής συνάρτηση στο $[\alpha, \beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από τις γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$.

Να ορίσετε το εμβαδόν του χωρίου Ω αν:

α. $f(x) \geq 0$ και **β.** $f(x) \leq 0$

Μονάδες 4

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη *Σωστό*, αν η πρόταση είναι σωστή, ή *Λάθος*, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Υπάρχει πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού μεγαλύτερου ή ίσο του 2, της οποίας η γραφική παράσταση έχει ασύμπτωτη.

β. Μια συνεχής συνάρτηση f στο (α, β) παίρνει σε κάθε περίπτωση στο (α, β) μία μέγιστη και μία ελάχιστη τιμή.

γ. Αν η f έχει δεύτερη παράγωγο στο x_0 , τότε η f' είναι συνεχής στο x_0 .

δ. Δεν μπορεί ταυτόχρονα στο ίδιο διάστημα $[\alpha, \beta]$ να ισχύουν το θεώρημα του Rolle και το θεώρημα του Bolzano.

ε. Αν υπάρχει $x_0 \in [\alpha, \beta]$, ώστε $f(x_0) \neq 0$, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f^2(x)dx > 0$.

Μονάδες 10

A4. Θεωρούμε τον επόμενο ισχυρισμό:

«*Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $A(x_0, f(x_0))$ μπορεί να έχει και άλλο κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση της f* »

α. Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι Ψευδής.

Μονάδες 1

β. Γράψτε παράδειγμα σχετικό με την απάντησή σας στο ερώτημα α.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Β

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 1} \text{ και } g(x) = \sqrt{e^{x-1} - 1}$$

B1. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 4

B2. Να ορίσετε την συνάρτηση $f \circ g$.

Μονάδες 8

B3. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν είναι αντιστρέψιμη ενώ η συνάρτηση g αντιστρέφεται και να βρείτε την g^{-1} .

Μονάδες 8

B4. Να λύσετε την εξίσωση:

$$g(\sqrt{x^3 + x}) = g(\sqrt{4x^2})$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g'(x) = \frac{1}{3g^2(x) + \varepsilon}, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και ε μια σταθερά στο σύνολο \mathbb{R} .

Αν η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της, στο σημείο της $A(0, g(0))$ έχει εξίσωση: $x - 2018y + 2018 = 0$.

Γ1. Να βρείτε τον αριθμό ε .

Μονάδες 4

Γ2. Να αποδείξετε ότι:

$$g^3(x) + 2015 \cdot g(x) = x + 2016 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 5

Γ3. Αν το σύνολο τιμών της συνάρτησης g είναι το \mathbb{R} , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g αντιστρέφεται και έχει τύπο:

$$g^{-1}(x) = x^3 + 2015x - 2016$$

Μονάδες 4

Γ4. Να βρείτε τα σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της g .

Μονάδες 6

Γ5. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{g^{-1}(x)}{x \cdot g(x) \cdot (g^2(x) + 2015)}$$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(0) = \frac{1}{2} \text{ και } e^x \cdot f'(x) = f(x) - f'(x), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

Μονάδες 5

Δ2.

α. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f και να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 4

β. Να λύσετε την ανίσωση: $f(f(x)) > \frac{\sqrt{e}}{1+\sqrt{e}}$

Μονάδες 4

Δ3. Αν $g(x) = \ln x$, $x > 0$, να δείξετε ότι: $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Μονάδες 3

Δ4.

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x$ έχει μοναδική ρίζα $x_0 \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 3

β. Να βρείτε συναρτήσει του x_0 , το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της της συνάρτησης f και τις ευθείες $y = x$ και $x = 0$.

Μονάδες 3

γ. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}} f^{-1}(x) dx$$

Μονάδες 3











15° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Πότε μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στα εσωτερικά σημεία του Δ , λέγεται κυρτή στο Δ ;

Μονάδες 4

A2. Να αντιστοιχίσετε καθεμιά από τις συναρτήσεις $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ σε εκείνη από τις συναρτήσεις A, B, Γ, Δ, E, Z που νομίζετε ότι είναι η παράγωγός της.



A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η γραφική παράσταση μιας πολυωνυμικής συνάρτησης περιπού βαθμού έχει πάντοτε οριζόντια εφαπτομένη.

β. Ισχύει: $\int_a^b (f(x) \cdot g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$

γ. Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $x = 0$.

δ. Ανάμεσα σε δυο ρίζες μιας πολυωνυμικής συνάρτησης, υπάρχει πάντα τουλάχιστο μια ρίζα της παραγώγου της.

ε. Μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[α, β]$ δεν έχει ασύμπτωτες.

Μονάδες 10

A4.

α. Να χαρακτηρίσετε την επόμενη πρόταση ως Ψευδή ή Αληθή.

Μονάδες 1


«Για όλες τις συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ όπου οι $f + g, g$ είναι συνεχείς στο $x_0 \in \mathbb{R}$, ισχύει ότι και η f είναι επίσης συνεχής στο x_0 ».

β. Αν η πρόταση είναι αληθής να το αποδείξετε, ενώ αν είναι ψευδής να δώσετε κατάλληλο αντιπαράδειγμα.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Β

Έστω η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f που δίνεται από το επόμενο σχήμα:



B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $\frac{1}{f'}$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

B2. Να λύσετε την ανίσωση $f'(x) > 0$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

B3. Υπάρχει $x_0 \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 0$; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

B4. Έχει αντίστροφη η συνάρτηση f ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f : f(x) = 3\ln(x \cdot e^{1-x}) + 2, x > 0$.

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 5

Γ2. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 5

Γ3. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης: $3f(x) + 2011 = 0$.

Μονάδες 5

Γ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C_f της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 2$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ έτσι ώστε να ισχύει:

$$f^3(x) + 2f(x) = x + 1 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} .$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι «1-1».

Μονάδες 3

Δ2. Να αποδείξετε ότι το σύνολο τιμών της f είναι το \mathbb{R} και στη συνέχεια να βρείτε την αντίστροφή της.

Μονάδες 5

Δ3. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης με το άξονα $x'x$.

Μονάδες 3

Δ4. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Μονάδες 4

Δ5. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = -1$.

Μονάδες 4

1.2. Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν $f'(x) > 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0, β) , τότε να αποδείξετε ότι το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f .

Μονάδες 7

A2. Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες;

Μονάδες 4

A3. Να διατυπώσετε το Θεώρημα της Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν G είναι μια παράγουσα της f στο $[\alpha, \beta]$, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt = G(\alpha) - G(\beta)$.

β. Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει:

$$f(x) \leq g(x) \text{ κοντά στο } x_0, \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

γ. Κάθε συνάρτηση f , για την οποία ισχύει:

$$f'(x) = 0 \text{ για κάθε } x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta),$$

είναι σταθερή στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$.

δ. Μια συνάρτηση f είναι «1-1», αν και μόνο αν, για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της, η εξίσωση $y = f(x)$ έχει ακριβώς μία λύση ως προς x .

ε. Αν η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[\alpha, \beta]$ μία μέγιστη τιμή M και μία ελάχιστη τιμή m .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$, $x \in \mathbb{R}$.

B1. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, τα διαστήματα στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα και τα ακρότατα της f .

Μονάδες 6

B2. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι κυρτή, τα διαστήματα στα οποία η f είναι κοίλη και να προσδιορίσετε τα σημεία καμπής της γραφικής της παράστασης.

Μονάδες 9

B3. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

B4. Με βάση τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα B1, B2, B3 να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f (Η γραφική παράσταση να σχεδιαστεί με στυλό).

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να λύσετε την εξίσωση: $e^{x^2} - x^2 - 1 = 0$, $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 4

Γ2. Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιούν την σχέση:

$$f^2(x) = (e^{x^2} - x^2 - 1)^2, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Γ3. Αν $f(x) = e^{x^2} - x^2 - 1$, $x \in \mathbb{R}$, να αποδειχθεί ότι η f είναι κυρτή.

Μονάδες 4

Γ4. Αν η f είναι η συνάρτηση του ερωτήματος Γ3, να λυθεί η εξίσωση:

$$f(|\eta\mu x|+3) - f(|\eta\mu x|) = f(x+3) - f(x), \text{ όταν } x \in [0, +\infty)$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει ότι:

- ♦ $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \cdot \eta\mu x dx = \pi$, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta\mu x} = 1$
- ♦ $e^{f(x)} + x = f(f(x)) + e^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ1. Να δείξετε ότι $f(\pi) = \pi$ (μονάδες 4) και $f'(0) = 1$ (μονάδες 3)

Μονάδες 7

Δ2. α) Να δείξετε ότι η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο \mathbb{R} (μονάδες 4)

β) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} (μονάδες 2)

Μονάδες 6

Δ3. Να βρείτε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{f(x)}$

Μονάδες 6

Δ4. Να δείξετε ότι: $0 < \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi^2$

Μονάδες 6

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

Μονάδες 7

A2. Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες;

Μονάδες 4

A3. Να διατυπώσετε το Θεώρημα της Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά.

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ισχύει: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 0$

β. Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

γ. Κάθε συνάρτηση f , για την οποία ισχύει:

$$f'(x) = 0, \text{ για κάθε } x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta),$$

είναι σταθερή στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$.

δ. Μια συνάρτηση f είναι «1-1», αν και μόνο αν, για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της, η εξίσωση $y = f(x)$ έχει ακριβώς μία λύση ως προς x .

ε. Αν η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[\alpha, \beta]$ μία μέγιστη τιμή M και μία ελάχιστη τιμή m .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

B1. Να βρείτε την τιμή του α , ώστε η f να είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

Μονάδες 7

B2. Αν $\alpha = 1$, να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

Μονάδες 11

B3. Για την παραπάνω τιμή του α , να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο $x_0 = 1$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$, $x \in \mathbb{R}$

Γ1. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως φθίνουσα και τα ακρότατα της f .

Μονάδες 7

Γ2. Να βρεθούν οι ρίζες και το πρόσημο της f'' .

Μονάδες 11

Γ3. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , για την οποία ισχύει:

$$f(x) \cdot f'(x) = x \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και } f(0) = 1$$

Δ1. Να δείξετε ότι: $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

Δ2. Για τις διάφορες πραγματικές τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x)$$

Μονάδες 7

Δ3. Να δείξετε ότι το σύνολο τιμών της f είναι το $[1, +\infty)$.

Μονάδες 6

Δ4. Να λυθεί η εξίσωση: $f(x) = \sin x$ στο \mathbb{R} .

Μονάδες 4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε να αποδείξετε ότι $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 7

A2. Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής.

Μονάδες 4

A3. Πότε λέμε ότι η ευθεία $y=1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - 1}{x} = 1$

β. Αν $f(x) = |x|$ για κάθε $x \neq 0$, τότε $f'(x) = \frac{1}{|x|}$ για κάθε $x \neq 0$.

γ. Αν η f δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0

δ. Υπάρχει πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού $n \geq 2$, η οποία έχει ασύμπτωτη.


ε. Για κάθε συνάρτηση f , συνεχή στο $[\alpha, \beta]$, ισχύει:

$$\text{αν } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0, \text{ τότε } f(x) > 0 \text{ στο } [\alpha, \beta]$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f .



B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 2

B2. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια.

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$

Για τα όρια που δεν υπάρχουν να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

B3. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια.

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$ β) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)}$ γ) $\lim_{x \rightarrow 8} f(f(x))$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B4. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η f δεν είναι συνεχής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

B5. Να βρείτε τα σημεία x_0 του πεδίου ορισμού της f για τα οποία ισχύει

$f'(x_0) = 0$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^3$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1» και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 6

Γ2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $f(\eta\mu x) > f\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)$

Μονάδες 9

Γ3. Ένα σημείο M κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = x^3$, $x \geq 0$ με $x = x(t)$ και $y = y(t)$. Να βρείτε σε ποιο σημείο της καμπύλης ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης $y(t)$ του M είναι ίσος με το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης $x(t)$, αν υποθεθεί ότι $x'(t) > 0$ για κάθε $t \geq 0$.

Μονάδες 4

Γ4. Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και άρτια συνάρτηση, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα: $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x} + 1, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ \frac{\ln x}{x-1}, & x > 1 \end{cases}$$

Δ1. Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$ και να βρείτε, αν υπάρχουν, τις κατακόρυφες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι το $x_0 = 1$ είναι το μοναδικό κρίσιμο σημείο της f .

Μονάδες 8

Δ3.

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $(0, +\infty)$.

Μονάδες 3

β. Αν E είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα των x και τις ευθείες $x = 1$ και $x = x_0$, όπου το x_0 η μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο $(0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι:

$$E = \frac{-x_0^2 - 2x_0 + 2}{2}$$

Μονάδες 4

Δ4. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο $[1, +\infty)$, να αποδείξετε ότι:

$$(x+1)F(x) > xF(1) + F(x^2), \text{ για κάθε } x > 1$$

Μονάδες 5

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε να αποδείξετε ότι $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 7

A2. Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής.

Μονάδες 4

A3. Πότε λέμε ότι η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - 1}{x} = 1$

β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$

γ. Αν η f δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0


δ. Υπάρχει πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού $n \geq 2$, η οποία έχει ασύμπτωτη.

ε. Οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$, που διχοτομεί τις γωνίες xOy και $x'Oy'$, όπου O η αρχή των αξόνων.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f .



B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 2

B2. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια.

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$

Για τα όρια που δεν υπάρχουν να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

B3. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια.

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$ β) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)}$ γ) $\lim_{x \rightarrow 8} f(f(x))$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B4. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η f δεν είναι συνεχής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

B5. Να βρείτε τα σημεία x_0 του πεδίου ορισμού της f για τα οποία ισχύει $f'(x_0) = 0$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & x \leq 0 \\ -x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

Γ1. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση f .

Μονάδες 8

Γ2. Να εξετάσετε αν για τη συνάρτηση f ικανοποιούνται οι υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής στο διάστημα $[-1, 1]$.

Μονάδες 8

Γ3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f η οποία διέρχεται από το σημείο $A\left(0, \frac{5}{4}\right)$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^3$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1» και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 6

Δ2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $f(\eta\mu x) > f\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)$

Μονάδες 9

Δ3. Ένα σημείο M κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = x^3$, $x \geq 0$ με $x = x(t)$ και $y = y(t)$. Να βρείτε σε ποιο σημείο της καμπύλης ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης $y(t)$ του M είναι ίσος με το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης $x(t)$, αν υποθεθεί ότι $x'(t) > 0$ για κάθε $t \geq 0$.

Μονάδες 4

Δ4. Να λυθεί στο \mathbb{R} η εξίσωση: $f\left(\frac{f(x)}{\sqrt{x^2 + 2}}\right) = f(x)$

Μονάδες 6

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι

παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}_1 = \mathbb{R} - \{x/\sigma\upsilon\nu x = 0\}$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$.

Μονάδες 10

A2. Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ;

Μονάδες 5

A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} = 1$

β. Το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ αποτελείται από όλα τα στοιχεία x του πεδίου ορισμού της f , για τα οποία το $f(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της g .

γ. Ένα τοπικό μέγιστο μιας συνάρτησης f μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο της f .

δ. Για κάθε συνάρτηση f που είναι γνησίως αύξουσα και παραγωγίσιμη στο διάστημα Δ ισχύει $f'(x) > 0$, για κάθε $x \in \Delta$.

ε. Για κάθε συνάρτηση f , συνεχή στο $[\alpha, \beta]$, ισχύει:

$$\text{Αν } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0, \text{ τότε } f(x) > 0 \text{ στο } [\alpha, \beta]$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha x - 1}{x + 1}, x \neq -1,$$

όπου το α είναι ένας πραγματικός αριθμός.

B1. Να βρείτε την τιμή του α , ώστε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από το σημείο $A(3, 2)$.

Μονάδες 5

Αν $\alpha = 3$, τότε:

B2. Να αποδείξετε ότι η f είναι «1-1».

Μονάδες 6

B3. Να αποδείξετε ότι η αντίστροφη συνάρτηση της f είναι η:

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3-x}, x \neq 3$$

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x + 1 - \frac{1}{x-2}, x > 2$$

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να αποδείξετε ότι η f είναι κοίλη στο διάστημα $(2, +\infty)$.

Μονάδες 6

Γ2. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

Γ3. Να υπολογίσετε το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και τις ευθείες $y = x + 1$, $x = \lambda$ και $x = \lambda + 1$ με $\lambda > 2$.

Μονάδες 8

Γ4. Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in (2, +\infty)$ ισχύει $E(\lambda) > \ln 2$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{x \ln x}{x-1}, & 0 < x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Μονάδες 8

Δ2. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Μονάδες 7

Δ3. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) + \ln x$.

Μονάδες 5

Δ4. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(e^x)}{e^{f(x)}}$.

Μονάδες 5

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

Μονάδες 7

A2. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Κάθε συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής στο x_0 , είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.»

α. Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής (**μονάδα 1**)

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για κάθε ζεύγος συναρτήσεων $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = 0$.

β. Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού Α, Β αντίστοιχα, τότε η $g \circ f$

ορίζεται αν $f(A) \cap B \neq \emptyset$

γ. Για κάθε συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι παραγωγίσιμη και δεν παρουσιάζει

ακρότατα, ισχύει $f'(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ. Αν $0 < \alpha < 1$, τότε $\lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x = +\infty$.

ε. Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \ln x, x > 0 \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x}{1-x}, x \neq 1$$

B1. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

Μονάδες 5

B2. Αν $h(x) = (f \circ g)(x) = \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$, $x \in (0,1)$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση

h αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της.

Μονάδες 6

B3. Αν $\varphi(x) = h^{-1}(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$, $x \in \mathbb{R}$, να μελετήσετε τη συνάρτηση φ ως προς

τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμψής.

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης φ και να τη σχεδιάσετε. (Η γραφική παράσταση να σχεδιαστεί με στυλό).

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = -\eta\mu x$, $x \in [0, \pi]$ και το σημείο $A\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ακριβώς δύο εφαπτόμενες (ε_1) , (ε_2) της γραφικής παράστασης της f που άγονται από το A , τις οποίες και να βρείτε.

Μονάδες 8

Γ2. Αν $(\varepsilon_1): y = -x$ και $(\varepsilon_2): y = x - \pi$ είναι οι ευθείες του ερωτήματος Γ1, τότε να σχεδιάσετε τις $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ τη γραφική παράσταση της f και να αποδείξετε ότι :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\pi^2}{8} - 1, \text{ όπου:}$$

- ♦ E_1 είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τις ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ και
- ♦ E_2 είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

Γ3. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x - \eta\mu x}{\pi - x - \eta\mu x}$

Μονάδες 4

Γ4. Να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > e - 1 - \pi$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x^4}, & x \in [-1, 0) \\ e^x \eta\mu x, & x \in [0, \pi] \end{cases}$$

Δ1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[-1, \pi]$ και να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της.

Μονάδες 5

Δ2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα, και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 6

Δ3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τη γραφική παράσταση της g , με $g(x)=e^{5x}$, $x \in \mathbb{R}$, τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $x = \pi$.

Μονάδες 6

Δ4. Να λύσετε την εξίσωση:

$$16e^{-\frac{3\pi}{4}} f(x) - e^{-\frac{3\pi}{4}} (4x - 3\pi)^2 = 8\sqrt{2} .$$

Μονάδες 8

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

Μονάδες 7

A2. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Κάθε συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής στο x_0 , είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό»

α. Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής (**μονάδα 1**)

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για κάθε ζεύγος συναρτήσεων $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = 0$.

β. Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού Α, Β αντίστοιχα, τότε η $g \circ f$ ορίζεται αν $f(A) \cap B \neq \emptyset$

γ. Για κάθε συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι παραγωγίσιμη και δεν παρουσιάζει ακρότατα, ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .

ε. Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος μέσω μιας συνεχούς μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + \beta, & x \leq 0 \\ x + 5, & x > 0 \end{cases}$$

B1. Να δείξετε ότι $\beta = 5$.

Μονάδες 8

B2. Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο $x_0 = 0$.

Μονάδες 9

B3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(1, f(1))$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad x \geq 1 \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{3-5x}{x-2}, \quad x \neq 2.$$

Γ1. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

Μονάδες 7

Γ2. Αν:

$$\varphi(x) = (f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}, \quad x \in \left[\frac{5}{6}, 2 \right),$$

να μελετήσετε τη συνάρτηση φ ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 10

Γ3. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \in [-1, 0) \\ \eta\mu x, & x \in [0, \pi] \end{cases}$$

Δ1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[-1, \pi]$ και να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της.

Μονάδες 8

Δ2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 7

Δ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, \pi)$, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το σημείο $M(0, 3)$.

Μονάδες 10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε να αποδείξετε ότι $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 7

A2. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Για κάθε συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , αν για κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι θέση σημείου καμπής της f »

α. Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα **A**, αν είναι αληθής, ή το γράμμα **Ψ**, αν είναι ψευδής (**μονάδα 1**)

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα **α** (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση:

Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$, τότε:

α. η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει λύση στο (α, β) .

β. η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία λύση στο (α, β) .

γ. η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο (α, β) .

δ. δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα για το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο (α, β) .

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν η G είναι μια παράγουσα της

$$f \text{ στο } [\alpha, \beta], \text{ τότε: } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = G(\beta) - G(\alpha).$$

β. Μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχουν $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$, ώστε $f(x_1) < f(x_2)$.

γ. Αν ένα σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση μιας αντιστρέψιμης συνάρτησης f , τότε το σημείο $M'(\beta, \alpha)$ ανήκει στη γραφική παράσταση C' της f^{-1} .

δ. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο (α, β) και $f(\alpha) = f(\beta)$, υπάρχει ακριβώς ένα $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = 0.$$


ε. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 0$, τότε:

$$f(x) = 0 \text{ για κάθε } x \in [\alpha, \beta].$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ του επόμενου σχήματος με πλευρά 2cm. Αν το τετράγωνο $EZH\Theta$ έχει τις κορυφές του στις πλευρές του $AB\Gamma\Delta$:



B1. Να εκφράσετε την πλευρά ΕΖ συναρτήσει του x .

Μονάδες 6

B2. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου ΕΖΗΘ δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 4, 0 \leq x \leq 2$$

Μονάδες 4

B3. Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του τετραγώνου ΕΖΗΘ γίνεται ελάχιστο και για ποιες μέγιστο.

Μονάδες 9


B4. Να εξετάσετε αν υπάρχει $x_0 \in [0, 2]$ για το οποίο το εμβαδόν $f(x_0)$ του αντίστοιχου τετραγώνου ΕΖΗΘ ισούται με $4e^{x_0} + 1 \text{ cm}^2$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Έστω συνάρτηση f ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, 3]$, για την οποία γνωρίζετε τα εξής:

- ♦ Η γραφική παράσταση της f δίνεται στο παρακάτω σχήμα:



- ♦ $f(0) = 2, f(1) = 0$

- ♦ Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ τη γραφικής παράστασης της f' και των ευθειών $x = 0$ και $x = 3$ ισούται με 8 τ.μ.
- ♦ Η f δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών στο διάστημα $[0, 3]$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι $f(3) = 2$, $f(2) = -2$ και να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια;

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) - 2}$$

δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 8

Γ2. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα, κυρτή, κοίλη και τις θέσεις τοπικών ακροτάτων και σημείων καμπής της f .

Μονάδες 8

Γ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (2, 3)$ για το οποίο δεν υπάρχει το

$$\text{όριο } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}.$$

Μονάδες 5

Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x} + \alpha, & -\frac{\pi}{2} \leq x < 0 \\ x^3 - 3x^2 + 2, & x > 0 \end{cases}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι η f στο διάστημα $[0, 2]$ ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής.

Μονάδες 2

Αν η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, τότε:

Δ2. Να βρείτε την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 2

Δ3. Να μελετήσετε τη μονοτονία της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

Δ4. Να αποδείξετε ότι:

$$\pi < \int_{-\frac{\pi}{2}}^2 f(x) dx < \frac{3\pi}{2} - 1$$

Μονάδες 7

Δ5. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f\left(-\frac{\pi}{2}x\right) = f\left(-\frac{\pi}{2}e^{-x}\right)$$

έχει μοναδική λύση στο $(0,1)$

Μονάδες 6

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε να αποδείξετε ότι $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 7

A2. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Για κάθε συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , αν για κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι θέση σημείου καμπής της f »

α. Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα **A**, αν είναι αληθής, ή το γράμμα **Ψ**, αν είναι ψευδής (**μονάδα 1**)

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα **α** (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση:

Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$, τότε:

α. η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει λύση στο (α, β) .

β. η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία λύση στο (α, β) .

γ. η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο (α, β) .

δ. δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα για το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο (α, β) .

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν η G είναι μια παράγουσα της f στο $[\alpha, \beta]$, τότε: $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = G(\beta) - G(\alpha)$.
- β. Μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχουν $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$, ώστε $f(x_1) < f(x_2)$.
- γ. Αν ένα σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση C μιας αντιστρέψιμης συνάρτησης f , τότε το σημείο $M'(\beta, \alpha)$ ανήκει στη γραφική παράσταση C' της f^{-1} .
- δ. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο (α, β) και $f(\alpha) = f(\beta)$, υπάρχει ακριβώς ένα $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε:
- $$f'(\xi) = 0$$
- ε. Για κάθε συνεχή συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 0$, τότε:
- $$f(x) = 0 \text{ για κάθε } x \in [\alpha, \beta].$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση: $h(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$, $x \in \mathbb{R}$

B1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση h ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 7

B2. Να βρείτε το σύνολο τιμών της h .

Μονάδες 7

B3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h .


Μονάδες 5

B4. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα: $\int_0^1 e^x h(x) dx$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται το τετράγωνο $ABΓΔ$ του επόμενου σχήματος με πλευρά 2cm . Αν το τετράγωνο $EZHΘ$ έχει τις κορυφές του στις πλευρές του $ABΓΔ$:



Γ1. Να εκφράσετε την πλευρά EZ συναρτήσει του x .

Μονάδες 6

Γ2. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου $EZHΘ$ δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 4, 0 \leq x \leq 2$$

Μονάδες 4

Γ3. Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του τετραγώνου $EZHΘ$ γίνεται ελάχιστο και για ποιες μέγιστο.

Μονάδες 9


Γ4. Να εξετάσετε αν υπάρχει $x_0 \in [0, 2]$ για το οποίο το εμβαδόν $f(x_0)$ του αντίστοιχου τετραγώνου $EZHΘ$ ισούται με $4e^{x_0} + 1 \text{ cm}^2$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Έστω συνάρτηση f ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, 3]$, για την οποία γνωρίζετε τα εξής:

Η γραφική παράσταση της f δίνεται στο παρακάτω σχήμα:



- ♦ $f(0) = 2, f(1) = 0$
- ♦ Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ τη γραφικής παράστασης της f' και των ευθειών $x = 0$ και $x = 3$ ισούται με 8 τ.μ.
- ♦ Η f δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών στο διάστημα $[0, 3]$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι $f(3) = 2, f(2) = -2$ και να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) - 2}$$

δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 8

Δ2. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα, κυρτή, κοίλη και τις θέσεις τοπικών ακροτάτων και σημείων καμπής της f .

Μονάδες 8

Δ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (2,3)$ για το οποίο δεν υπάρχει το

όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$.

Μονάδες 5

Δ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 4

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι, αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι συνεχής στο σημείο αυτό.

Μονάδες 7

A2. Θεωρείστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Κάθε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι «1-1» είναι και γνησίως μονότονη»

α) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι Ψευδής (**Μονάδα 1**)

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ με $x \in \mathbb{R}$ έχει μία μόνο θέση ολικού μεγίστου.

β. Για κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση f σε ένα διάστημα Δ , η οποία είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$.

γ. Ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x} = 0$

δ. Αν η f είναι αντιστρέψιμη συνάρτηση, τότε οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f^{-1} αντίστοιχα είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

ε. Κάθε κατακόρυφη ευθεία έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x - \frac{2}{x^2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

B1. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Μονάδες 8

B2. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 4

B3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

B4. Με βάση τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

(Η γραφική παράσταση να σχεδιαστεί με στυλό με μελάνι που δεν σβήνει)

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Έχουμε ένα σύρμα μήκους 8m , το οποίο κόβουμε σε δύο τμήματα. Με το ένα από αυτά, μήκους $x\text{ m}$, κατασκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο.

Γ1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, συναρτήσει του x , είναι:

$$E(x) = \frac{(\pi + 4)x^2 - 64x + 256}{16\pi}, \quad x \in (0, 8)$$

Μονάδες 5

Γ2. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με την διάμετρο του κύκλου.

Μονάδες 10

Γ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοπεί το σύρμα μήκους 8m , ώστε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων να ισούται με 5m^2 .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση :

$$f(x) = 2e^{x-\alpha} - x^2, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{με } \alpha > 1$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του $\alpha > 1$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.

Μονάδες 3

Δ2. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν μοναδικά $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ τέτοια, ώστε η συνάρτηση f να παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_1 και τοπικό ελάχιστο στο x_2

Μονάδες 7

Δ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = f(1)$ είναι αδύνατη στο (α, x_2) .

Μονάδες 6

Δ4. Αν $\alpha = 2$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_2^3 f(x) \sqrt{x-2} dx > -\frac{32}{15}$$

Μονάδες 9

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι, αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι συνεχής στο σημείο αυτό.

Μονάδες 7

A2. Θεωρείστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Κάθε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι «1-1» είναι και γνησίως μονότονη»

α) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι Ψευδής (**Μονάδα 1**)

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A3. Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ με $x \in \mathbb{R}$ έχει μία μόνο θέση ολικού μεγίστου.

β. Για κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση f σε ένα διάστημα Δ , η οποία είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$.

γ. Ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x} = 0$

δ. Αν η f είναι αντιστρέψιμη συνάρτηση, τότε οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f^{-1} αντίστοιχα είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

ε. Κάθε κατακόρυφη ευθεία έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2\alpha x + 6, & x \leq 3 \\ -x^2 + (3 - \alpha)x + 3\alpha, & x > 3 \end{cases} \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}.$$

B1. Να αποδείξετε ότι $\alpha = -1$.

Μονάδες 6

B2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} .

Μονάδες 9

B3. Να μελετήσετε τη μονοτονία της συνάρτησης f στο $[3, +\infty[$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x - \frac{2}{x^2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Γ1. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Μονάδες 8

Γ2. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 4

Γ3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

Γ4. Με βάση τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

(Η γραφική παράσταση να σχεδιαστεί με στυλό με μελάνι που δεν σβήνει)

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Έχουμε ένα σύρμα μήκους 8 m , το οποίο κόβουμε σε δύο τμήματα. Με το ένα από αυτά, μήκους x m , κατασκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο.

Δ1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, συναρτήσει του x , είναι:

$$E(x) = \frac{(\pi + 4)x^2 - 64x + 256}{16\pi}, x \in (0,8)$$

Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με την διάμετρο του κύκλου.

Μονάδες 10

Δ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοπεί το σύρμα μήκους 8 m , ώστε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων να ισούται με 5 m^2 .

Μονάδες 1

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α


A1. Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν η f' διατηρεί πρόσημο στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, να αποδείξετε ότι το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο και ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) .

Μονάδες 7


A2. Έστω A ένα μη κενό υποσύνολο του \mathbb{R} . Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A ;

Μονάδες 4


A3. Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g, F, G, H, T .




(f)




(g)




(F)



(G)



(H)



(T)

Να γράψετε στο τετράδιό σας ποια από τις συναρτήσεις F, G, H, T μπορεί να είναι η παράγωγος της συνάρτησης f και ποια της g.

Μονάδες 4

A4. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

« Για κάθε ζεύγος πραγματικών συναρτήσεων $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty, \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = 0 \text{ »}$$

- α) Να χαρακτηρίσετε τον ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής. **(μονάδα 1)**
- β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α **(μονάδες 3)**

Μονάδες 4

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μπορεί να τέμνει την ασύμπτωσή της.
- β. Αν μια συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1», τότε κάθε οριζόντια ευθεία

τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο.

γ. Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $[0, 1]$ και σύνολο τιμών το $[2, 3]$, τότε ορίζεται η $f \circ g$ με πεδίο ορισμού το $[0, 1]$ και σύνολο τιμών το $[2, 3]$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x}, & x > 1 \\ x^2 + 1, & x \leq 1 \end{cases}$$

B1. Να υπολογίσετε το $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής.

Στα παρακάτω ερωτήματα θεωρήστε ότι $\alpha = 1$

Μονάδες 3

B2. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος του

Rolle στο διάστημα $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$.

Μονάδες 6

B3. Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της f στα οποία η εφαπτομένη είναι παράλληλη προς την ευθεία και να γράψετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στα σημεία αυτά.

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = 2\eta\mu x - x$.

Γ1. Να βρείτε τα ακρότατα της f (τοπικά και ολικά).

Μονάδες 5

Γ2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 \in [0, \pi]$ η γραφική παράσταση της f και η εφαπτομένη της στο $A(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.

Μονάδες 5

Γ3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin x dx$$

Μονάδες 8

Γ4. α. Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad (\text{μονάδες } 2)$$

β. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - f(2x) \cdot \ln x] \quad (\text{μονάδες } 5)$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$$

Δ1. Να αποδείξετε ότι:

$$\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}, \text{ για κάθε } x > 0.$$

Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και ότι το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το διάστημα $(0, 1)$.

Μονάδες 5

Δ3. Να αποδείξετε ότι: $f(x) > 2^{f(x)} - 1$, για κάθε $x > 0$.

Μονάδες 5

Δ4. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{f(\alpha)}{x-1} + \frac{f^{-1}(\alpha)}{x-2} + \frac{\eta\mu(\pi\alpha)}{x} = 0, \text{ όπου } 0 < \alpha < 1,$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες ως προς x , μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο διάστημα $(1, 2)$

Μονάδες 5

Δ5. Αν F είναι μια αρχική συνάρτηση της f στο διάστημα $(0, +\infty)$ με $F(e) = e \ln 2$, να αποδείξετε ότι:

$$\ln 2 < F(1) < \ln \left(\frac{2^{e+1}}{e+1} \right).$$

Μονάδες 5

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2018

ΘΕΜΑ Α


A1. Έστω μία συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν η f' διατηρεί πρόσημο στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, να αποδείξετε ότι το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο και ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) .

Μονάδες 7


A2. Έστω A ένα μη κενό υποσύνολο του \mathbb{R} . Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A ;

Μονάδες 4


A3. Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g, F, G, H, T .




(f)




(g)




(F)



(G)



(H)



(T)

Να γράψετε στο τετράδιό σας ποια από τις συναρτήσεις F, G, H, T μπορεί να είναι η παράγωγος της συνάρτησης f και ποια της g .

Μονάδες 4

A4. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

« Για κάθε ζεύγος πραγματικών συναρτήσεων $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, αν ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty, \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = 0$$

α) Να χαρακτηρίσετε τον ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα A, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής (**μονάδα 1**)

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α (**μονάδες 3**)

Μονάδες 4

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μπορεί να τέμνει την ασύμπτωσή της.

β. Αν μια συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1», τότε κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο.

γ. Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $[0,1]$ και σύνολο τιμών το $[2,3]$, τότε ορίζεται η $f \circ g$ με πεδίο ορισμού το $[0,1]$ και σύνολο τιμών το $[2,3]$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x}, & x > 1 \\ x^2 + 1, & x \leq 1 \end{cases}$$

B1. Να υπολογίσετε το $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής.

Στα παρακάτω ερωτήματα θεωρήστε ότι $\alpha = 1$

Μονάδες 3

B2. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$.

Μονάδες 6

B3. Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της f στα οποία η εφαπτομένη είναι παράλληλη προς την ευθεία $y = -\frac{1}{4}x + 2018$ και να γράψετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στα σημεία αυτά.

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και ότι το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το διάστημα $(e, +\infty)$.

Μονάδες 7

Γ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{f(\alpha)}{x-1} + \frac{f^{-1}(\alpha)}{x-2} + \frac{\eta\mu\alpha - 2}{x} = 0, \text{ όπου } \alpha > e$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες ως προς x , μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο διάστημα $(1, 2)$.

Μονάδες 10

Γ3. Να αποδείξετε ότι: $f(x) + 1 > e + \ln x$ για κάθε $x > 1$

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = 2\eta\mu x - x$.

Δ1. Να βρείτε τα ακρότατα της f (τοπικά και ολικά).

Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 \in [0, \pi]$ η γραφική παράσταση της f και η εφαπτομένη της στο $A(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.

Μονάδες 5

Δ3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^{\pi} f(x) \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$$

Μονάδες 8

Δ4. α) Να αποδείξετε ότι :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \text{ (μονάδες 2)}$$

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - f(2x) \cdot \ln x] \text{ (μονάδες 5)}$$

Μονάδες 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

2.1. Λύσεις Προτεινόμενων Διαγωνισμάτων

2.2. Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

2.1. Λύσεις Προτεινόμενων Διαγωνισμάτων

1° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται συνάρτηση «1-1», όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή: «Αν $x_1 \neq x_2$, τότε $f(x_1) \neq f(x_2)$ »

A2. Το $\int_a^\beta c dx$ εκφράζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με βάση $\beta - \alpha$ και ύψος c .

A3. Για $x \neq x_0$, ισχύει :

$$\begin{aligned} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Επειδή οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , έχουμε :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0)$$

Δηλαδή:

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

A4.α) Σωστό β) Λάθος γ) Σωστό δ) Λάθος ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. Για το πεδίο ορισμού D_f της f έχουμε:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x+1}{1-x} > 0 \\ 1-x \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (x+1)(1-x) > 0 \\ x \neq 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

Επομένως $D_f = (-1, 1)$

B2. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $D_f = (-1, 1)$ ως πράξεις και σύνθεση συνεχών συναρτήσεων αφού οι επόμενες συναρτήσεις:

$$g(x) = \frac{x+1}{1-x}$$

$$h(x) = \ln g(x)$$

$$\Phi(x) = 2 \ln g(x) + 3$$

είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού της.

B3. Έστω $x_1, x_2 \in D_f = (-1, 1)$ με $f(x_1) = f(x_2)$ Θα αποδείξουμε ότι $x_1 = x_2$ Έχουμε:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow 2 \ln \frac{x_1+1}{1-x_1} + 3 = 2 \ln \frac{x_2+1}{1-x_2} + 3 \Leftrightarrow \ln \frac{x_1+1}{1-x_1} = \ln \frac{x_2+1}{1-x_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_1+1}{1-x_1} = \frac{x_2+1}{1-x_2} \Leftrightarrow (x_1+1)(1-x_2) = (1-x_1)(x_2+1) \Leftrightarrow 2x_1 = 2x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η f αντιστρέφεται.

Για την αντίστροφη της έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = 2 \ln \frac{x+1}{1-x} + 3 \Leftrightarrow 2 \ln \frac{x+1}{1-x} = y-3 \Leftrightarrow \ln \frac{x+1}{1-x} = \frac{y-3}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{1-x} = e^{\frac{y-3}{2}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+1 = (1-x)e^{\frac{y-3}{2}} \Leftrightarrow x+1 = e^{\frac{y-3}{2}} - xe^{\frac{y-3}{2}} \Leftrightarrow x + xe^{\frac{y-3}{2}} = e^{\frac{y-3}{2}} - 1 \Leftrightarrow x \left(1 + e^{\frac{y-3}{2}} \right) = e^{\frac{y-3}{2}} - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{e^{\frac{y-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{y-3}{2}}}$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow -1 < \frac{e^{\frac{y-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{y-3}{2}}} < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{e^{\frac{y-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{y-3}{2}}} < 1 \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \frac{e^{\frac{y-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{y-3}{2}}} < 1 \\ -1 < \frac{e^{\frac{y-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{y-3}{2}}} \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} e^{\frac{y-3}{2}} - 1 < 1 + e^{\frac{y-3}{2}} \\ -1 - e^{\frac{y-3}{2}} < e^{\frac{y-3}{2}} - 1 \end{array} \right)$$

Οι τελευταίες σχέσεις είναι αληθείς για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως:

$$f^{-1}(x) = \frac{e^{\frac{x-3}{2}} - 1}{1 + e^{\frac{x-3}{2}}}, x \in \mathbb{R}$$

Η $f^{-1}(x)$ είναι συνεχής στο \mathbb{R} ως πηλίκο και σύνθεση των επόμενων συνεχών συναρτήσεων:

$$f_1(x) = e^{\frac{x-3}{2}}, f_2(x) = \frac{e^x - 1}{1 + e^x}$$

B4. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(2 \ln \frac{x+1}{1-x} + 3 \right) = \lim_{u \rightarrow \infty} (2u + 3) = +\infty \left(u = \frac{x+1}{1-x}, \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{1-x} = +\infty \right)$$

Επίσης:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(2 \ln \frac{x+1}{1-x} + 3 \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} (2 \ln u + 3) = -\infty$$

$$\left(u = \frac{x+1}{1-x}, \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+1}{1-x} = 0 \right)$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η συνάρτηση f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln x}, & \text{αν } x > 0 \text{ και } x \neq 1 \\ \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln(-x)}, & \text{αν } x < 0 \\ \kappa, & \text{αν } x = 1 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

Για το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ έχουμε:

$$\diamond \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln x} = 0$$

αφού $\lim_{x \rightarrow 0^+} [e^{-x^2+1}(x-1)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x^2+1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = e \cdot (-1) = -e$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$.

$$\diamond \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln(-x)} = 0$$

αφού $\lim_{x \rightarrow 0^-} [e^{-x^2+1}(x-1)] = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-x^2+1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = e \cdot (-1) = -e$ και

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (\ln(-x)) = -\infty$$

Επομένως είναι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ και άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων. Επίσης η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, αφού $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. Τέλος για να είναι η f συνεχής σε όλο το \mathbb{R} πρέπει να είναι συνεχής και στο $x_1 = 1$.

Έχουμε, σύμφωνα με τον κανόνα του de L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{-x^2+1}(-2x^2+2x+1)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} [e^{-x^2+1}(-2x^2+2x+1)x] = 1$$

Επομένως $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = \kappa \Leftrightarrow \kappa = 1$

Γ2. α) Η συνάρτηση: $g(x) = f(x) \ln\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $x > 0$

γίνεται διαδοχικά:

Για $x = 1$ έχουμε $g(1) = f(1) \cdot \ln 1 = 0$ και

$$g(x) = \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln|x|} \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln x} (\ln 1 - \ln x^2) = \frac{e^{-x^2+1}(x-1)}{\ln x} (-2 \ln x) = -2e^{-x^2+1}(x-1)$$

Επομένως θα μελετήσουμε τη μονοτονία της συνάρτησης:

$$g(x) = -2e^{-x^2+1}(x-1), \quad x > 0$$

Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο $(0, \infty)$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$g'(x) = -2 \left[-2x(x-1)e^{-x^2+1} + e^{-x^2+1} \right] = -2e^{-x^2+1}(-2x^2 + 2x + 1), \quad x > 0$$

Επειδή $-2e^{-x^2+1} < 0$, για $x > 0$ το πρόσημο της $g'(x)$ εξαρτάται από το πρόσημο του τριωνύμου $-2x^2 + 2x + 1$

Ο πίνακας προσήμου της $g'(x)$ είναι ο επόμενος:

	0	$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$
x			
$g'(x)$	-		+
$g(x)$	↘		↗

Επομένως η συνάρτηση g είναι:

Γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left(0, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$ και

Γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[\frac{1+\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$

β) Σύμφωνα με τον πίνακα προσήμου της $g'(x)$ του ερωτήματος (i) η συνάρτηση g έχει ελάχιστο

(ολικό) στο σημείο $x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ το $g\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) = e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(1-\sqrt{3})$

Επομένως για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$g(x) \geq g\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \Leftrightarrow -2e^{-x^2+1}(x-1) \geq e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(1-\sqrt{3}) \Leftrightarrow e^{-x^2+1}(x-1) \leq \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}-1)}{2}$$

Άρα:

♦ Για $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ έχουμε:

$$e^{-x^2+1} \leq \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}-1)}{2(x-1)}$$

♦ Για $x-1 < 0$ και $x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ έχουμε:

$$e^{-x^2+1} \geq \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}-1)}{2(x-1)}$$

Γ3. α) Η $g'(x)$ είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x > 0$ ή αλλιώς η $g(x)$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη για κάθε $x > 0$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$g''(x) = -4e^{-x^2+1}(2x^3 - 2x^2 - 3x + 1) = -4e^{-x^2+1}(2x^3 - 2x^2 - 3x + 1) = -4e^{-x^2+1}(x+1)(2x^2 - 4x + 1), x > 0$$

Επειδή $-4e^{-x^2+1} < 0$ για $x > 0$ και $x+1 > 0$ το πρόσημο της $g''(x)$ εξαρτάται από το πρόσημο του $2x^2 - 4x + 1$

Ο πίνακας του προσήμου της $g''(x)$ είναι ο επόμενος:

0	$\frac{2-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{2+\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
x			
$g''(x)$	-	+	-
$g(x)$	∩	∪	∩

Επομένως η συνάρτηση g :

- ♦ Είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο διάστημα $\left(0, \frac{2-\sqrt{2}}{2}\right]$
- ♦ Είναι κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω) στο διάστημα $\left[\frac{2+\sqrt{2}}{2}, \frac{2-\sqrt{2}}{2}\right]$
- ♦ Είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο διάστημα $\left[\frac{2+\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$
- ♦ Τα σημεία καμπής της είναι το $A\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, g\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)\right)$ ή το $A\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}e^{\frac{2\sqrt{2}-1}{2}}\right)$ και το $B\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, g\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)\right)$ ή το $B\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{2}e^{\frac{1+2\sqrt{2}}{2}}\right)$

β) Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σημείο $A(2, g(2))$ είναι:

$$y - g(2) = g'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y + 2e^{-3} = 6e^{-3}(x - 2) \Leftrightarrow y = 6e^{-3}x - 14e^{-3}$$

Επειδή η g είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο διάστημα $\left[\frac{2+\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$ θα είναι:

$$y \geq g(x) \Leftrightarrow 6e^{-3}x - 14e^{-3} \geq -2e^{-x^2+1}(x-1) \Leftrightarrow -3e^{-3}x + 7e^{-3} \leq e^{-x^2+1}(x-1) \Leftrightarrow e^{-4}(-3x+7) \leq e^{-x^2}(x-1)$$

$$\text{, για κάθε } x \in \left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, +\infty \right)$$

Επίσης, η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σημείο $B(1, g(1))$ είναι:

$$y - g(1) = g'(1)(x-1) \Leftrightarrow y = -2(x-1)$$

Επειδή η g είναι κυρτή (στέφει τα κοίλα άνω) στο διάστημα $\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, 1 \right) \subset \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, \frac{2+\sqrt{2}}{2} \right)$

θα είναι:

$$y \leq g(x) \Leftrightarrow -2(x-1) \leq -2e^{-x^2+1}(x-1) \Leftrightarrow x-1 \geq e^{-x^2+1}(x-1) \Leftrightarrow 1 \leq e^{-x^2+1} \Leftrightarrow e^{-x^2} \geq e^{-1}$$

για κάθε $x < 1$ αφού $x-1 < 0$.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Αφού η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ το 1^ο μέλος της δοθείσας σχέσης είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων), όπως προφανώς παραγωγίσιμη είναι η συνάρτηση του 2^{ου} μέλους. Παραγωγίζοντας¹ λοιπόν τα μέλη της δοθείσας σχέσης έχουμε διαδοχικά (όχι ισοδύναμα):

$$e^{f(x)}(f^2(x) - 2f(x) + 3) = x$$

$$e^{f(x)}f'(x)[f^2(x) - 2f(x) + 3] + e^{f(x)}[2f(x)f'(x) - 2f'(x)] = 1$$

$$e^{f(x)}[f'(x)f^2(x) - 2f(x)f'(x) + 3f'(x) + 2f(x)f'(x) - 2f'(x)] = 1$$

$$e^{f(x)}[f'(x)f^2(x) + f'(x)] = 1 \Leftrightarrow e^{f(x)}f'(x)(f^2(x) + 1) = 1$$

$$f'(x) = \frac{e^{-f(x)}}{f^2(x) + 1} > 0, x \in (0, \infty)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \infty)$ άρα είναι «1-1» και επομένως είναι αντιστρέψιμη.

Για την εύρεση της αντίστροφης συνάρτησης θέτουμε:

$$f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \text{ με } x \in A = (0, \infty) \text{ και } y \in f(A) = \mathbb{R}$$

Άρα, θα έχουμε από την δοθείσα σχέση:

$$e^y(y^2 - 2y + 3) = f^{-1}(y), y \in \mathbb{R} \text{ ή } f^{-1}(x) = e^x(x^2 - 2x + 3), x \in \mathbb{R}$$

Δ2. Η συνάρτηση:

$$f^{-1}(x) = e^x(x^2 - 2x + 3), x \in \mathbb{R}$$

Είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$(f^{-1}(x))' = e^x(x^2 - 2x + 3) + e^x(2x - 2) = e^x(x^2 + 1), x \in \mathbb{R}$$

¹ Μπορεί να αποδειχθεί και χωρίς την παραγωγισιμότητα της f με ιδιότητες της ισότητας.

Η συνάρτηση $(f^{-1}(x))'$ είναι επίσης παραγωγίσιμη \mathbb{R} (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$(f^{-1}(x))'' = e^x(x^2 + 1) + 2xe^x = e^x(x+1)^2, x \in \mathbb{R}$$

Δηλαδή:

$$(f^{-1}(x))'' > 0, x \in (-\infty, -1) \text{ και } x \in (-1, +\infty)$$

που σημαίνει ότι η $f^{-1}(x)$ είναι κυρτή στο $(-\infty, -1]$ και στο $[-1, +\infty)$ (δηλαδή στρέφει τα κοίλα άνω στο \mathbb{R}).

Η συνάρτηση $f^{-1}(x)$ τέμνει τον άξονα $x'x$ όταν $x = 0 \Rightarrow f^{-1}(0) = 3$ δηλαδή στο σημείο $A(0, 3)$. Αν θέσουμε $g(x) = f^{-1}(x)$, $x \in \mathbb{R}$ τότε η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της g στο σημείο A είναι :

$$y - 3 = g'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = x + 3 \quad (g'(0) = (f^{-1})'(0) = 3)$$

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 |f^{-1}(x) - (x+3)| dx = \int_0^1 [e^x(x^2 - 2x + 3) - x - 3] dx = \\ &= \int_0^1 x^2 e^x dx - 2 \int_0^1 x e^x dx + 3 \int_0^1 e^x - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 - 3[x]_0^1 = 4e - \frac{21}{2} \tau. \mu \end{aligned}$$

(χρησιμοποιήσαμε το γεγονός

ότι η f^{-1} είναι κυρτή δηλαδή ότι: $f^{-1}(x) \geq x + 3$, $x \in \mathbb{R}$ άρα $f^{-1}(x) - (x+3) \geq 0$, $x \in (0, 1)$

Δ3. α) Έχουμε:

$$f'(x) = \frac{e^{-f(x)}}{f^2(x)+1}, x \in (0, \infty) \text{ και } (f^{-1}(x))' = e^x(x^2 + 1), x \in \mathbb{R}$$

$$f'(f^{-1}(x)) = \frac{e^{-f(f^{-1}(x))}}{[f(f^{-1}(x))]^2 + 1} = \frac{e^{-x}}{x^2 + 1}$$

Άρα :

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot [f^{-1}(x)]' = \frac{e^{-x}}{x^2 + 1} \cdot e^x(x^2 + 1) = 1$$

β) Η απόσταση των σημείων A και B είναι :

$$(AB)^2 = 2(x - f^{-1}(x))^2, x \in \mathbb{R}$$

$$(AB) = \sqrt{2} |x - f^{-1}(x)|, x \in \mathbb{R}$$

$$(AB) = \sqrt{2} (f^{-1}(x) - x), x \in \mathbb{R}$$

(Χρησιμοποιήσαμε $f^{-1}(x) \geq x + 3 > x$, $x \in \mathbb{R} \Rightarrow f^{-1}(x) - x > 0$.

Αν θέσουμε :

²Αυτό το συμπέρασμα ισχύει και γενικότερα αφού: $f(f^{-1}(x)) = x$, $x \in D_{f^{-1}}$ και παραγωγίζοντας τα

μέλη της έχουμε $f'(f^{-1}(x)) \cdot [f^{-1}(x)]' = 1$.

Επίσης τα σημεία $A(x, f^{-1}(x))$ και $B(f^{-1}(x), x)$ είναι συμμετρικά ως προς την $y = x$.

$$h(x) = \sqrt{2}(f^{-1}(x) - x) = \sqrt{2}[e^x(x^2 - 2x + 3) - x], x \in \mathbb{R}$$

θα έχουμε ότι η $h(x)$ είναι παραγωγίσιμη (ως πράξεις παραγωγίσιμων) με:

$$h'(x) = \sqrt{2}[e^x(x^2 + 1) - 1], x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ μοναδικό,}$$

διότι η συνάρτηση: $\varphi(x) = e^x(x^2 + 1) - 1, x \in \mathbb{R}$ είναι συνάρτηση «1-1», αφού η

$\varphi'(x) = e^x(x+1)^2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και άρα γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Τώρα έχουμε:

♦ Είναι:

$$\begin{aligned} x < 0 &\Rightarrow \varphi(x) < \varphi(0) \Rightarrow \varphi(x) < 0 \Rightarrow e^x(x^2 + 1) - 1 < 0 \\ &\Rightarrow \sqrt{2}[e^x(x^2 + 1) - 1] < 0 \end{aligned}$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.

♦ Είναι:

$$\begin{aligned} x > 0 &\Rightarrow \varphi(x) > \varphi(0) \Rightarrow \varphi(x) > 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow e^x(x^2 + 1) - 1 > 0 \Rightarrow \sqrt{2}[e^x(x^2 + 1) - 1] > 0 \end{aligned}$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$ και επομένως η συνάρτηση $h(x)$ (μπορεί να φανεί πιο καθαρά από τον πίνακα προσήμου της $h'(x)$) έχει ελάχιστο στο $x_0 = 0$, το

$$h(0) = \sqrt{2}(f^{-1}(0)) = 3\sqrt{2} \text{ δηλαδή } (AB)_{\min} = 3\sqrt{2}.$$

2^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει:

$$F'(x) = f(x), \text{ για κάθε } x \in \Delta.$$

A2.

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα διάστημα Δ και x_0 ένα **εσωτερικό** σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει **τοπικό ακρότατο** στο x_0 και είναι **παραγωγίσιμη** στο σημείο αυτό, τότε:
 $f'(x_0) = 0$.

Απόδειξη:

Ας υποθέσουμε ότι η f παρουσιάζει στο x_0 τοπικό μέγιστο. Επειδή το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ και η f παρουσιάζει σ' αυτό τοπικό μέγιστο, υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε:

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq \Delta \text{ και } f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \quad (1)$$

Επειδή, επιπλέον, η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , ισχύει

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Επομένως,

— αν $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, τότε, λόγω της (1), θα είναι $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$, οπότε θα έχουμε:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad (2)$$

— αν $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, τότε, λόγω της (1), θα είναι $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$, οπότε θα έχουμε:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad (3)$$

Έτσι, από τις (2) και (3) έχουμε $f'(x_0) = 0$

A3. α. Σωστό. **β.** Λάθος. **γ.** Σωστό. **δ.** Σωστό. **ε.** Σωστό.

ΘΕΜΑ Β

B1. Πρέπει να ισχύει: $e^x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 2 \Leftrightarrow x \geq \ln 2$. Επομένως $D_f = [\ln 2, +\infty)$

B2. Θα εξετάσουμε την μονοτονία της f . Έχουμε διαδοχικά:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \Leftrightarrow e^{x_1} - 2 < e^{x_2} - 2 \Leftrightarrow \sqrt{e^{x_1} - 2} < \sqrt{e^{x_2} - 2} \Leftrightarrow \sqrt{e^{x_1} - 2} + 3 < \sqrt{e^{x_2} - 2} + 3$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[\ln 2, +\infty)$.

Σημείωση: Μπορεί, πιο εύκολα, η μονοτονία της συνάρτησης f να προκύψει και ως εξής:

Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη (ως σύνθεση και πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$f'(x) = \frac{2e^x}{\sqrt{e^x - 2}}, \quad x > \ln 2 .$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[\ln 2, +\infty)$.

Έτσι το σύνολο τιμών της f είναι το διάστημα $\left[f(\ln 2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$ με

$$f(\ln 2) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4\sqrt{e^x - 2} + 3 \right) = +\infty, \quad \text{δηλαδή το σύνολο τιμών είναι το}$$

διάστημα $[3, +\infty)$.

Η f δεν έχει ρίζες αφού $f(x) \geq 3$, για κάθε $x \in [\ln 2, +\infty)$.

B3. Για κάθε $y \in [3, +\infty)$ έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = 4\sqrt{e^x - 2} + 3 \Leftrightarrow \frac{y-3}{4} = \sqrt{e^x - 2} \Leftrightarrow \left(\frac{y-3}{4} \right)^2 = e^x - 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^x = \left(\frac{y-3}{4} \right)^2 + 2 \Leftrightarrow x = \ln \left[\left(\frac{y-3}{4} \right)^2 + 2 \right] \end{aligned}$$

Επομένως:

$$f^{-1}(x) = \ln \left[\left(\frac{x-3}{4} \right)^2 + 2 \right], \quad x \in [3, +\infty)$$

B4. Η συνάρτηση g είναι άρτια, αφού:

$$g(x) = g(-x) = \frac{1}{x^2} + 2, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^* .$$

Επομένως η g δεν είναι αντιστρέψιμη.

B4. Για το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ έχουμε:

$$D_{f \circ g} = \left\{ x \in D_g / g(x) \in D_f \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \frac{1}{x^2} + 2 \geq \ln 2 \right\} = \mathbb{R}^*$$

(αφού $\frac{1}{x^2} + 2 > 1$, $\ln 2 < 1$ είναι πάντα αληθείς)

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ έχουμε:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 4\sqrt{e^{\frac{1}{x^2} + 2} - 2} + 2$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έχουμε αφού $x > 0$:

$$2x \ln x + \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow 2x^2 \ln x + 1 > 0 ,$$

οπότε θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = 2x^2 \ln x + 1, \quad x > 0 ,$$

Η g είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$g'(x) = 4x \ln x + 2x = 2x \cdot (2 \ln x + 1)$$

και έχουμε ($x > 0$):

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x \ln x + 2x = 2x \cdot (2 \ln x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

και

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x \cdot (2 \ln x + 1) > 0 \Leftrightarrow \ln x > -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x > e^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x > \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$g'(x) < 0 \Leftrightarrow 2x \cdot (2 \ln x + 1) < 0 \Leftrightarrow \ln x < -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x < e^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x < \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ και γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$, και επειδή είναι συνεχής στο $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ παρουσιάζει στο σημείο αυτό ολικό ελάχιστο το:

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = \frac{e-1}{e} > 0.$$

Επομένως:

$$g(x) \geq g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = \frac{e-1}{e} > 0 \quad \text{για κάθε } x > 0,$$

άρα αποδείξαμε ότι: $2x \ln x + \frac{1}{x} > 0$ για κάθε $x > 0$.

Γ2. Έχουμε:

Η f είναι και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$f(x) = [(x^2 + 1) \cdot \ln x]' = 2x \ln x + x + \frac{1}{x} = x + \left(2x \ln x + \frac{1}{x}\right) > 0$$

αφού: $x > 0$ και $2x \ln x + \frac{1}{x} > 0$ από το προηγούμενο ερώτημα.

Άρα η συνεχής συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επίσης το $x = 1$ είναι προφανής λύση της εξίσωσης $f(x) = 0$, η οποία λόγω της μονοτονίας της f είναι και μοναδική.

Γ3. Έχουμε:

Η f' είναι και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$\left(2x \ln x + x + \frac{1}{x}\right)' = 2 \ln x + 2 + 1 - \frac{1}{x^2} = 2 \ln x + 3 - \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$$

και

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{x} + \frac{2}{x^3} > 0$$

για κάθε $x > 0$.

Αφού $f^{(3)}(x) > 0$ στο $(0, +\infty)$, έπεται ότι η συνεχής συνάρτηση f'' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επίσης:

$$f''\left(\frac{1}{e}\right) = 1 - e^2 < 0 \text{ και } f''(1) = 2 > 0 \text{ και επειδή η } f'' \text{ είναι συνεχής στο } \left[\frac{1}{e}, 1\right],$$

υπάρχει, σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano, ένα τουλάχιστον $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$ τέτοιο, ώστε

$f''(x_0) = 0$, το οποίο λόγω της μονοτονίας της f'' είναι μοναδικό.

Επίσης έχουμε:

$$0 < x < x_0 \Leftrightarrow f''(x) < f''(x_0) = 0$$

και

$$x > x_0 \Leftrightarrow f''(x) > f''(x_0) = 0$$

Επειδή η f'' μηδενίζεται στο σημείο x_0 και εκατέρωθεν αλλάζει πρόσημο το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της C_f .

Γ4. α) Έχουμε: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{1}{x}\right) \cdot \ln x = +\infty$

Άρα η C_f δεν έχει ούτε πλάγια ούτε οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) \cdot \ln x = -\infty,$$

αφού:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1 \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Άρα η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x = 0$.

β) Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E(\Omega) = \int_{\frac{1}{e}}^e |f(x)| dx = -\int_{\frac{1}{e}}^1 f(x) dx + \int_1^e f(x) dx = -I_1 + I_2, \text{ όπου } I_1 = \int_{\frac{1}{e}}^1 f(x) dx \text{ και}$$

$$I_2 = \int_1^e f(x) dx$$

αφού, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, είναι:

$$x > 1 \Rightarrow f(x) > f(1) \Rightarrow f(x) > 0$$

$$\frac{1}{e} < x < 1 \Rightarrow f(x) < f(1) \Rightarrow f(x) < 0$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_{\frac{1}{e}}^1 f(x) dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 (x^2 + 1) \cdot \ln x dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(\frac{x^3}{3} + x \right)' \ln x dx = \\
 &= \left[\left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \right]_{\frac{1}{e}}^1 - \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{x^3}{3} + x \right) dx = \\
 &= \frac{1}{3e^3} + \frac{1}{e} - \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(\frac{x^2}{3} + 1 \right) dx = \frac{1}{3e^3} + \frac{1}{e} - \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{\frac{1}{e}}^1 - [x]_{\frac{1}{e}}^1 = \\
 &= \frac{1}{3e^3} + \frac{1}{9e^3} + \frac{2}{e} - \frac{10}{9} = \frac{4}{9e^3} + \frac{2}{e} - \frac{10}{9} \\
 I_2 &= \int_1^e (x^2 + 1) \cdot \ln x dx = \int_1^e \left(\frac{x^3}{3} + x \right)' \ln x dx = \\
 &= \left[\left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{x^3}{3} + x \right) dx = \frac{e^3}{3} + e - \int_1^e \left(\frac{x^2}{3} + 1 \right) dx = \\
 &= \frac{e^3}{3} + e - \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e - [x]_1^e = \frac{2e^3}{9} + \frac{10}{9}
 \end{aligned}$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E(\Omega) = \frac{2e^3}{9} + \frac{10}{9} - \frac{4}{9e^3} - \frac{2}{e} + \frac{10}{9} = \frac{2e^3}{9} + \frac{20}{9} - \frac{4}{9e^3} - \frac{2}{e} \tau \cdot \mu$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned}
 e^x (f'(x) + f''(x) - 1) &= f'(x) + xf''(x) \Leftrightarrow e^x f'(x) + e^x f''(x) - e^x = f'(x) + xf''(x) \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (e^x f'(x) - e^x)' &= (xf''(x))' \Leftrightarrow e^x f'(x) - e^x = xf''(x) + c \quad (1)
 \end{aligned}$$

Για $x = 0$ είναι $0 - 1 = 0 + c \Leftrightarrow c = -1$. Επομένως από την σχέση (1) έχουμε:

$$e^x f'(x) - e^x = xf''(x) - 1 \Leftrightarrow e^x f'(x) - xf''(x) = e^x - 1 \Leftrightarrow (e^x - x)' f'(x) = e^x - 1, x \in \mathbb{R} \quad (2)$$

Θα εξετάσουμε το πρόσημο της συνάρτησης:

$$h(x) = e^x - x, x \in \mathbb{R}.$$

Η $h(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x \in \mathbb{R}$ (ως διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων για $x \in \mathbb{R}$)

με $h'(x) = e^x - 1, x \in \mathbb{R}$. Είναι:

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$h'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$h'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Επειδή η συνάρτηση $h(x)$ είναι και συνεχής στο $x_0 = 0$ είναι :

- ♦ Γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και

♦ Γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$

Επομένως η $h(x)$ έχει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, δηλαδή: $h(x) \geq h(0) = 1 > 0$, $x \in \mathbb{R}$,

δηλαδή $e^x - x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα από τη σχέση (2) έχουμε:

$$f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}, x \in \mathbb{R}.$$

Τώρα έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x} &\Leftrightarrow f''(x) = \frac{(e^x - x)'}{e^x - x} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f''(x) = (\ln|e^x - x|)' \Leftrightarrow f(x) = \ln|e^x - x| + c_1, x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Για $x = 0$ είναι $0 = 0 + c_1 \Leftrightarrow c_1 = 0$. Επομένως από την σχέση (2) έχουμε:

$$f(x) = \ln|e^x - x| \quad \text{ή} \quad f(x) = \ln(e^x - x), x \in \mathbb{R},$$

αφού $e^x - x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ2. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}, x \in \mathbb{R}.$$

Έίναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$.

Έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $x_0 = 0$, το $f(0) = 0$ (επειδή η f είναι και συνεχής στο 0).

Δ3. Η f'' είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$f''(x) = \frac{(2-x)e^x - 1}{(e^x - x)^2}, x \in \mathbb{R}.$$

Αρχικά θα αποδείξουμε ότι η συνάρτηση $(2-x)e^x - 1$ έχει ακριβώς δύο ρίζες. Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση:

$$K(x) = (2-x)e^x - 1, x \in \mathbb{R}$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$K'(x) = -e^x + (2-x)e^x = e^x(1-x), x \in \mathbb{R}.$$

Έχουμε:

$$K'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$K'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

$$K'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$$

Άρα η $K(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και

γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$. Έχει ολικό μέγιστο στο σημείο $x_1 = 1$ το $K(1) = e - 1 > 0$.

Θα βρούμε τις εικόνες $K((-\infty, 1])$, $K([1, +\infty))$. Έχουμε:

$$K((-\infty, 1]) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} K(x), K(1) \right] = (-1, e - 1]$$

$$K([1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x), K(1) \right] = (-\infty, e - 1]$$

αφού:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} K(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(2-x)e^x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x) = -\infty$$

Επειδή $0 \in (-1, e - 1]$ και $0 \in (-\infty, e - 1]$ η $K(x)$ έχει μία ρίζα ξ_1 στο $(-\infty, 1]$ και μία ρίζα ξ_2 στο $[1, +\infty)$, οι οποίες είναι μοναδικές, επειδή η $K(x)$ είναι «1-1» στα διαστήματα αυτά (ως γνησίως μονότονη στα διαστήματα $(-\infty, 1]$ και $[1, +\infty)$ αντίστοιχα). Για να αποδείξουμε όμως ότι τα σημεία $A(\xi_1, f(\xi_1))$ και $B(\xi_2, f(\xi_2))$ είναι σημεία καμπής της C_f , πρέπει να αποδείξουμε ότι η $f''(x)$ (ισοδύναμα η $K(x)$) αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν των ξ_1, ξ_2 . Έχουμε:

$$1 > x > \xi_1 \Rightarrow K(x) > K(\xi_1) \Rightarrow K(x) > 0 \Rightarrow f''(x) > 0$$

$$x < \xi_1 \Rightarrow K(x) < K(\xi_1) \Rightarrow K(x) < 0 \Rightarrow f''(x) < 0$$

$$x > \xi_2 \Rightarrow K(x) < K(\xi_2) \Rightarrow K(x) < 0 \Rightarrow f''(x) < 0$$

$$1 < x < \xi_2 \Rightarrow K(x) > K(\xi_2) \Rightarrow K(x) > 0 \Rightarrow f''(x) > 0$$

Επομένως η f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής τα $\xi_1 \in (-\infty, 1]$ και $\xi_2 \in [1, +\infty)$.

Δ4. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = \ln(e^x - x) - \sigma \nu \nu x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

Από το θεώρημα του Bolzano έχουμε:

Η $h(x)$ είναι συνεχής συνάρτηση στο $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ (ως πράξεις και σύνθεση συνεχών συναρτήσεων).

$$\blacklozenge \quad h(0) = -1 < 0$$

- ♦ $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$ (διότι $\frac{\pi}{2} > 0 \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) > f(0) = 0$, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$). Άρα $h(0) \cdot h\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$.

- ♦ Επομένως υπάρχει, τουλάχιστον ένα, $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$h(x_0) = 0 \Leftrightarrow \ln(e^{x_0} - x_0) - \sin x_0.$$

Για τη μοναδικότητα του x_0 θα αποδείξουμε ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως μονότονη (ή «1-1» με τον ορισμό). Η h είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πράξεις και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$h'(x) = f'(x) + \eta \mu x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Είναι $h'(x) > 0$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, διότι είναι $f'(x) > 0$ και $\eta \mu x > 0$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Άρα το x_0 είναι μοναδικό.

Δ5. Έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (e^x - 1) \frac{f(x)}{e^x - x} dx = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e^x - x} \cdot f(x) dx = \int_0^1 f'(x) \cdot f(x) dx = \\ &= [f(x)f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) \cdot f'(x) dx \end{aligned}$$

Επομένως:

$$I = f^2(1) - f^2(0) - I \Leftrightarrow 2I = \ln^2(e-1) \Leftrightarrow I = \frac{\ln^2(e-1)}{2}$$

3^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία σχολικού βιβλίου

A2. Θεωρία σχολικού βιβλίου

A3. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος.

ΘΕΜΑ Β

B1. Για να ορίζεται η f , πρέπει: $3e^x + 1 > 0$, που αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα, το πεδίο ορισμού της είναι $D_f = \mathbb{R}$.

B2. Για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \Rightarrow 3e^{x_1} < 3e^{x_2} \Rightarrow 3e^{x_1} + 1 < 3e^{x_2} + 1 \Rightarrow \ln(3e^{x_1} + 1) < \ln(3e^{x_2} + 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow \ln(3e^{x_1} + 1) - 2 < \ln(3e^{x_2} + 1) - 2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα «1-1» οπότε αντιστρέφεται.

Σχόλιο: Θα μπορούσαμε να αποδείξουμε εύκολα ότι $f'(x) = \frac{3e^x}{3e^x + 1} > 0, x \in \mathbb{R}$,

άρα η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα «1-1» οπότε αντιστρέφεται.

B3. Έχουμε:

$$f(x) = y \Leftrightarrow y + 2 = \ln(3e^x + 1) \Leftrightarrow e^{y+2} = 3e^x + 1 \Leftrightarrow e^x = \frac{e^{y+2} - 1}{3}, \frac{e^{y+2} - 1}{3} > 0$$

Οπότε: $x = \ln \frac{e^{y+2} - 1}{3}, y > -2$. Άρα: $f^{-1}(x) = \ln \frac{e^{y+2} - 1}{3}, x > -2$

B4. Έχουμε:

$$f(x) < f(\ln 5 - 2) - 2 \Leftrightarrow \ln(3e^x + 1) - 2 < \ln \frac{e^{\ln 5 - 2} - 1}{3} - 2 \Leftrightarrow \ln(3e^x + 1) < \ln \frac{4}{3} \Leftrightarrow 3e^x + 1 < \frac{4}{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 9e^x + 3 < 4 \Leftrightarrow 9e^x < 1 \Leftrightarrow e^x < \frac{1}{9} \Leftrightarrow x < -\ln 9$$

Επειδή όμως $x \in (-2, +\infty)$ η εξίσωση είναι αδύνατη.

ΘΕΜΑ Γ

Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το διάστημα $(-1, +\infty)$.

Γ1. Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη (ως αποτέλεσμα πράξεων δύο φορές παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$f(x) = e^x - \frac{1}{x+1}, f'(x) = e^x + \frac{1}{(x+1)^2}$$

Επειδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x > -1$, έπεται ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-1, +\infty)$.

Επίσης $f'(0) = 0$, άρα

$$-1 < x < 0 \Leftrightarrow f'(x) < f'(0) \Leftrightarrow f'(x) < 0, \text{ για κάθε } x \in (-1, 0)$$

$$x > 0 \Leftrightarrow f'(x) > f'(0) \Leftrightarrow f'(x) > 0, \text{ για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Επιπλέον $f(0) = 0$ και έτσι έχουμε τον παρακάτω πίνακα:

x	-1	0	$+\infty$
f'(x)	-	○	+
f(x)			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, οπότε παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ το $f(0) = 0$.

Γ2. α. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} [e^x - \ln(x+1) - 1] = +\infty, \text{ αφού}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty, \text{ όπου: } u = x+1 \text{ και } [e^x - 1] = \frac{1}{e} - 1.$$

$$x \rightarrow -1^+ \Leftrightarrow u \rightarrow 0^+$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το $[0, +\infty)$.

Η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει στο πεδίο ορισμού της $(-1, +\infty)$, μοναδική λύση την $x = 0$, αφού:

$$x < 0 \Leftrightarrow f(x) > f(0) = 0$$

$$x > 0 \Leftrightarrow f(x) < f(0) = 0$$

β. Αναζητούμε τις ασύμπτωτες της f

Κατακόρυφες: Επειδή:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (e^x - \ln(x+1) - 1) = +\infty,$$

η ευθεία $x = -1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Οριζόντιες: Η C_f δεν έχει οριζόντια ασύμπτωση αφού:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - \ln(x+1) - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right) = (+\infty) \cdot 1 = +\infty$$

, διότι είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{e^x} = \left(\frac{0}{0} - D, L \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x+1)e^x} = \frac{1}{+\infty} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Πλάγιες: Επειδή:

$$\begin{aligned} \lambda &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \ln(x+1) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right) = (+\infty) \cdot 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right) = 1 - 0 - 0 = 1 \end{aligned}$$

Η C_f δεν έχει πλάγιες ασύμπτωτες

Γ3. Η δοσμένη σχέση γίνεται ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} e^{2a+\beta-1} - \ln(2a+\beta) + e^{a+2\beta-2} - \ln(a+2\beta-1) &\leq 2 \Leftrightarrow \\ e^{2a+\beta-1} - \ln((2a+\beta-1)+1) - 1 + e^{a+2\beta-2} - \ln((a+2\beta-2)+1) - 1 &\leq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(2a+\beta-1) + f(a+2\beta-2) &\leq 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση έπεται ότι:

$$f(2a+\beta-1) = f(a+2\beta-2) = 0, \quad (2)$$

γιατί αν υποθέσουμε ότι π.χ. $f(2a+\beta-1) \neq 0$ τότε, επειδή:

$f(x) \geq 0$ για κάθε $x > -1$, θα πρέπει $f(2a+\beta-1) > 0$ και η (1) μας δίνει:

$$f(a+2\beta-2) \leq -f(2a+\beta-1) < 0 \Rightarrow f(a+2\beta-2) < 0$$

το οποίο είναι άτοπο. Επομένως $f(2a+\beta-1) = 0$ (2) οπότε από την (1) και $f(a+2\beta-2) = 0$

Έχουμε ότι:

$$\begin{cases} 2a + \beta - 1 = 0 \\ a + 2\beta - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

Γ4. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E(\Omega) &= \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (e^x - \ln(x+1) - 1) dx = \\ &= \int_0^1 e^x dx - \int_0^1 \ln(x+1) dx - \int_0^1 1 dx = [e^x]_0^1 - [x \ln(x+1)]_0^1 + \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx - [x]_0^1 = \\ &= e - 1 - \ln 2 + I - 1 = e - 2 - \ln 2 + I \\ I &= \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int_0^1 1 dx - \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [x]_0^1 - [\ln(x+1)]_0^1 = 1 - \ln 2 \end{aligned}$$

Επομένως: $E(\Omega) = e - 2 - \ln 2 + 1 - \ln 2 = e - 1 - 2 \ln 2$ τ.μ

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{1+x \ln x}{x \ln x} \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x \ln x} + 1 \Leftrightarrow \ln |f(x)| = [\ln(\ln x)]' + (x)' \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow [\ln |f(x)|]' &= [\ln(\ln x) + x]' \Leftrightarrow \ln |f(x)| = \ln(\ln x) + x + c \end{aligned}$$

Για $x = e$ έχουμε:

$$\ln |f(e)| = \ln(\ln e) + e + c \Rightarrow \ln e^e = e + c \Rightarrow e = e + c \Rightarrow c = 0$$

Επομένως:

$$\ln |f(x)| = \ln(\ln x) + x \quad (1).$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο $(1, +\infty)$ (ως παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$) και δεν έχει ρίζες αφού $f(x) \neq 0$, για κάθε $x \in (1, +\infty)$, η συνάρτηση f θα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $(1, +\infty)$ και αφού $f(e) = e^e > 0$ θα είναι $f(x) > 0$, για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

Άρα από την σχέση (1) έχουμε:

$$\ln f(x) = \ln(\ln x) + x \Leftrightarrow \ln f(x) = \ln(\ln x) + \ln e^x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln f(x) = \ln(e^x \cdot \ln x) \Leftrightarrow f(x) = e^x \cdot \ln x, x > 1$$

Θα αποδείξουμε τώρα ότι οι συναρτήσεις:

$$g(x) = e^x, h(x) = \ln x$$

δεν έχουν κοινό σημείο, δηλαδή ότι η εξίσωση:

$$g(x) = h(x) \Leftrightarrow e^x = \ln x \Leftrightarrow e^x - \ln x = 0 \text{ δεν έχει ρίζα στο } (1, +\infty)$$

Θεωρούμε την συνάρτηση:

$$K(x) = e^x - \ln x, x \geq 1,$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $[1, +\infty)$ (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[1, +\infty)$) με:

$$K'(x) = e^x - \frac{1}{x}, x \geq 1.$$

Η συνάρτηση $K'(x)$ είναι επίσης παραγωγίσιμη στο $[1, +\infty)$ (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[1, +\infty)$) με:

$$K''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0, x \geq 1.$$

Άρα η $K'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Άρα:

$$x > 1 \Rightarrow K'(x) > K'(1) = e - 1 \Rightarrow K'(x) > 0, x > 1$$

Επομένως η συνάρτηση $K(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Άρα:

$$x > 1 \Rightarrow K(x) > K(1) = e > 0 \Rightarrow K(x) > 0, x > 1$$

Οπότε η συνάρτηση $K(x)$ δεν έχει ρίζα στο $(1, +\infty)$, δηλαδή ισοδύναμα οι συναρτήσεις $g(x) = e^x, h(x) = \ln x$ δεν έχουν κοινό σημείο στο $(1, +\infty)$.

Δ2. α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = e^x \cdot \ln x, x > 1$$

είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ (ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(1, +\infty)$) με:

$$f'(x) = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} > 0, \text{ για κάθε } x > 1$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα $(1, +\infty)$. Για το σύνολο τιμών της έχουμε:

$$f((1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right),$$

αφού η f είναι γνησίως αύξουσα $(1, +\infty)$.

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (e^x \cdot \ln x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x \cdot \ln x) = +\infty$$

Άρα: $f((1, +\infty)) = (0, +\infty)$

β) Έχουμε:

$$f(x) = \frac{\lambda}{x} \Leftrightarrow xf'(x) = \lambda \Leftrightarrow \varphi(x) = \lambda, \quad x > 1,$$

όπου $\varphi(x) = xf'(x), x > 1$

η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ (ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(1, +\infty)$) με:

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= f(x) + xf''(x) = e^x \ln x + x \left(e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} \right) = \\ &= e^x \ln x + xe^x \ln x + e^x = e^x (\ln x + x \ln x + 1) > 0 \end{aligned}$$

για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

Άρα η συνάρτηση $\varphi(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(1, +\infty)$ και επομένως το σύνολο τιμών της είναι

$$\varphi((1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \varphi(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) \right) = (0, +\infty)$$

, αφού:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (xf'(x)) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (xf'(x)) = +\infty$$

Άρα:

- ♦ Αν $\lambda \leq 0$ η εξίσωση $f(x) = \frac{\lambda}{x}$ δεν έχει ρίζα στο $(1, +\infty)$
- ♦ Αν $\lambda > 0$ η εξίσωση $f(x) = \frac{\lambda}{x}$ έχει μοναδική ρίζα στο $(1, +\infty)$, αφού είναι «1-1» στο $(1, +\infty)$ (ως γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$).

Δ3. Η συνάρτηση $f'(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(1, +\infty)$) με:

$$f'(x) = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} + e^x \cdot \frac{1}{x} - e^x \frac{1}{x^2} = e^x \ln x + 2e^x \cdot \frac{1}{x} - e^x \frac{1}{x^2} =$$

$$e^x \left(\ln x + 2 \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = e^x \left(\frac{x^2 \ln x + 2x - 1}{x^2} \right) > 0, x > 1$$

Αφού για κάθε $x \in (1, +\infty)$ είναι :

$$e^x > 0$$

$$x^2 > 0$$

$$x^2 \ln x + 2x - 1 > 0 \left(x^2 \ln x > 0, 2x - 1 > 0 \right)$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $(1, +\infty)$.

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(e, f(e))$ είναι:

$$y - e^e = (e^e + e^{e-1})(x - e) \Leftrightarrow y = (e^e + e^{e-1})x - e^{e+1} - e^e + e^e \Leftrightarrow y = (e^e + e^{e-1})x - e^{e+1}$$

, αφού $f'(e) = e^e + e^{e-1}$

Δ4. α) Αφού η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $(1, +\infty)$ η γραφική της παράσταση θα βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη (στο σημείο επαφής Α ιχθεί η ισότητα). Επομένως θα έχουμε:

για κάθε $x > 1$

$$f(x) \geq (e^e + e^{e-1})x - e^{e+1} \Leftrightarrow f(x) \geq e^{e-1}(e+1)x - e^{e+1} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{e^{e-1}} \geq (e+1)x - \frac{e^{e+1}}{e^{e-1}} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{e^{e-1}} \geq (e+1)x - e^2$$

β) Ολοκληρώνοντας³ την προηγούμενη ανισοσύτητα έχουμε:

$$\int_2^3 \frac{f(x)}{e^{e-1}} dx \geq \int_2^3 [(e+1)x - e^2] dx \Leftrightarrow \frac{1}{e^{e-1}} \int_2^3 f(x) dx \geq (e+1) \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^3 - e^2 [x]_2^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{e^{e-1}} \int_2^3 f(x) dx \geq (e+1) \left(\frac{9}{2} - \frac{4}{2} \right) - e^2 (3-2) \Leftrightarrow \frac{1}{e^{e-1}} \int_2^3 f(x) dx \geq \frac{5}{2}(e+1) - e^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{e^{e-1}} \int_2^3 f(x) dx \geq \frac{5+5e-2e^2}{2} \Leftrightarrow \int_2^3 f(x) dx \geq e^{e-1} \cdot \frac{5+5e-2e^2}{2}$$

Δ5. Επειδή η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $(1, +\infty)$ (προηγούμενο ερώτημα) η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$. Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Τ. του διαφορικού λογισμού στα

διαστήματα $\left[x_1, \frac{x_1 + x_2}{2} \right]$ και $\left[\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2 \right]$, αντίστοιχα, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις

(η f είναι παραγωγίσιμη, άρα και συνεχής στα $\left[x_1, \frac{x_1 + x_2}{2} \right]$ και $\left[\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2 \right]$).

Επομένως υπάρχουν $\xi_1 \in \left(x_1, \frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ και $\xi_2 \in \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2\right)$ τέτοια, ώστε:

$$f'(\xi_1) = 2 \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f'(\xi_2) = 2 \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{x_2 - x_1}$$

$$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \Rightarrow 2 \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 2 \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{x_2 - x_1} \Rightarrow$$

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1) < f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

4^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) και επιπλέον:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$$

A2.



Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ είναι $+\infty$ ή $-\infty$, τότε η ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f .

A3. Επειδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, x_0)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(\alpha, x_0]$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (\alpha, x_0] \quad (1)$$

Επειδή $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_0, \beta)$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in [x_0, \beta) \quad (2)$$



Επομένως, λόγω των (1) και (2), ισχύει:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (\alpha, \beta),$$

που σημαίνει ότι το $f(x_0)$ είναι μέγιστο της f στο (α, β) και άρα τοπικό μέγιστο αυτής.

A4.

α. Σωστό (αφού η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $[a, \beta]$ άρα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ ή $f(x) < 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$. Επομένως $\int_a^\beta f(x)dx > 0$ ή $\int_a^\beta f(x)dx < 0$).

β. Λάθος (είναι (B, A) αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα)

γ. Σωστό

δ. Σωστό (αφού η f' συνεχής στο \mathbb{R} και χωρίς ρίζες θα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο \mathbb{R} , επομένως είναι ή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή γνησίως αύξουσα, ή $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή γνησίως φθίνουσα).

ε. Σωστό (αν $x_1 \in \mathbb{R}$ θέση τοπικού ακροτάτου, τότε από το θεώρημα του Fermat θα είναι $f'(x_1) = 0$, δηλαδή η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(x_1, f(x_1))$ είναι παράλληλη προς τον

άξονα x (x -οριζόντια εφαπτομένη).

ΘΕΜΑ Β

B1. Η f είναι συνεχής στο \mathbb{R} , άρα και στο $x_0 = 0$. Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x + \kappa \eta \mu x}{x - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + \kappa \frac{\eta \mu x}{x}}{1 - x} = \frac{2 + \kappa}{1} = 2 + \kappa$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{8x^2 + x + 16} - 3x) = 4$$

$$f(0) = \lambda$$

Άρα: $\lambda = 4$, $2 + \kappa = 4 \Leftrightarrow \kappa = 2$

B2. Για $\kappa = 2$, $\lambda = 4$ έχουμε:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x + 2\eta \mu x}{x - x^2}, & x < 0 \\ 4, & x = 0 \\ \sqrt{8x^2 + x + 16} - 3x, & x > 0 \end{cases}$$

οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{8x^2 + x + 16} - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{8 + \frac{1}{x} + \frac{16}{x^2}} - 3 \right) = (+\infty) \cdot (\sqrt{8} - 3) = +\infty$$

B3. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \eta \mu x}{x - x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{\eta \mu x}{x}}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{1 - x} \cdot \left(2 + \frac{\eta \mu x}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{\eta \mu x}{x} \right) = 0 \cdot 2 = 0$$

αφού τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 - x}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{\eta \mu x}{x} \right)$ με $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 - x} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{\eta \mu x}{x} \right) = 2$

[διότι: $\left| \frac{\eta \mu x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \Leftrightarrow -\frac{1}{x} \leq \frac{\eta \mu x}{x} \leq \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{x} \right) = 0$] και από το κριτήριο της

παρεμβολής είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{\eta \mu x}{x} \right) = 2$$

B4. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - \ln(8x + 1), x \in [0, 1]$$

Η g είναι συνεχής στο $[0,1]$ ((ως σύνθεση και αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων στο $[0,1]$))

Επίσης:

$$g(0) = f(0) = 4$$

$$g(1) = f(1) - 2 \ln 9 = 2 - 2 \ln 9 = 2 \ln \frac{e}{9}$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, έχουμε ότι η εξίσωση:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 2 \ln(8x+1)$$

έχει μια, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(0,1)$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, +\infty)$) με:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2f(x) + 2xf'(x) + 2xf''(x) + x^2 f'''(x) - 2 \ln x - 1 - 2 = \\ &= 2f(x) + 4xf'(x) + x^2 f''(x) - 2 \ln x - 3 = 0 \end{aligned}$$

λόγω της δεδομένης σχέσης. Επομένως η συνάρτηση g είναι σταθερή, δηλαδή $g(x) = c \in \mathbb{R}$, για κάθε $x > 0$.

Γ2. Αφού από το ερώτημα Δ1 η συνάρτηση g είναι σταθερή θα υπάρξει $c \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει $g(x) = c$.

Για $x = 1 \Rightarrow g(1) = c \Rightarrow 2f(1) + f'(1) - 1 = c \Rightarrow c = 0$.

Επομένως έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow 2xf(x) + x^2 f'(x) - x(2 \ln x + 1) = 0 \Leftrightarrow 2xf(x) + x^2 f'(x) = x(2 \ln x + 1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2xf(x) + x^2 f'(x) = 2x \ln x + x \Leftrightarrow [x^2 f(x)]' = [x^2 \ln x]' \Leftrightarrow x^2 f(x) = x^2 \ln x + c_1 \quad (c_1 \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Για $x = 1 \Rightarrow f(1) = 0 + c_1 \Rightarrow c_1 = 0$

Επομένως:

$$x^2 f(x) = x^2 \ln x \Leftrightarrow f(x) = \ln x, \quad x > 0$$

Γ3. α). Έστω $A(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής της γραφικής παράστασης C_f της f με την εφαπτομένη της (ε) που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με: $f'(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) στο A είναι:

$$(\varepsilon): y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

Αφού η (ε) διέρχεται από την αρχή των αξόνων $0(0,0)$ έχουμε:

$$0 - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(0 - x_0) \Leftrightarrow -\ln x_0 = -1 \Leftrightarrow \ln x_0 = 1 \Leftrightarrow x_0 = e$$

Επομένως η ζητούμενη εξίσωση είναι:

$$y - f(e) = f'(e)(x - e) \Leftrightarrow y - 1 = \frac{1}{e}(x - e) \Leftrightarrow y = \frac{1}{e}x$$

β) Έχουμε:

$$y(t) = (f \circ f)(x(t)) = f(f(x(t))) = \ln(\ln(x(t))), \quad t > 0, \quad x(t) > 1$$

Η συνάρτηση $y(t)$ είναι παραγωγίσιμη για κάθε $t > 0$ ως συνθέσεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων για $t > 0$) με:

$$y'(t) = \frac{1}{\ln(x(t))} \cdot (\ln(x(t)))' = \frac{1}{\ln(x(t))} \cdot \frac{1}{x(t)} \cdot x'(t), \quad t > 0$$

Τη χρονική στιγμή $t = t_0$ sec είναι:

$$t = t_0 \Rightarrow y'(t_0) = \frac{1}{\ln(x(t_0))} \cdot \frac{1}{x(t_0)} \cdot x'(t_0) = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2 \ln 2} \text{ cm / sec}$$

Γ4. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$K(x) = \ln(|f(x)|), \quad x \in \left(0, \frac{1}{e}\right].$$

Η $K(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\left(0, \frac{1}{e}\right]$ (ως συνθέσεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο

$\left(0, \frac{1}{e}\right]$) με $K'(x) = \frac{1}{x \ln x}$, $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$.

Η $K'(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\left(0, \frac{1}{e}\right]$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων

συναρτήσεων στο $\left(0, \frac{1}{e}\right]$) με:

$$K''(x) = \frac{-(1 + \ln x)}{x^2 \ln^2 x} > 0, \quad \text{για κάθε } \left(0, \frac{1}{e}\right] \text{ (είναι}$$

$$x < \frac{1}{e} \Leftrightarrow \ln x < \ln \frac{1}{e} \Leftrightarrow \ln x < -1 \Leftrightarrow \ln x + 1 < 0).$$

Άρα η $K'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left(0, \frac{1}{e}\right]$, δηλαδή η K είναι κυρτή στο

$\left(0, \frac{1}{e}\right]$.

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού στα διαστήματα $\left[a, \frac{a+\beta}{2}\right]$

και $\left[\frac{a+\beta}{2}, \beta\right]$ αντίστοιχα αφού:

Η συνάρτηση $K(x)$ είναι παραγωγίσιμη στα διαστήματα $\left[a, \frac{a+\beta}{2} \right]$ και $\left[\frac{a+\beta}{2}, \beta \right]$ (άρα και συνεχής σε αυτά). Επομένως, υπάρχουν αντίστοιχα $\xi_1 \in \left(a, \frac{a+\beta}{2} \right)$ και $\xi_2 \in \left(\frac{a+\beta}{2}, \beta \right)$ τέτοια, ώστε:

$$K'(\xi_1) = 2 \frac{K\left(\frac{a+\beta}{2}\right) - K(a)}{\beta - a} \quad \text{και} \quad K'(\xi_2) = 2 \frac{K(\beta) - K\left(\frac{a+\beta}{2}\right)}{\beta - a}.$$

Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \xi_1 < \xi_2 &\Rightarrow K'(\xi_1) < K'(\xi_2) \Rightarrow 2 \frac{K\left(\frac{a+\beta}{2}\right) - K(a)}{\beta - a} < 2 \frac{K(\beta) - K\left(\frac{a+\beta}{2}\right)}{\beta - a} \Rightarrow \\ &\Rightarrow K\left(\frac{a+\beta}{2}\right) - K(a) < K(\beta) - K\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \Rightarrow 2K\left(\frac{a+\beta}{2}\right) < K(a) + K(\beta) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2 \ln \left(\left| f\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \right| \right) < \ln |f(a)| + \ln |f(\beta)| \Rightarrow \ln \left(\left| f\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \right| \right)^2 < \ln (|f(a)| \cdot |f(\beta)|) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\left| f\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \right| \right)^2 < |f(a)| \cdot |f(\beta)| \Rightarrow \left| f\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \right| < \sqrt{|f(a)| \cdot |f(\beta)|} \Rightarrow \left| f\left(\frac{a+\beta}{2}\right) \right| < \sqrt{f(a) \cdot f(\beta)} \\ &(\text{αφού } f(a) < 0, f(\beta) < 0, \text{διότι } a, \beta \in \left(0, \frac{1}{e} \right)) \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

α) Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} ως πολυωνυμική με:

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0, x \in \mathbb{R},$$

άρα η f είναι γνησίως αύξουσα, δηλαδή είναι «1-1» οπότε η f αντιστρέφεται.

β) Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} e^{5x} + e^{3x+2} + e^{x+4} &\geq e^5 \cdot x(x^4 + x^2 + 1) \Leftrightarrow \frac{e^{5x} + e^{3x+2} + e^{x+4}}{e^5} \geq x^5 + x^3 + x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^{5(x-1)} + e^{3(x-1)} + e^{x-1} \geq x^5 + x^3 + x \Leftrightarrow f(e^{x-1}) \geq f(x) \Leftrightarrow e^{x-1} \geq x \end{aligned}$$

Η τελευταία σχέση αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ αφού:

- ♦ Για $x > 0$ γίνεται $x-1 \geq \ln x$ (αληθής με χρήση της εφαρμογής 2,ii) στη σελίδα 266 του σχολικού βιβλίου).
- ♦ Για $x \leq 0$, είναι προφανής, αφού $e^{x-1} > 0$.

Επομένως, οι λύσεις της δοθείσας ανίσωσης είναι όλα τα $x \in \mathbb{R}$.

Σημείωση: Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = e^{x-1} - x, x \in \mathbb{R}$$

και να μελετήσουμε την μονοτονία και τα ακρότατά της, οπότε αποδυνκνείουμε ότι:

$$g(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^{x-1} \geq x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως, οι λύσεις της δοθείσας ανίσωσης είναι όλα τα $x \in \mathbb{R}$.

Δ2.

α) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$K(x) = f(x) - 1, \quad x \in [0, 1].$$

- ♦ Η συνάρτηση $K(x)$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (ως πολυωνυμική).
- ♦ $K(0) = f(0) - 1 = -1 < 0$
 $K(1) = f(1) - 1 = 2 > 0$, άρα $K(0) \cdot K(1) < 0$

Επομένως, από το Θεώρημα του Bolzano, υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$K(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 1.$$

Επειδή η f είναι συνάρτηση «1-1» το x_0 είναι μοναδικό.

β) Θεωρούμε την συνάρτηση:

$$h(x) = 2x^6 + 3x^4 + 6x^2 - 12x, \quad x \in \mathbb{R}$$

και έτσι θέλουμε ισοδύναμα να λύσουμε την ανίσωση:

$$2x^6 + 3x^4 + 6x^2 - 12x \geq 2x_0^6 + 3x_0^4 + 6x_0^2 - 12x_0 \Leftrightarrow h(x) \geq h(x_0) \quad (I)$$

Η h είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πολυωνυμική) με:

$$h'(x) = 12x^5 + 12x^3 + 12x - 12 = 12[(x^5 + x^3 + x) - 1] = 12(f(x) - 1), \quad x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow 12(f(x) - 1) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 1 \Leftrightarrow x = x_0 \in (0, 1)$$

$$x > x_0 \Leftrightarrow f(x) > f(x_0) \Leftrightarrow f(x) > 1 \Leftrightarrow f(x) - 1 > 0 \Leftrightarrow h'(x) > 0$$

$$0 < x < x_0 \Leftrightarrow f(x) < f(x_0) \Leftrightarrow f(x) < 1 \Leftrightarrow f(x) - 1 < 0 \Leftrightarrow h'(x) < 0$$

Επομένως η συνάρτηση h παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση $x = x_0$ και άρα είναι

$$h(x) \geq h(x_0), \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως, το σύνολο λύσεων της ανίσωσης είναι το \mathbb{R} .

2ος τρόπος (Δ2 β)

Έχουμε ισοδύναμα:

$$2x^6 + 3x^4 + 6x^2 - 12x \geq 2x_0^6 + 3x_0^4 + 6x_0^2 - 12x_0 \Leftrightarrow \frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - x \geq \frac{x_0^6}{6} + \frac{x_0^4}{4} + \frac{x_0^2}{2} - x_0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$F(x) = \frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

η οποία είναι κυρτή στο \mathbb{R} , αφού η F είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πολυωνυμική) με:

$$F'(x) = x^5 + x^3 + x = f(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

$$F''(x) = f'(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης C_F της F στο σημείο της $A(x_0, F(x_0))$ είναι:

$$y - F(x_0) = F'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow y = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = F(x_0) + f(x_0)(x - x_0) \Rightarrow y = F(x_0) + (x - x_0)$$

Αφού η F είναι κυρτή στο \mathbb{R} , έχουμε διαδοχικά:

$$F(x) \geq y \Leftrightarrow F(x) \geq F(x_0) + (x - x_0) \Leftrightarrow F(x) - x \geq F(x_0) - x_0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - x \geq \frac{x_0^6}{6} + \frac{x_0^4}{4} + \frac{x_0^2}{2} - x_0, x \in \mathbb{R}$$

Επομένως, το σύνολο λύσεων της ανίσωσης (I) είναι το \mathbb{R}

Δ3. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[\xi_1 + 1, \xi_2 + 1]$ και επειδή τη f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , έχουμε:

$$\xi_1 + 1 \leq t \leq \xi_2 + 1 \Rightarrow f(\xi_1 + 1) \leq f(t) \leq f(\xi_2 + 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(\xi_1 + 1) dt \leq \int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(t) dt \leq \int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(\xi_2 + 1) dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\xi_1 + 1)(\xi_2 - \xi_1) \leq \int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(t) dt \leq f(\xi_2 + 1)(\xi_2 - \xi_1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\xi_1 + 1) \leq \frac{\int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(t) dt}{\xi_2 - \xi_1} \leq f(\xi_2 + 1) \quad (II)$$

Τώρα έχουμε:

$$0 < \xi_1 < \xi_2 < 1 \Rightarrow 1 < \xi_1 + 1 < \xi_2 + 1 < 2 \Rightarrow f(1) < f(\xi_1 + 1) < f(\xi_2 + 1) < f(2)$$

$$\Rightarrow 3 < f(\xi_1 + 1) < f(\xi_2 + 1) < 42 \quad (III)$$

Επομένως, από τη σχέση (II), λόγω της σχέσης (III) προκύπτει ότι: $3 \leq \frac{\int_{\xi_1 + 1}^{\xi_2 + 1} f(t) dt}{\xi_2 - \xi_1} \leq 42$

Δ4.

α) Ισχύει ότι $e^{x-1} \geq x$, $x \in \mathbb{R}$ (ερώτημα Δ1,ii). Αν θέσουμε όπου x το $x^2 + 1$ έχουμε:

$$e^{x^2} \geq x^2 + 1 \Leftrightarrow e^{x^2} - x^2 - 1 \geq 0 \quad (IV),$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Η συνάρτηση: $\varphi(x) = e^{x^2} - x^2 - 1$ είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 1]$ (ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων στο $[0, 1]$) και επίσης δεν είναι παντού μηδέν στο $[0, 1]$.

Ολοκληρώνοντας την σχέση (IV) έχουμε διαδοχικά:

$$\int_0^1 (e^{x^2} - x^2 - 1) dx > 0 \Rightarrow \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 1 dx \Rightarrow \int_0^1 e^{x^2} dx > \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + [x]_0^1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^1 e^{x^2} dx > \frac{1}{3} + 1 \Rightarrow \int_0^1 e^{x^2} dx > \frac{4}{3} \Rightarrow 3 \int_0^1 e^{x^2} dx > 4$$

β) Θέτουμε $f^{-1}(x) = u$ και έχουμε:

$$f^{-1}(x) = u \Leftrightarrow x = f(u)$$

$$dx = f'(u)du$$

$$x = 0 \Leftrightarrow f(u) = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

$$x = 1 \Leftrightarrow f(u) = 1 \Leftrightarrow u = x_0$$

$$u \in [0, x_0] \subseteq [0, 1] \Rightarrow u \geq 0$$

Επομένως, το ζητούμενο ολοκλήρωμα είναι:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f^{-1}(x)| dx &= \int_0^{x_0} |u| f'(u) du = \int_0^{x_0} u f'(u) du = \int_0^{x_0} u (5u^4 + 3u^2 + 1) du = \\ &= \int_0^{x_0} (5u^5 + 3u^3 + u) du = \left[\frac{5u^6}{6} + \frac{3u^4}{4} + \frac{u^2}{2} \right]_0^{x_0} = \frac{5x_0^6}{6} + \frac{3x_0^4}{4} + \frac{x_0^2}{2} \end{aligned}$$

5° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω f μια συνάρτηση και $A(x_0, f(x_0))$ ένα σημείο της C_f . Αν υπάρχει το

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ και είναι ένας πραγματικός αριθμός λ , τότε ορίζουμε ως εφαπτομένη της C_f

στο σημείο της A , την ευθεία ε που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ .
Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ είναι:

$$y - f(x_0) = \lambda(x - x_0), \quad \lambda = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

A2. Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν:

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και
- για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$.

Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες γράφουμε $f = g$.

A3. Αν x_0 είναι ένα σημείο του \mathbb{R} , τότε για $x \neq x_0$ ισχύει:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^v - x_0^v}{x - x_0} = \frac{(x - x_0) \cdot (x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1})}{x - x_0} = x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1}$$

Οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1}) = x_0^{v-1} + x_0^{v-1} + \dots + x_0^{v-1} = vx_0^{v-1}$$

Δηλαδή $(x^v)' = vx^{v-1}$

A4.

α. Σωστό (πρόταση του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 178)

β. Σωστό (η παράγωγος της f είναι παντού 0 αφού η f είναι σταθερή συνάρτηση, ως ορισμένο ολοκλήρωμα).

γ. Λάθος (όχι σε ένα τουλάχιστον σημείο αλλά σε ένα το πολύ σημείο).

δ. Λάθος (δεν ισχύει υποχρεωτικά, αφού π.χ. η συνάρτηση $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , ενώ $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, δηλαδή μπορεί και να μηδενίζεται σε κάποια σημεία).

ε. Σωστό⁴ (Αν έχει οριζόντια ασύμπτωτη την $y = a$ θα είναι: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$).

Τότε όμως $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, οπότε ασύμπτωτη είναι πάλι η $y = a$).

ΘΕΜΑ Β

B1. Η σχέση $(f \circ f)(x) + 2f(x) = 2x + 1$ ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε για $x = 2$ έχουμε:

$$f(f(2)) + 2f(2) = 2 \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow f(5) + 10 = 5 \Leftrightarrow f(5) = -5$$

⁴ Εδώ προφανώς εννοεί «αλλάγια ασύμπτωτη» ευθεία της μορφής $y = ax + \beta$ με $a \neq 0$, όπως ορίζεται στο σχολικό βιβλίο.

B2. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$, τότε έχουμε διαδοχικά:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(f(x_1)) = f(f(x_2)) \quad (\text{επειδή η } f \text{ είναι συνάρτηση) και}$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2f(x_1) = 2f(x_2)$$

άρα:

$$f(f(x_1)) + 2f(x_1) = f(f(x_2)) + 2f(x_2) \Rightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

οπότε η f είναι «1-1», και άρα αντιστρέφεται.

B3. Θέτουμε όπου x το $f^{-1}(2)$ και έχουμε:

$$f(f(f^{-1}(2))) + 2f(f^{-1}(2)) = 2f^{-1}(2) + 1 \Rightarrow f(2) + 4 = 2f^{-1}(2) + 1 \Rightarrow 2f^{-1}(2) = 8 \Rightarrow f^{-1}(2) = 4$$

B4. Έχουμε:

$$f(f^{-1}(2x^2 + 7x) - 1) = 2 \Leftrightarrow f^{-1}(2x^2 + 7x) - 1 = f^{-1}(2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(2x^2 + 7x) = 5 \Leftrightarrow 2x^2 + 7x = f(5) \Leftrightarrow 2x^2 + 7x + 5 = 0 \Leftrightarrow \left(x_1 = -1 \text{ ή } x_2 = -\frac{5}{2} \right)$$

Παρατήρηση: Κανονικά σε τέτοιου είδους ασκήσεις θα πρέπει εξ'αρχής να βρούμε το πεδίο ορισμού της f^{-1} , δηλαδή το σύνολο τιμών της f για να δούμε για ποια x ορίζεται η εξίσωση. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Στην προκειμένη περίπτωση είναι $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έχουμε:

$$f(x) - 1 \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq 1 \Leftrightarrow f(x) \geq f(0), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα η συνάρτηση f παρουσιάζει ακρότατο (ολικό ελάχιστο) στο σημείο $x_1 = 0$, το οποίο είναι εσωτερικό σημείο του \mathbb{R} .

Επιπλέον, η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} με:

$$f'(x) = 2x + a - 1, x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα του Fermat, θα είναι:

$$f'(0) = 0 \Leftrightarrow a - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$$

Παρατήρηση: Θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ευρεθείσα τιμή, αφού το αντίστροφο του Θεώρηματος του Fermat δεν ισχύει. Έχουμε:

Για $a = 1$ η συνάρτηση f γίνεται:

$$f(x) = x(x+1) - x + 1 = x^2 + x - x + 1 = x^2 + 1, x \in \mathbb{R}$$

Παρατηρούμε ότι $f(x) = x^2 + 1 \geq 1 = f(0)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επομένως η τιμή $a = 1$ είναι δεκτή.

Γ2. Για κάθε $x \in (1, +\infty)$ έχουμε διαδοχικά:

$$g'(x) \ln x = \frac{2g(x)}{x} \Rightarrow g'(x) \ln x - \frac{2g(x)}{x} = 0 \Rightarrow g'(x) \ln^2 x - 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} g(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g'(x) \ln^2 x - (\ln^2 x)' g(x) = 0 \Rightarrow \frac{g'(x) \ln^2 x - (\ln^2 x)' g(x)}{\ln^4 x} = 0 \Rightarrow \left(\frac{g(x)}{\ln^2 x} \right)' = 0$$

Επομένως, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\frac{g(x)}{\ln^2 x} = c, x \in (1, +\infty)$$

Για $x = e$ είναι:

$$x = e \Rightarrow \frac{g(e)}{\ln^2 e} = c \Rightarrow c = -1$$

Επομένως:

$$\frac{g(x)}{\ln^2 x} = -1 \Leftrightarrow g(x) = -\ln^2 x, x \in (1, +\infty)$$

Γ3. α) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$K(x) = f(x) - g(x) = x^2 + 1 + \ln^2 x, x \in (0, +\infty),$$

η οποία είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$. Θα βρούμε το ελάχιστο της $K(x)$.

Η συνάρτηση $K(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ (ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, +\infty)$) με:

$$K'(x) = 2x + 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = 2 \frac{x^2 + \ln x}{x}, x > 0$$

Θεωρούμε, επίσης, τη συνάρτηση:

$$\Phi(x) = x^2 + \ln x, x > 0$$

η οποία είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$. (Οι ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $K(x)$ είναι όμοια με τις ρίζες και το πρόσημο αντίστοιχα της συνάρτησης $\Phi(x)$).

Η συνάρτηση $\Phi(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ (ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, +\infty)$) με $\Phi'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Άρα η συνάρτηση $\Phi(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, άρα και στο διάστημα $(0, 1)$, οπότε:

$$\Phi((0, 1)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \Phi(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} \Phi(x) \right) = (-\infty, 1), \text{ αφού}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + \ln x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + \ln x) = 1$$

Επειδή $0 \in (-\infty, 1) = \Phi((0, 1))$ υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $\Phi(x_0) = 0 \Leftrightarrow K'(x_0) = 0$.

Έχουμε:

$$x > x_0 \Rightarrow \Phi(x) > \Phi(x_0) \Rightarrow \Phi(x) > 0 \Leftrightarrow K'(x) > 0$$

$$0 < x < x_0 \Rightarrow \Phi(x) < \Phi(x_0) \Rightarrow \Phi(x) < 0 \Leftrightarrow K'(x) < 0$$

Άρα η συνάρτηση $K(x)$ είναι:

- ♦ Γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, x_0]$ (στο x_0 είναι συνεχής) και
- ♦ Γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[x_0, +\infty)$

Η μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης K φαίνονται στον επόμενο πίνακα μεταβολών.

0	x_0	$+\infty$
$K'(x)$	-	+
$K(x)$	↓	↑

Ολ. Ελ

Επομένως, η συνάρτηση:

παρουσιάζει ένα μόνο ελάχιστο (ολικό) στο $x_0 \in (0, 1)$.

β) Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε: $f'(\xi) = g'(\xi)$.

Η συνάρτηση $K(x) = f(x) - g(x)$ έχει ακρότατο στο $x_0 \in (0, 1)$ και είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ (ως διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, 1)$) με:

$$K'(x) = f'(x) - g'(x), \quad x \in (0, 1).$$

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Fermat, θα είναι:

$$K'(x_0) = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) - g'(x_0) = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) = g'(x_0)$$

Το $x_0 = \xi$ είναι μοναδικό, ως μοναδική ρίζα της συνάρτησης Φ του ερωτήματος (Γ3α) (αφού η Φ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1)$), άρα και μοναδική ρίζα της συνάρτησης K' .

Γ4. α) Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{(x-1)^x}{\eta\mu(x-1) + \frac{g(x)}{f(x)}} \right] = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{(x-1)^x}{\eta\mu(x-1) - \frac{\ln^2 x}{x^2 + 1}} \right] = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{\frac{(x-1)^x}{x-1}}{\frac{\eta\mu(x-1)}{x-1} - \frac{\ln^2 x}{(x-1)(x^2+1)}} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{(x-1)^{x-1}}{\frac{\eta\mu(x-1)}{x-1} - \frac{\ln^2 x}{(x-1)(x^2+1)}} \right] \end{aligned}$$

Θα βρούμε ξεχωριστά τα παραπάνω όρια. Με χρήση του κανόνα του de l'Hospital για τα παραπάνω όρια έχουμε:

Επομένως:

$$I = \frac{\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{x-1}}{\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\eta\mu(x-1)}{x-1} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 x}{(x-1)(x^2+1)}} = \frac{1}{1-0} = 1$$

β) Το εμβαδόν του ζητούμενου χωρίου Ω είναι:

$$\begin{aligned} E(\Omega) &= \int_1^e |f(x) - g(x)| dx = \int_1^e |K(x)| dx = \int_1^e K(x) dx = \int_1^e (x^2 + 1 + \ln^2 x) dx = \\ &= \int_1^e x^2 dx + \int_1^e 1 dx + \int_1^e \ln^2 x dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e + [x]_1^e + J = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} + e - 1 + J = \frac{e^3 + 3e - 4}{3} + J \quad (V) \end{aligned}$$

, όπου $J = \int_1^e \ln^2 x dx$. Τώρα για το J έχουμε:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \ln(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{-(x-1)^2} = -\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{x-1} = \lim_{u \rightarrow u_0} e^u = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\eta\mu(x-1)^{x-1}}{x-1} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1 \text{ (όπου } u = x-1, \text{ όταν } x \rightarrow 1 \Leftrightarrow u \rightarrow 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln^2 x}{(x-1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln^2 x}{x^3 - x^2 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \frac{1}{x} \ln x}{3x^2 - 2x + 1} = 0$$

$$\begin{aligned} J &= \int_1^e \ln^2 x dx = \int_1^e (x)' \cdot \ln^2 x dx = [x \ln^2 x]_1^e - \int_1^e x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = e - 2 \int_1^e \ln x dx = \\ &= e - 2 \int_1^e (x)' \cdot \ln x dx = e - 2 [x \ln x]_1^e + 2 \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = e - 2e + 2 \int_1^e 1 dx = -e + 2[x]_1^e = -e + 2e - 2 = e - 2 \end{aligned}$$

Επομένως, από τη σχέση (V), έχουμε τελικά:

$$E(\Omega) = \frac{e^3 + 3e - 4}{3} + J = \frac{e^3 + 3e - 4}{3} + e - 2 = \frac{e^3 + 3e - 4 + 3e - 6}{3} = \frac{e^3 + 6e - 10}{3}$$

, δηλαδή $E(\Omega) = \frac{e^3 + 6e - 10}{3}$ τ.μ

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Αφού η f' είναι συνεχής και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f' διατηρεί σταθερό πρόσημο στο \mathbb{R} , δηλαδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα στο \mathbb{R} , αντίστοιχα.

Από την σχέση:

$$f(x) + f(1-x) = 0, \text{ για } x = \frac{1}{2} \text{ έχουμε:}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 2f\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

Άρα ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ είναι η $x = \frac{1}{2}$, η οποία είναι μοναδική διότι η συνάρτηση f

είναι γνησίως μονότονη άρα και «1-1».

Δ2. Για τη συνάρτηση f ισχύουν:

- ♦ είναι συνεχής στο $[0,1]$ και
- ♦ είναι παραγωγίσιμη στο $(0,1)$

Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού, στο διάστημα $[0,1]$ προκύπτει ότι

υπάρχει $x_0 \in (0,1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f''(x_0) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} \Leftrightarrow f''(x_0) = f(1) - f(0) \Leftrightarrow f''(x_0) = f(1) + f(1) \Leftrightarrow f''(x_0) = 2f(1)$$

(γιατί για $x = 1$ από την σχέση $f(x) + f(1-x) = 0$ έχουμε

$$f(1) + f(0) = 0 \Leftrightarrow f(0) = -f(1).$$

2ος τρόπος: Αποδεικνύεται και με την εφαρμογή του θεωρήματος του Rolle για την συνάρτηση:

$$K(x) = f(x) - 2f(1)x, \quad x \in [0,1],$$

αφού στο διάστημα $[0,1]$ πληρούνται οι προϋποθέσεις του.

Δ3. Για το σημείο $A(x_1, g(x_1))$ στο οποίο η g τέμνει τον άξονα $x'x$ έχουμε:

$$g(x_1) = \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 \Leftrightarrow f(x_1) = 0 \Leftrightarrow f(x_1) = f\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow x_1 = \frac{1}{2},$$

αφού η f είναι συνάρτηση «1-1»

$$\text{Άρα } A\left(\frac{1}{2}, g\left(\frac{1}{2}\right)\right)$$

Για να αποδείξουμε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_g της συνάρτησης g , στο

σημείο $A\left(\frac{1}{2}, g\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° πρέπει να αποδείξουμε ότι η

g είναι παραγωγίσιμη⁵ στο $x_0 = \frac{1}{2}$ με $g'\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x) - g\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{f(x)}{f'(x)} - 0}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{f'(x)\left(x - \frac{1}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left[\frac{1}{f'(x)} \cdot \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{f'(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}} = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \end{aligned}$$

Αφού:

⁵ Η παραγωγή της συνάρτησης g γενικά από τον τύπο της δεν είναι δυνατή, αφού αυτό απαιτεί η f να είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, το οποίο όμως δεν είναι δεδομένο αλλά ούτε προκύπτει ως συνέπεια των δεδομένων.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)} \left(f' \text{ συνεχής στο } \frac{1}{2} \right) \text{ και } f'\left(\frac{1}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}}, \text{ δηλαδή}$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

Επομένως, $g'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = 1 \Leftrightarrow \omega = 45^\circ$

Δ4 α) Έχουμε ότι:

$$f(x) + f(1-x) = 0 \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 f(1-x)dx = 0 \Rightarrow I_1 + I_2 = 0 \quad (1) ,$$

όπου $I_1 = \int_0^1 f(x)dx$ και $I_2 = \int_0^1 f(1-x)dx$. Για το ολοκλήρωμα I_2 έχουμε:

$$1-x = u \Leftrightarrow x = 1-u$$

Θέτουμε: $dx = -du$, οπότε έχουμε:

$$x = 1 \Leftrightarrow u = 0$$

$$x = 0 \Leftrightarrow u = 1$$

$$I_2 = \int_0^1 f(1-x)dx = - \int_1^0 f(u)du = \int_0^1 f(u)du = \int_0^1 f(x)dx = I_1$$

Επομένως, από τη σχέση (1), έχουμε:

$$I_1 + I_2 = 0 \Leftrightarrow 2I_1 = 0 \Leftrightarrow I_1 = 0 \Leftrightarrow I_2 = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 f(x)dx = 0$$

β) Είναι: $\int_0^1 f'(x)dx = f(1) - f(0) = 1$ (I). Από την σχέση $f(x) + f(1-x) = 0$, για $x = 1$ έχουμε:

$$f(0) + f(1) = 0 \quad (II)$$

Από τις σχέσεις (I) και (II), προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε

$$f(0) = -\frac{1}{2} \text{ και } f(1) = \frac{1}{2} .$$

Το ζητούμενο εμβαδόν του χωρίου Ω είναι $E(\Omega) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f^{-1}(x)|dx$.

Θέτουμε:

$$f^{-1}(x) = u \Leftrightarrow x = f(u)$$

$$dx = f'(u)du$$

$$x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow f(u) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow f(u) = f(0) \Leftrightarrow u = 0 \quad (\text{αφού η } f \text{ είναι «1-1»})$$

$$x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow f(u) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow f(u) = f(1) \Leftrightarrow u = 1$$

Επομένως, έχουμε διαδοχικά:

$$E(\Omega) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f^{-1}(x)| dx = \int_0^1 |u| \cdot f'(u) du = \int_0^1 u f'(u) du = [u f(u)]_0^1 - \int_0^1 f(u) du = f(1) - 0 = \frac{1}{2}$$

δηλαδή $E(\Omega) = \frac{1}{2}$ τ.μ.

Δ5. α) Θέτουμε ξανά:

$$f^{-1}(x) = u \Leftrightarrow x = f(u)$$

$$dx = f'(u) du$$

$$x = 0 \Leftrightarrow u = f^{-1}(0) \Leftrightarrow u = \frac{1}{2} \quad (\text{αφού } f\left(\frac{1}{2}\right) = 0)$$

$$x = f(\lambda) \Leftrightarrow u = f^{-1}(f(\lambda)) \Leftrightarrow u = \lambda$$

και έχουμε:

$$K(\lambda) = \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} f(x) dx + \int_0^{f(\lambda)} f^{-1}(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} u f'(u) du =$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} f(x) dx + [u f(u)]_{\frac{1}{2}}^{\lambda} - \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} f(u) du = \lambda f(\lambda) - \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = \lambda f(\lambda) - \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = \lambda f(\lambda)$$

β) Με επαναλαμβανόμενη χρήση του κανόνα του de l' Hospital έχουμε διαδοχικά:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{K(\lambda) \cdot \ln \lambda}{f(\lambda) \cdot e^{\lambda}} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda f(\lambda) \cdot \ln \lambda}{f(\lambda) \cdot e^{\lambda}} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda \cdot \ln \lambda}{e^{\lambda}} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln \lambda}{e^{\lambda}} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\lambda}}{e^{\lambda}} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda e^{\lambda}} = 0$$

6° ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. α. Διατύπωση του Θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών:


Έστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$.

Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και $f(a) \neq f(\beta)$ τότε, για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένας, τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιος, ώστε $f(x_0) = \eta$.

Απόδειξη του Θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών:

Ας υποθέσουμε ότι $f(a) < f(\beta)$. Τότε θα ισχύει $f(a) < \eta < f(\beta)$ (επόμενο σχήμα).


Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \eta$, $x \in [a, \beta]$, παρατηρούμε ότι :



• η g είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και

• $g(a)g(\beta) < 0$, αφού $g(a) = f(a) - \eta < 0$ και $g(\beta) = f(\beta) - \eta > 0$. Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $g(x_0) = f(x_0) - \eta = 0$, οπότε $f(x_0) = \eta$.

β. Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$, τότε, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, δεν παίρνει υποχρεωτικά όλες τις ενδιάμεσες τιμές.



A2. Το λάθος βρίσκεται στην αντικατάσταση $x = \frac{1}{u}$.

Η αντικατάσταση $x = \frac{1}{u}$ δεν είναι σωστή διότι όταν $x = 0$ δεν υπάρχει αντίστοιχο u .

A3. α. Σωστό **β.** Λάθος **γ.** Λάθος **δ.** Σωστό **ε.** Λάθος.

A4. Το 2 (Το σημείο $A(0, f(0))$ είναι θέση τοπικού ελάχιστου της f) διότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (-2, 0)$ και συνεχής στο $[-2, 0]$ άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 0]$. Ακόμα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ και συνεχής στο $[0, 2]$ άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$. Επομένως στο $x_0 = 0$ έχει τοπικό ελάχιστο, δηλαδή το σημείο $A(0, f(0))$ είναι

θέση τοπικού ελάχιστου της f .

ΘΕΜΑ Β

B1. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1». Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$

Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow 1 + f(x_1) = 1 + f(x_2) \Rightarrow f(1 + f(x_1)) = f(1 + f(x_2)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2x_1 - 6 + f(x_1) = 2x_2 - 6 + f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η f αντιστρέφεται.

B2. Για $x = 3$ έχουμε:

$$f(1 + f(3)) = 2 \cdot 3 - 6 + f(3) \Leftrightarrow f(1 + f(3)) = f(3) \Leftrightarrow 1 + f(3) = 3 \Leftrightarrow f(3) = 2$$

B3. Έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} f(1 + f(x^2 + x + 1)) = f(1 + f(3)) &\Leftrightarrow 1 + f(x^2 + x + 1) = 1 + f(3) \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 3 \\ &\Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1, x = 2 \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = e^x + 2x + 1, x \in \mathbb{R}$$

Εφαρμόζουμε το Θ. Bolzano για την g στο $[-1, 0]$

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[-1, 0]$ (ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων στο $[-1, 0]$).
- ♦ $g(0) = 2 > 0$
- ♦ $g(-1) = \frac{1}{e} - 1 < 0$

Άρα υπάρχει $a \in (-1, 0)$ τέτοιο, ώστε:

$$g(a) = 0 \Leftrightarrow e^a + 2a + 1 = 0.$$

Η g είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων

παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}), με $g'(x) = e^x + 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα στο $x \in \mathbb{R}$, άρα και «1-1», δηλαδή η g έχει μοναδική ρίζα την $x = a$.

Γ2. Η f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων

παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f(x) = e^x + 2x + 1, x \in \mathbb{R}.$$

Άρα $f(x) = g(x)$, $x \in \mathbb{R}$ και η g έχει μοναδική ρίζα την $x = a$. Έχουμε:

$$x < a \Rightarrow g(x) < g(a) \Rightarrow f(x) < 0$$

$$x > a \Rightarrow g(x) > g(a) \Rightarrow f(x) > 0$$

Δηλαδή $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (-\infty, a)$ και επειδή η f είναι συνεχής στο $(-\infty, a]$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, a]$. Ακόμα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, +\infty)$ και επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, +\infty)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, +\infty)$.

Επομένως η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = a$, το $f(a) = e^a + 2a + 1$ (1).

Όμως έχουμε:

$$g(a) = 0 \Leftrightarrow e^a + 2a + 1 = 0 \Leftrightarrow e^a = -2a - 1 \quad (2)$$

Άρα η (1) δίνει:

$$f(a) = e^a + a^2 + a = -2a - 1 + a^2 + a = a^2 - a - 1$$

Άρα έχουμε:

$$f(x) \geq f(a) \Rightarrow f(x) \geq a^2 - a - 1 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} .$$

Γ3. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x^2 + x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x^2 + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x^2 \left(\frac{e^x}{x^2} + 1 + \frac{1}{x} \right) \right] = +\infty .$$

Αν $\Delta_1 = (-\infty, \alpha]$, $\Delta_2 = [\alpha, +\infty)$ θα έχουμε:

$$f(\Delta_1) = [a^2 - a - 1, +\infty)$$

$$f(\Delta_2) = [a^2 - a - 1, +\infty)$$

(επειδή η f γν. φθίνουσα στο Δ_1 και γν. αύξουσα στο Δ_2)

Είναι:

$$\alpha \in (-1, 0) \Rightarrow -1 < \alpha < 0 \Rightarrow \begin{cases} 0 < \alpha^2 < 1 \\ 0 < -\alpha < 1 \end{cases} \Rightarrow -1 < \alpha^2 - \alpha - 1 < 1 \text{ και } \frac{2017}{2016} > 1 .$$

Επομένως:

- ♦ $\frac{2017}{2016} \in f(\Delta_1)$, άρα υπάρχει $\rho_1 \in (-\infty, \alpha)$ τέτοιος, ώστε $f(\rho_1) = \frac{2017}{2016}$ και είναι μοναδικός αφού η f , ως γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 , είναι και «1-1».
- ♦ $\frac{2017}{2016} \in f(\Delta_2)$, άρα υπάρχει $\rho_2 \in (a, +\infty)$ τέτοιος, ώστε $f(\rho_2) = \frac{2017}{2016}$ και είναι μοναδικός αφού η f , ως γνησίως αύξουσα στο Δ_2 , είναι και «1-1».

Επομένως η f έχει δύο ακριβώς ρίζες, τις ρ_1, ρ_2 .

Γ4. Η σχέση που θέλουμε να αποδείξουμε γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned} f(x^2 + 1) + f(x^2 + 2) < f(x^2) + f(x^2 + 3) &\Leftrightarrow f(x^2 + 1) - f(x^2) < f(x^2 + 3) - f(x^2 + 2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{f(x^2 + 1) - f(x^2)}{(x^2 + 1) - x^2} < \frac{f(x^2 + 3) - f(x^2 + 2)}{(x^2 + 3) - (x^2 + 2)} &(1) \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για την συνάρτηση f στα διαστήματα:

$$[x^2, x^2 + 1] \text{ και } [x^2 + 2, x^2 + 3], x \in \mathbb{R}$$

- ♦ Η f παραγωγίσιμη στα διαστήματα $[x^2, x^2 + 1]$ και $[x^2 + 2, x^2 + 3]$, $x \in \mathbb{R}$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}). Άρα η f είναι και συνεχής στα διαστήματα αυτά. Επομένως υπάρχουν αντίστοιχα :

$$\xi_1 \in (x^2, x^2 + 1), \xi_2 \in (x^2 + 2, x^2 + 3) \text{ με:}$$

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x^2+1) - f(x^2)}{(x^2+1) - x^2} \quad \text{και} \quad f'(\xi_2) = \frac{f(x^2+3) - f(x^2+2)}{(x^2+3) - (x^2+2)}$$

Έτσι η προς απόδειξη σχέση (1) γίνεται $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, η οποία είναι αληθής αφού:

$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} διότι: $f''(x) = e^x + 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (f' συνεχής στο \mathbb{R}).

Γ5. Έχουμε ότι:

$$y(t) = e^{x(t)} + x^2(t) + x(t), \quad t \geq 0 \quad (2).$$

Τα μέλη της σχέσης (2) είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις για κάθε $t \geq 0$ (ως πράξεις και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων για κάθε $t \geq 0$). Επομένως έχουμε:

$$y'(t) = e^{x(t)} \cdot x'(t) + 2x(t) \cdot x'(t) + x'(t) \Leftrightarrow y'(t) = x'(t)(e^{x(t)} + 2x(t) + 1) \quad (3)$$

Αν $t = t_0$ είναι η χρονική στιγμή που το σημείο Μ διέρχεται από το $(a, f(a))$, τότε $x(t_0) = a \in (-1, 0)$.

Η σχέση (3) για $t = t_0$ γίνεται:

$$y'(t_0) = x'(t_0)(e^{x(t_0)} + 2x(t_0) + 1) \quad (4) \quad \text{με} \quad x'(t) \neq 0$$

Ισχύει ακόμα ότι :

$$e^{x(t_0)} + 2x(t_0) + 1 = e^a + 2a + 1 = 0 \quad (5).$$

Η σχέση (4), λόγω της σχέσης (5) γίνεται:

$$y'(t_0) = x'(t_0) \cdot 0 = 0.$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. α. Έχουμε διαδοχικά:

$$f(x) = x\eta\mu x \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x - f(x) = \sigma\upsilon\nu x - x\eta\mu x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\eta\mu x - f(x))' = (x\sigma\upsilon\nu x)' \Leftrightarrow f(x) = \eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

για $x = 0$ έχουμε:

$$f(0) = 0 + c \Leftrightarrow 0 = c \Leftrightarrow c = 0$$

άρα:

$$f(x) = \eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x$$

β. Η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x$$

είναι παραγωγίσιμη στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ με:

$$f(x) = x\eta\mu x > 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{και} \quad \eta \quad f \quad \text{είναι} \quad \text{συνεχής} \quad \text{στο} \quad \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ και ισχύει:

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow f(0) < f(x) \Leftrightarrow 0 < \eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x \Leftrightarrow \eta\mu x > x\sigma\upsilon\nu x$$

Δ2. $g(x) = |x\epsilon\varphi x - x^2| = |x| \cdot |\epsilon\varphi x - x|$

Από το ερώτημα (Δ1 β) ισχύει:

$$\eta\mu x > x\sigma\upsilon\nu x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \epsilon\varphi x > x.$$

Έχουμε:

Αν $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, τότε $-x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ και ισχύει:

$$\epsilon\varphi(-x) > -x \Leftrightarrow -\epsilon\varphi x > -x \Leftrightarrow \epsilon\varphi x < x$$

για $x = 0 \Rightarrow g(0) = 0$

Άρα $g(x) = x\epsilon\varphi x - x^2, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων

συναρτήσεων στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$) με:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x\epsilon\varphi x - x^2)' = \epsilon\varphi x - 2x + \frac{x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \\ &= (\epsilon\varphi x - x) + \frac{x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} - x = (\epsilon\varphi x - x) + x \left(\frac{1 - \sigma\upsilon\nu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \right) = (\epsilon\varphi x - x) + x \cdot \epsilon\varphi^2 x \end{aligned}$$

- ♦ Αν $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, τότε $\epsilon\varphi x - x > 0$ και $x\epsilon\varphi^2 x > 0$ άρα $g'(x) > 0$
- ♦ Αν $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, τότε $\epsilon\varphi x - x < 0$ και $x\epsilon\varphi^2 x < 0$ άρα $g'(x) < 0$
- ♦ Αν $x = 0 \Rightarrow g'(0) = 0$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ και γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

Η g παρουσιάζει για $x = 0$ ολικό ελάχιστο το $g(0) = 0$.

2ος τρόπος:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x\epsilon\varphi x - x^2)' = \epsilon\varphi x - 2x + \frac{x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + x - 2x\sigma\upsilon\nu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \\ &= \frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot (\eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x) + x\eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \end{aligned}$$

$$g'(0) = 0$$

- ♦ Αν $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, τότε $\sigma\upsilon\nu x > 0$, $\eta\mu x > x\sigma\upsilon\nu x$, $x\eta\mu^2 x > 0$, τότε $g'(x) > 0$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

♦ Έστω $x_1, x_2 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ με $x_1 < x_2$, τότε:

$$-x_1 > -x_2 \Rightarrow g(-x_1) > g(-x_2) \Rightarrow g(x_1) > g(x_2)$$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

Η g παρουσιάζει για $x = 0$ ολικό ελάχιστο το $g(0) = 0$

Δ3. α) $g(x) = a$, όπου $a > 0$

♦ $g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right)\right) = [0, +\infty)$ και $a \in [0, +\infty)$, άρα υπάρχει μοναδικό $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

(γιατί η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$) τέτοιο, ώστε $g(x_0) = a$

♦ $-x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ και

$$g(-x_0) = (-x_0)\varepsilon\varphi(-x_0) - (-x_0)^2 = g(x_0) = a$$

Το $-x_0$ είναι μοναδικό

(γιατί η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$)

Άρα το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης $g(x) = a$, όταν

$$a > 0 \text{ είναι } -x_0 + x_0 = 0$$

β). Επειδή x_1, x_2, x_3 οι θετικές ρίζες των εξισώσεων

$g(x) = 1, g(x) = 2, g(x) = 3$ αντίστοιχα, έχουμε:

$$g(x_1) = 1, g(x_2) = 2, g(x_3) = 3$$

και είναι:

$$1 < 2 < 3 \Leftrightarrow g(x_1) < g(x_2) < g(x_3) \Leftrightarrow x_1 < x_2 < x_3$$

από την εφαρμογή του Θ.Μ.Τ του Διαφορικού Λογισμού για την g στα $[x_1, x_2], [x_2, x_3]$ (αφού

πληρούνται οι προϋποθέσεις διότι g παραγωγίσιμη στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, επομένως και στα, $[x_2, x_3]$, ,

άρα και συνεχής σε αυτά) έχουμε:

$$(x_2 - x_1) \cdot g'(\xi_1) = g(x_2) - g(x_1) = 2 - 1 = 1, \xi_1 \in (x_1, x_2)$$

$$(x_3 - x_2) \cdot g'(\xi_2) = g(x_3) - g(x_2) = 3 - 2 = 1, \xi_2 \in (x_2, x_3)$$

Προσθέτοντας τις προηγούμενες σχέσεις κατά μέλη προκύπτει:

$$(x_2 - x_1) \cdot g'(\xi_1) + (x_3 - x_2) \cdot g'(\xi_2) = 2$$

Δ4. α. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln [\eta \mu x - f(x)] - \ln x + x^2}{\eta \mu^2 x - \chi \sigma \nu \nu x + x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln (\sigma \nu \nu x) + x^2}{\eta \mu^2 x - \chi \sigma \nu \nu x + x} \stackrel{D.L.P}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\varepsilon \varphi x + 2x}{2\eta \mu \chi \sigma \nu \nu x - \sigma \nu \nu x + \chi \eta \mu x + 1} \stackrel{D.L.P}{=} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} + 2}{2\sigma \nu \nu^2 x - 2\eta \mu^2 x + 2\eta \mu x + \chi \sigma \nu \nu x} = \\ &= \frac{-\frac{1}{\sigma \nu \nu^2 0} + 2}{2\sigma \nu \nu^2 0 - 2\eta \mu^2 0 + 2\eta \mu 0 + 0\sigma \nu \nu 0} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2ος τρόπος:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln [\eta \mu x - f(x)] - \ln x + x^2}{\eta \mu^2 x - \chi \sigma \nu \nu x + x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln (\sigma \nu \nu x) + x^2}{\eta \mu^2 x - \chi \sigma \nu \nu x + x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln (\sigma \nu \nu x)}{x^2} + 1}{\left(\frac{\eta \mu x}{x}\right)^2 - \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{x}} = l \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\varepsilon \varphi x}{2x} &\stackrel{D.L.H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln (\sigma \nu \nu x)}{x^2} \stackrel{D.L.H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\sigma \nu \nu^2 x} = -\frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\eta \mu x}{x}\right)^2 &= l^2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{x} &\stackrel{D.L.H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\eta \mu x}{1} = 0 \end{aligned}$$

Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln [\eta \mu x - f(x)] - \ln x + x^2}{\eta \mu^2 x - \chi \sigma \nu \nu x + x} = \frac{-\frac{1}{2} + 1}{1 - 0} = \frac{1}{2}$$

β. Για $0 < x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \eta \mu x - \chi \sigma \nu \nu x > 0$ (I) (από το ερώτημα Δ1 β) και $\chi \eta \mu x > 0$ (II) για κάθε

$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. Άρα με πρόσθεση κατά μέλη έχουμε:

$$\eta \mu x - \chi \sigma \nu \nu x + \chi \eta \mu x > 0 \quad \text{(III), για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f, -f$ τέμνονται μόνο στο σημείο $O(0,0)$ (αφού $f(0) = f'(0) = 0$).

Το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f

και $-f'$ και την ευθεία $x = \frac{\pi}{2}$

είναι (λόγω της σχέσης (III)) έχουμε:

$$|\eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x| = \eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]:$$

$$\begin{aligned} E(\Omega) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x) - f'(x)| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x) dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \chi\sigma\upsilon\nu x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \chi\eta\mu x dx = I_1 - I_2 + I_3 \quad (1) \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu x dx = \left[-\sigma\upsilon\nu x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \chi\sigma\upsilon\nu x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\eta\mu x)' dx = \left[x\eta\mu x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu x dx = \frac{\pi}{2} + \left[\sigma\upsilon\nu x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \chi\eta\mu x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\sigma\upsilon\nu x)' dx = -\left[\chi\sigma\upsilon\nu x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma\upsilon\nu x dx = \left[\eta\mu x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Άρα: $E(\Omega) = 1 - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) + 1 = 3 - \frac{\pi}{2}$ τ.μ.

Εναλλακτικά για το μοναδικό σημείο τομής των $f, -f$ έχουμε:

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f, -f$ τέμνονται μόνο στο σημείο $O(0,0)$ αφού:

$$f(x) = -f'(x) \Leftrightarrow \eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x = -\chi\eta\mu x \Leftrightarrow \eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x = 0 \quad (1)$$

Προφανώς για $x = 0$ η (1) επαληθεύεται, δηλαδή οι $f, -f$ τέμνονται στο $O(0,0)$.

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$K(x) = \eta\mu x - \chi\sigma\upsilon\nu x + \chi\eta\mu x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων

συναρτήσεων στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$) με $K'(x) = \chi\eta\mu x + \eta\mu x + \chi\sigma\upsilon\nu x > 0$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ και

επειδή η K είναι συνεχής στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ θα είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, άρα και «1-1»

και επομένως η $x = 0$ είναι η μοναδική ρίζα της (1). Άρα οι $f, -f$ τέμνονται μόνο στο σημείο $O(0,0)$.


7^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. α. Η συνάρτηση $f - g$ είναι συνεχής στο Δ και για κάθε εσωτερικό σημείο $x \in \Delta$ ισχύει:

$$(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x) = 0.$$

Επομένως, σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, η συνάρτηση $f - g$ είναι σταθερή στο Δ . Άρα, υπάρχει σταθερά C τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει $f(x) - g(x) = c$, οπότε $f(x) = g(x) + c$.



ii. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει:

$$F'(x) = f(x), \text{ για κάθε } x \in \Delta.$$

A2. Αν μια συνάρτηση f είναι:


- ♦ συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- ♦ παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, β)

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

Γεωμετρική ερμηνεία

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ένα $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη της ευθείας AB .



A3. α. Λάθος **β.** Σωστό **γ.** Λάθος **δ.** Σωστό **ε.** Λάθος

ΘΕΜΑ Β

B1. Η f είναι συνεχής σε κάθε ένα από τα διαστήματα:

$[-4, -2), (-2, 0), (0, 5]$, διότι δεν είναι συνεχής στο σημείο $x_1 = -2$ και δεν ορίζεται στο σημείο $x_2 = 0$

B2. α. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 1$ **β.** $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

B3.

α. Τα εσωτερικά σημεία $x_3 = 1, x_4 = 4, x_5 = 3$ του διαστήματος $(0, 5]$ είναι τα ζητούμενα κρίσιμα σημεία.

Στα σημεία $A(x_3, f(x_3)), B(x_4, f(x_4))$ υπάρχει εφαπτομένη

παράλληλη στον άξονα $x'x$ και επομένως $f'(x_3) = 0$ και $f'(x_4) = 0$ άρα οι θέσεις $x_3 = 1, x_4 = 4$ είναι κρίσιμα σημεία της f . Στο σημείο $\Gamma(x_5, f(x_5))$ δεν υπάρχει η παράγωγος της f και άρα η θέση x_5 είναι επίσης κρίσιμο σημείο της f .

β. Η παράγωγος της f , όταν $x \in (-4, -2)$ είναι ίση με $\tan 135^\circ = -1$ ή διαφορετικά είναι ο λόγος $\frac{(3-1)}{(-4+2)} = -1$.

B4. Το I ορίζεται, αφού η f ορίζεται στο διάστημα $[2, 4]$ και είναι συνεχής σε αυτό Το J δεν ορίζεται αφού η f δεν ορίζεται στο σημείο $x_0 = 0$.

B5.

α. Το πεδίο ορισμού D_{fog} έχουμε:

$$D_{fog} = \{x \in \mathbb{R} / g(x) \in [-4, 0) \cup (0, 5]\}$$

Είναι:

$g(x) \in [-4, 0) \cup (0, 5]$ αν, και μόνο αν,

$$(-4 \leq x+1 < 0 \text{ ή } 0 < x+1 \leq 5) \text{ ή } x \in [-5, -1) \cup (-1, 4]$$

Επομένως $D_{fog} = [-5, -1) \cup (-1, 4]$.

β. Ο τύπος της συνάρτησης fog είναι:

$$(fog)(x) = f(g(x)) = f(x+1), x \in D_{fog}.$$

Επομένως η γραφική παράσταση της fog είναι η γραφική παράσταση της f μετατοπισμένη κατά 1 μονάδα αριστερά (οριζόντια μετατόπιση).

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πολυωνυμική) με :

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0, x \in \mathbb{R}.$$

Άρα αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} θα είναι και “1-1” και επομένως η f αντιστρέφεται. Το σύνολο τιμών της είναι το (A, B) , όπου:

$$A = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, B = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \text{ δηλαδή το } \mathbb{R}.$$

Γ2. Αρκεί να δείξω ότι η εξίσωση $f^{-1}(x) = f(x)$ έχει μοναδική ρίζα το -1 . Έχουμε:

$$f^{-1}(x) = f(x) \Leftrightarrow f(f(x)) = x$$

Έστω:

$$g(x) = f(f(x)) - x, \text{ τότε είναι } g(x) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x) = f(x)$$

Παρατηρώ ότι:

$$g(-1) = f(f(-1)) + 1 = f(-1) + 1 = -1 + 1 = 0$$

Άρα το -1 είναι ρίζα της $g(x)$

Η συνάρτηση $g(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως σύνθεση και διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$g'(x) = f(f(x))f'(x) - 1 = (3(x^3 + x + 1)^2 + 1)(3x^2 + 1) - 1 = (9x^2 + 3)(x^3 + x + 1)^2 + 3x^2 > 0$$

Άρα η $g(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , άρα και «1-1».

Επομένως το -1 είναι η μοναδική ρίζα της

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x) = f(x)$$

Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο το $A(-1, f(-1))$ ή $A(-1, -1)$.

Εναλλακτικά

2ος τρόπος:

Έχουμε:

$$f(-1) = -1 \Leftrightarrow f^{-1}(-1) = -1, \text{ δηλαδή το } -1 \text{ είναι ρίζα της εξίσωσης:}$$

$$f^{-1}(x) = f(x) \Leftrightarrow f(f(x)) = x$$

Έστω ότι η $f^{-1}(x) = f(x)$ έχει 2 ρίζες ρ_1, ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$) επομένως και η $f(f(x)) = x$ έχει ρίζες τις ρ_1, ρ_2 .

Θεωρώ τη συνάρτηση: $g(x) = f(f(x)) - x, x \in \mathbb{R}$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Rolle για την g στο διάστημα $[\rho_1, \rho_2]$. Έχουμε:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[\rho_1, \rho_2]$ (ως σύνθεση και διαφορά συνεχών συναρτήσεων στο $[\rho_1, \rho_2]$)
- ♦ Η g είναι παραγωγίσιμη στο (ρ_1, ρ_2) (ως σύνθεση και διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο (ρ_1, ρ_2)) με:

$$g'(x) = f(f(x)) \cdot f'(x) - 1 = (3f^2(x) + 1) \cdot (3x^2 + 1) - 1 = 9f^2(x) \cdot x^2 + 3f^2(x) + 3x^2 > 0$$

- ♦ $g(\rho_1) = g(\rho_2) = 0$

Άρα υπάρχει $\xi \in (\rho_1, \rho_2)$ τέτοιο, ώστε $g'(\xi) = 0$ που είναι άτοπο αφού $g'(x) > 0$.

Άρα η $x = -1$ η μοναδική ρίζα της $f^{-1}(x) = f(x)$ και επομένως οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο το $A(-1, f(-1))$ ή $A(-1, -1)$.

Γ3. α.

- ♦ Για $x = y$ ισχύει η ισότητα:

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| = |f(x) - f(y)| = |x - y|$$

- ♦ Για $x < y$ εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Τ. του διαφορικού λογισμού στο διάστημα $[x, y]$ και έχουμε:

Η f είναι συνεχής στο $[x, y]$ (ως πολυωνυμική)

Η f είναι παραγωγίσιμη στο (x, y) (ως πολυωνυμική)

Άρα υπάρχει $\xi_1 \in (x, y) : f'(\xi_1) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 1$ ($f'(\xi_1) = 3\xi_1^2 + 1 \geq 1$), δηλαδή:

$$f(y) - f(x) \geq y - x \quad \text{ή} \quad |f(x) - f(y)| \geq |x - y| \quad \text{διότι:}$$

$$|f(x) - f(y)| = |f(y) - f(x)| = f(y) - f(x) \geq y - x = |y - x| = |x - y| \quad (1)$$

- ♦ Για $x > y$ εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Τ. του διαφορικού λογισμού στο διάστημα $[y, x]$ και έχουμε:

Η f είναι συνεχής στο $[y, x]$ (ως πολυωνυμική)

Η f είναι παραγωγίσιμη στο (y, x) (ως πολυωνυμική)

Άρα υπάρχει $\xi_2 \in (y, x) : f'(\xi_2) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \geq 1$ ($f'(\xi_2) = 3\xi_2^2 + 1 \geq 1$), δηλαδή:

$$f(x) - f(y) \geq x - y \quad \text{ή} \quad |f(x) - f(y)| \geq |x - y| \quad \text{διότι:}$$

$$|f(x) - f(y)| = f(x) - f(y) \geq x - y = |x - y| \quad (2)$$

Επομένως από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

$$|x - y| \leq |f(x) - f(y)| \quad (l) \quad \text{για κάθε} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Στην σχέση (l) θέτουμε όπου x το $f^{-1}(x)$ και y το $f^{-1}(y)$, αφού η (l) ισχύει για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ και $f^{-1}(x), f^{-1}(y) \in \mathbb{R}$. Άρα έχουμε:

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq |x - y| \quad \text{και τελικά:}$$

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq |x - y| \leq |f(x) - f(y)|$$

β. Έστω οποιοδήποτε $x_0 \in \mathbb{R}$.

Θα αποδείξουμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 , δηλαδή ότι: $\lim_{x \rightarrow x_0} f^{-1}(x) = f^{-1}(x_0)$.

Έχουμε:

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(x_0)| \leq |x - x_0| \Leftrightarrow -|x - x_0| \leq f^{-1}(x) - f^{-1}(x_0) \leq |x - x_0|$$

$$\text{Είναι} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = \lim_{x \rightarrow x_0} (-|x - x_0|) = 0$$

Από το κριτήριο της παρεμβολής έχουμε και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f^{-1}(x) - f^{-1}(x_0)) = 0 \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f^{-1}(x) = f^{-1}(x_0)$$

Γ4. Έχουμε ισοδύναμα:

$$f^{-1}(\xi) + 2\xi = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(\xi) = -2\xi \Leftrightarrow \xi = f(-2\xi) \Leftrightarrow f(-2\xi) - \xi = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση: $g(x) = f(-2x) - x$, $x \in \mathbb{R}$

Ισχύουν:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (ως σύνθεση και διαφορά συνεχών συναρτήσεων στο $[0, 1]$).

- ♦ $g(0) = f(0) - 0 = 1 > 0$
- ♦ $g(1) = f(-2) - 1 = -9 - 1 = -10 < 0$

Από το Θεώρημα του Bolzano υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $g(\xi) = 0$ ή ισοδύναμα $f^{-1}(\xi) + 2\xi = 0$.

Επιπλέον η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ (ως σύνθεση και διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, 1)$) με:

$$g'(x) = -2f'(-2x) - 1 = -2(12x^2 + 1) - 1 = -24x^2 - 3 < 0$$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο \mathbb{R} , άρα και «1-1», και επομένως το παραπάνω ξ είναι μοναδικό.

Εναλλακτικά

2ος τρόπος

Ισχύει $f(0) = 1$ και $f(-1) = -1$ και η f είναι συνεχής στο $[-1, 0]$. Επομένως, σύμφωνα με το Θ. Bolzano υπάρχει (και είναι μοναδικό) $x_1 \in (-1, 0)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_1) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(0) = x_1 \in (-1, 0)$$

Ακόμα $f(0) = 1 \Leftrightarrow f^{-1}(1) = 0$

Θα εφαρμόσουμε το Θ. Bolzano για την συνάρτηση:

$$h(x) = f^{-1}(x) + 2x$$

στο διάστημα $[0, 1]$.

Έχουμε:

Η $h(x)$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (άθροισμα συνεχών στο $[0, 1]$) και

$$h(0) = f^{-1}(0) = x_1 < 0, \quad h(1) = f^{-1}(1) + 2 = 2 > 0$$

Επομένως υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$h(\xi) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(\xi) + 2\xi = 0$$

Η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα διότι:

Αν $y_1, y_2 \in f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ με $y_1 < y_2$. Θα αποδείξουμε ότι: $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.

Έστω $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ με $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Άρα

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2) \quad (*)$$

Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα και ισχύει η (*) έχουμε διαδοχικά:

$$y_1 < y_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα.

Τώρα θα αποδείξουμε ότι η $h(x)$ είναι γνησίως αύξουσα:

Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f^{-1}(x_1) < f^{-1}(x_2)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2$$

και με πρόσθεση αυτών κατά μέλη παίρνουμε:

$$f^{-1}(x_1) + 2x_1 < f^{-1}(x_2) + 2x_2 \Rightarrow h(x_1) < h(x_2)$$

Το ξ είναι μοναδικό, αφού η συνάρτηση $h(x)$ είναι γνησίως αύξουσα, άρα και «1-1».

Γ5. Έχουμε διαδοχικά για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$F^2(x) \geq F(x)F(2-x) \Leftrightarrow F^2(x) - F(x)F(2-x) \geq 0 \quad (1)$$

Θέτουμε:

$$g(x) = F^2(x) - F(x)F(2-x), \quad x \in \mathbb{R}$$

και από την (1) προκύπτει:

$$g(x) \geq 0 \Leftrightarrow g(x) \geq g(1), \quad x \in \mathbb{R}$$

Δηλαδή η συνάρτηση g έχει ελάχιστο στο $x_0 = 1$ το οποίο είναι εσωτερικό σημείο του \mathbb{R} και η g είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων και σύνθεσης παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$g'(x) = 2F(x)F'(x) - F'(x)F(2-x) + F(x)F'(2-x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Επομένως από το Θεώρημα του Fermat θα έχουμε:

$$\begin{aligned} g'(1) = 0 &\Leftrightarrow 2F(1)F'(1) - F'(1)F(1) + F(1)F'(1) = 0 \quad \text{ή} \\ 2F(1)F'(1) = 0 &\Rightarrow F(1) = 0 \quad (F'(1) = f'(1) = 3 \neq 0) \end{aligned}$$

Άρα είναι:

$$F'(x) = f'(x) \Leftrightarrow F(x) = f(x) + c, \quad x \in \mathbb{R}$$

Για $x = 1 \Rightarrow F(1) = f(1) + c \Rightarrow 0 = 3 + c \Rightarrow c = -3$

Επομένως:

$$F(x) = f(x) - 3 = x^3 + x - 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$f'(x) + f(x) + 4e^{x-1} = \ln x + \frac{1}{x} + x + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^x f'(x) + e^x f(x) + 4e^{2x-1} = e^x \ln x + e^x \frac{1}{x} + e^x x + e^x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (e^x f(x) + 2e^{2x-1})' = (e^x \ln x)' + (xe^x)' \Leftrightarrow e^x f(x) + 2e^{2x-1} = e^x \ln x + xe^x + c$$

για $x = 1$ έχουμε:

$$ef(1) + 2e = e \ln 1 + e + c \Leftrightarrow -e + 2e = 0 + e + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα:

$$e^x f(x) + 2e^{2x-1} = e^x \ln x + xe^x \Leftrightarrow f(x) = \ln x + x - 2e^{x-1}$$

Δ2. Η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln x + x - 2e^{x-1}$$

είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ (ως πράξεις και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, +\infty)$) με:

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 1 - 2e^{x-1} \quad \text{και} \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} - 2e^{x-1} < 0, \quad x > 0$$

επομένως η f' είναι γνησίως φθίνουσα .

Παρατηρούμε ότι:

$$f'(1) = \frac{1}{1} + 1 - 2e^{1-1} = 0$$

Έχουμε:

- $x > 1 \xrightarrow{f \downarrow} f'(x) < f'(1) \Rightarrow f'(x) < 0$
- $x < 1 \Rightarrow f'(x) > f'(1) \Rightarrow f'(x) > 0$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	
$f(x)$	\nearrow	\searrow	

Μονοτονία

- ♦ η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0,1]$
- ♦ γνησίως φθίνουσα στο $[1,+\infty)$

Ακρότατα: η f παρουσιάζει για $x=1$ μέγιστο το

Εναλλακτικά

2ος τρόπος (για τον υπολογισμό του ακροτάτου).

Για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$\ln x \leq x - 1 \quad (I) \quad \text{και} \quad e^{x-1} \geq x \Leftrightarrow -2e^{x-1} \leq -2x \quad (II)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (I) και (II) έχουμε:

$$\ln x - 2e^{x-1} \leq -x - 1 \Leftrightarrow \ln x - 2e^{x-1} + x \leq -x - x + x \Leftrightarrow f(x) \leq -1 \Leftrightarrow f(x) \leq f(1)$$

για κάθε $x > 0$.

Επομένως η f παρουσιάζει στο 1 ολικό μέγιστο, το $f(1) = -1$

Δ3 . Είναι:

Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$f'(x) = \int_e^x \frac{f'(\ln t)}{t} dt \Leftrightarrow f'(x) = [f(\ln t)]_e^x = f(2) - f(1)$$

Για την f ισχύουν:

- ♦ Είναι συνεχής στο $[1,2]$ (ως παραγωγίσιμη στο $(0,+\infty)$)
- ♦ Είναι παραγωγίσιμη στο $(1,2)$ (ως παραγωγίσιμη στο $(0,+\infty)$)

αφού για την f ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ του διαφορικού, υπάρχει x_0 στο $(1,2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_0) = f(2) - f(1)$$

Η ρίζα x_0 είναι μοναδική στο διάστημα $(1, 2)$ αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα άρα και «1-1».

Εναλλακτικά:

2ος τρόπος:

Θεωρούμε την συνάρτηση:

$$\Lambda(x) = f'(x) + f(1) - f(2)$$

για την οποία ισχύουν:

- ♦ είναι συνεχής στο $[1,2]$ (ως παραγωγίσιμη στο $(0,+00)$)

$$\Lambda(1) = f'(1) + f(1) - f(2) = 0 + f(1) - f(2) > 0$$

διότι $1 < 2 \Rightarrow f(1) > f(2) \Rightarrow f(1) - f(2) > 0$

$$\Lambda(2) = f'(2) + f(1) - f(2) = \frac{1}{2} + 1 - 2e - 1 - \ln 2 - 2 + 2e = -\frac{3}{2} - \ln 2 < 0$$

Από το Θ. Bolzano υπάρχει x_0 στο $(1,2)$ τέτοιο, ώστε:

$$\Lambda(x_0) = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) + f(1) - f(2) \Leftrightarrow f'(x_0) = f(2) - f(1)$$

Η ρίζα x_0 είναι μοναδική στο διάστημα $(1,2)$ αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα άρα και 1-1.

Εναλλακτικά:

3ος τρόπος:

Έστω η συνάρτηση:

$$K(x) = f(x) - x \cdot (f(2) - f(1))$$

Για την f ισχύουν:

- ♦ Είναι συνεχής στο $[1,2]$ (ως παραγωγίσιμη στο $(0,+00)$)
- ♦ Είναι παραγωγίσιμη στο $(1,2)$ (ως παραγωγίσιμη στο $(0,+00)$)
- ♦ $k(1) = 2f(1) - f(2)$, $k(2) = 2f(1) - f(2)$

από το Θ. Rolle έχουμε :

υπάρχει x_0 στο $(1,2)$ τέτοιο, ώστε:

$$k'(x_0) = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) + f(1) - f(2) \Leftrightarrow f'(x_0) = f(2) - f(1)$$

Η ρίζα x_0 είναι μοναδική στο διάστημα $(1,2)$ αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα άρα και «1-1».

Δ4. Η f παρουσιάζει για $x=1$ μέγιστο το $f(1)$ άρα:

$$f(x) \leq f(1) \Rightarrow f(x) \leq -1 < 0$$

Επομένως :

$$f\left(\frac{1}{x}\right) < 0 \left(\text{γιατί } \frac{1}{x} > 0 \text{ για κάθε } x > 0 \right)$$

$$|h(x)| = \left| \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right| = \frac{1}{x^2} \left| f\left(\frac{1}{x}\right) \right| = -\frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ για κάθε } x \in \left[\frac{1}{e}, 1 \right]$$

το εμβαδόν του χωρίου ισούται με :

$$E = \int_{\frac{1}{e}}^1 |h(x)| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left| \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 -\frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx \stackrel{u=\frac{1}{x}}{=} \int_e^1 f(u) du =$$

$$\int_e^1 (\ln u + u - 2e^{u-1}) du = \int_e^1 \left(u \ln u - u + \frac{u^2}{2} - 2e^{u-1} \right) du = \frac{4e^{-1} - e^2 - 5}{2}$$

Δ5. Η f παρουσιάζει για $x=1$ μέγιστο το $f(1)$ άρα:

$$f(x) \leq f(1) \Rightarrow f(x) \leq -1 < 0$$

α) Η απόσταση των (A_λ, B_λ) είναι:

$$(A_\lambda B_\lambda) = |f(\lambda) - g(\lambda)| = |2f(\lambda)| = 2|f(\lambda)| = -2f(\lambda)$$

και γράφεται ως συνάρτηση του λ , $d(\lambda) = -2f(\lambda)$

$$d(\lambda) = -2f(\lambda), \quad d(\lambda) \geq 0 \Leftrightarrow f(\lambda) \leq 0 \Leftrightarrow \lambda \geq 1$$

λ	0	1	$+\infty$
		-	
$d'(\lambda)$		-	+
$d(\lambda)$		↘	↗

άρα η ελάχιστη τιμή είναι $d(1) = (A_1 B_1) = -2f(1) = 2$

β)

$$E(\lambda) = \frac{1}{2} \lambda \cdot (-2f(\lambda)) = -\lambda \cdot f(\lambda)$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{E(\lambda)}{\lambda^2 + 1} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} -\frac{\lambda(\ln \lambda + \lambda - 2e^{\lambda-1})}{\lambda^2 + 1} = -\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^2 \left(\frac{\ln \lambda}{\lambda} + 1 - 2 \frac{e^{\lambda-1}}{\lambda} \right)}{\lambda^2 + 1} =$$

$$-\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{\lambda^2}{\lambda^2 + 1} \right) \cdot \left(\frac{\ln \lambda}{\lambda} + 1 - 2 \frac{e^{\lambda-1}}{\lambda} \right) = -1 \cdot (0 + 1 - \infty) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\ln \lambda}{\lambda} \stackrel{D.L.H}{=} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{(\ln \lambda)'}{(\lambda)'} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} = 0$$

γιατί :

$$\bullet \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{e^{\lambda-1}}{\lambda} \stackrel{D.L.H}{=} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{(e^{\lambda-1})'}{(\lambda)'} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{\lambda-1} = +\infty$$

$$\bullet \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{\lambda^2}{\lambda^2 + 1} \right) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^2}{\lambda^2} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{E(\lambda)}{\lambda^2 + 1} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\lambda (\ln \lambda + \lambda - 2e^{\lambda-1})}{\lambda^2 + 1} = - \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{(\ln \lambda + \lambda - 2e^{\lambda-1})}{\lambda + \frac{1}{\lambda}} \stackrel{D.L.H}{=} - \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\lambda} + 1 - 2e^{\lambda-1}}{1 - \frac{1}{\lambda^2}} = \\ &= - \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\lambda + \lambda^2 - 2\lambda^2 e^{\lambda-1}}{\lambda^2 - 1} = \frac{0 + 0 - 0}{0^2 - 1} = \frac{0}{-1} = 0 \end{aligned}$$

8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστο διάστημα $[a, \beta]$, όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (a, β) και επιπλέον:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$$

A2. i. Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Θα αποδείξουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$. Πράγματι στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

οπότε έχουμε:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Επειδή $f'(\xi) > 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε $f(x_2) - f(x_1) > 0$, οπότε $f(x_1) < f(x_2)$.

ii. Το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος δεν ισχύει.

Αντι-παράδειγμα:

Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , όμως έχει παράγωγο $f'(x) = 3x^2$ η οποία δεν είναι θετική σε όλο το \mathbb{R} , αφού $f'(0) = 0$ (ισχύει όμως $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$).

A3. α) Σωστό **β)** Λάθος **γ)** Σωστό **δ)** Λάθος **ε)** Σωστό

Αντιπαραδείγματα στις Λάθος προτάσεις:

β) Η συνάρτηση $f(x) = |x|, x \in \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$ χωρίς να είναι παραγωγίσιμη σε αυτό αφού:

δ) Έχουμε:

$$\int_0^{2\pi} \eta \mu x dx = -[\sigma \nu x]_0^{2\pi} = -\sigma \nu 2\pi - +\sigma \nu 0 = 1 + 1 = 0$$

Αλλά δεν είναι $\eta \mu x = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

ΘΕΜΑ Β

B1. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το \mathbb{R} . Έστω ότι η f είναι γνησίως μονότονη.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Θα εξετάσουμε το είδος μονοτονίας της g (για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε το πρόσημο της διαφοράς):

$$\begin{aligned} g(x_1) - g(x_2) &= \frac{f(x_1)}{f^2(x_1) + 1} - \frac{f(x_2)}{f^2(x_2) + 1} = \frac{f(x_1)(f^2(x_2) + 1) - f(x_2)(f^2(x_1) + 1)}{(f^2(x_2) + 1)(f^2(x_1) + 1)} = \\ &= \frac{f(x_1)f(x_2)(f(x_2) - f(x_1)) - (f(x_2) - f(x_1))}{(f^2(x_2) + 1)(f^2(x_1) + 1)} = \frac{(f(x_2) - f(x_1))(f(x_1)f(x_2) - 1)}{(f^2(x_2) + 1)(f^2(x_1) + 1)} \end{aligned} \quad (1)$$

Έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} 0 < f(x_1) < 1 \\ 0 < f(x_2) < 1 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 < f(x_1)f(x_2) < 1 \Rightarrow f(x_1)f(x_2) - 1 < 0$$

και $(f^2(x_2)+1)(f^2(x_1)+1) > 0$

Άρα:

♦ Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} τότε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0 \Rightarrow g(x_1) - g(x_2) < 0 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2)$$

δηλαδή η g είναι επίσης γνησίως αύξουσα.

♦ Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο \mathbb{R} τότε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) < 0 \Rightarrow g(x_1) - g(x_2) > 0 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2)$$

δηλαδή η g είναι επίσης γνησίως φθίνουσα.

B2. Έστω ότι η f και g είναι και οι δύο γνησίως αύξουσες στο \mathbb{R} ή και οι δύο γνησίως φθίνουσες στο \mathbb{R} (αφού, σύμφωνα με το ερώτημα B1 έχουν το ίδιο είδος μονοτονίας).

♦ f και g γνησίως αύξουσες στο \mathbb{R}

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) < f(g(x_2)) \Rightarrow (fog)(x_1) < (fog)(x_2)$$

δηλαδή η fog είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

♦ f και g γνησίως φθίνουσες στο \mathbb{R} .

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) < f(g(x_2)) \Rightarrow (fog)(x_1) < (fog)(x_2)$$

B3. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$(fog)(x^3+1) = (fog)(4x^2+2x) \Leftrightarrow x^3+1 = 4x^2+2x \Leftrightarrow x^3+1-4x^2-2x = 0$$

Θέτουμε: $h(x) = x^3+1-4x^2-2x$, $x \in \mathbb{R}$ και έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty, h(0) = 1, h(1) = -4 < 0$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$, υπάρχει $\alpha < 0$ τέτοιο, ώστε $h(\alpha) < 0$ και αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$

υπάρχει $\beta > 0$ τέτοιο, ώστε $h(\beta) > 0$.

Από το θεώρημα του Bolzano στα διαδοχικά διαστήματα $[\alpha, 0]$, $[0, 1]$, $[1, \beta]$ (στα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις αφού η $h(x)$ είναι συνεχής ως πολυωνυμική στο \mathbb{R} , άρα και στα διαστήματα αυτά) υπάρχουν $\xi_1 \in (\alpha, 0)$, $\xi_2 \in (0, 1)$, $\xi_3 \in (1, \beta)$ τέτοια, ώστε:

$$h(\xi_1) = h(\xi_2) = h(\xi_3) = 0 \text{ με } \xi_1, \xi_2 > 0 \text{ και } \xi_3 < 0.$$

Τέλος επειδή η $h(x)$ είναι πολυώνυμο 3ου βαθμού δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 3 ρίζες και επομένως οι παραπάνω ρίζες είναι μοναδικές.

B4. Αφού η fog είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , έχουμε:

$$(fog)(x^3+4) > (fog)(3x^2) \Leftrightarrow x^3+4 > 3x^2 \Leftrightarrow x^3+4-3x^2 > 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-2)^2 > 0 \Leftrightarrow x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε διαδοχικά:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^3 = x_2^3 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η συνάρτηση f είναι «1-1» και επομένως είναι αντιστρέψιμη.

Για την εύρεση της αντίστροφης έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = x^3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt[3]{y}, & \text{αν } y \geq 0 \\ x = -\sqrt[3]{-y}, & \text{αν } y < 0 \end{cases}$$

Άρα:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x}, & \text{αν } x \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-x}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι σχετικά απλή (βλέπε εισαγωγή σχολικού βιβλίου) Αφού η f είναι «1-1» οποιαδήποτε παράλληλη ευθεία προς τον άξονα $x'x$ τέμνει την γραφική παράσταση C_f της f το πολύ σε ένα σημείο (ή ότι δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ίδια τετεγμένη)

Γ2. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πολυωνυμική) με $f'(x) = 3x^2 > 0$, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ και $x \in (0, +\infty)$ και αφού η f είναι συνεχής στο 0 είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$, επομένως είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \eta\mu x - x + \frac{1}{6}x^3$, $x \geq 0$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$) με:

$$g'(x) = \sigma\nu x - 1 + \frac{1}{2}x^2, \quad x \geq 0$$

Η συνάρτηση $g'(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$) με:

$g''(x) = -\eta\mu x + x > 0$ για κάθε $x > 0$ (αφού $\eta\mu x < x \Leftrightarrow -\eta\mu x + x > 0$ για κάθε $x > 0$, η ισότητα $\eta\mu x = x$ ισχύει μόνο για $x = 0$). Άρα η συνάρτηση $g'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα έχουμε:

$$x > 0 \Rightarrow g'(x) > g'(0) \Rightarrow g'(x) > 0, \text{ δηλαδή η } g \text{ είναι γνησίως αύξουσα στο } [0, +\infty)$$

$$x > 0 \Rightarrow g(x) > g(0) \Rightarrow g(x) > 0.$$

Επομένως για κάθε $x > 0$ και επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} έχουμε:

$$g(x) > 0 \Leftrightarrow \eta\mu x > x - \frac{1}{6}x^3 \Rightarrow f(\eta\mu x) > f\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)$$

Γ3. Έστω $M(x(t_0), y(t_0))$ το σημείο της καμπύλης στο οποίο την χρονική στιγμή $t = t_0$ έχουμε

$x'(t_0) = y'(t_0)$. Για κάθε $t \geq 0$ έχουμε $y(t) = x^3(t)$. Παραγωγίζοντας τη σχέση αυτή για κάθε $t \geq 0$ έχουμε:

$$y'(t) = [x^3(t)]' \Leftrightarrow y'(t) = 3x^2(t) \cdot x'(t)$$

Για $t = t_0$ έχουμε:

$$y'(t_0) = 3x^2(t_0) \cdot x'(t_0) \Leftrightarrow x'(t_0) = 3x^2(t_0) \cdot x'(t_0) \Leftrightarrow 3x^2(t_0) = 1 \Leftrightarrow x^2(t_0) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x(t_0) = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Άρα δεκτή τιμή η $x(t_0) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, οπότε $y(t_0) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}}{9}$. Επομένως το ζητούμενο σημείο

της καμπύλης για το οποίο $x'(t_0) = y'(t_0)$ είναι $M\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{9}\right)$.

Μια φυσική ερμηνεία του προβλήματος είναι η επόμενη:

Όταν το κινητό (σημείο) κινείται πάνω στην καμπύλη $y(t) = x^3(t)$ την χρονική στιγμή κατά την οποία το κινητό διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{9}\right)$ η συνιστώσα της ταχύτητας στον άξονα

x' (x οριζόντια συνιστώσα) είναι ίση με την συνιστώσα της ταχύτητας στον άξονα y' (y κατακόρυφη συνιστώσα).

Γ4. Για το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x)dx$$

αφού η g είναι άρτια $g(x) = g(-x)$ για κάθε $x \in [-1, 1]$ θέτουμε:

$$-x = u \Leftrightarrow x = -u$$

$$dx = -du$$

$$x = -1 \Leftrightarrow u = 1$$

$$x = 1 \Leftrightarrow u = -1$$

Άρα έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x)dx = \int_{-1}^1 x^3 g(-x)dx = -\int_1^{-1} (-u)^3 g(u)du = \\ &= \int_{-1}^1 (-u)^3 g(u)du = -\int_{-1}^1 u^3 g(u)du = -I \end{aligned}$$

Επομένως:

$$I = -I \Leftrightarrow 2I = 0 \Leftrightarrow I = 0$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το κοινό πεδίο ορισμού των συναρτήσεων είναι το $\Delta = \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$

Η συνάρτηση f είναι παράγουσα της $-3\eta\mu^3 x$ στο $\Delta = \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$, άρα $f(x) = -3\eta\mu^3 x$

Επίσης:

$$g'(x) = (3\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu^3 x)' = 3\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu^2 x\eta\mu x = -3\eta\mu x(1 - \sigma\upsilon\nu^2 x) = -3\eta\mu^3 x$$

$$\text{άρα } f(x) = g'(x) \Rightarrow f(x) = g(x) + c \quad (1)$$

Για $x = -\frac{\pi}{2}$ έχουμε:

$$g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 3\sigma\upsilon\nu\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu^3\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

, οπότε η (1) για $x = -\frac{\pi}{2}$ γίνεται:

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = g\left(-\frac{\pi}{2}\right) + c \quad \text{ή } c = 0 \quad \text{άρα } f(x) = g(x) \quad \text{στο διάστημα } \Delta = \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right].$$

Δ2. Για κάθε $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow -x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$. Επίσης

$$g(-x) = 3\sigma\upsilon\nu(-x) - \sigma\upsilon\nu^3(-x) = 3\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu^3 x = g(x) \quad \text{άρα η } g \text{ είναι άρτια.}$$

Έχουμε:

$$g(-x) = g(x) \Rightarrow (g(-x))' = g'(x) \Rightarrow g'(-x) \cdot (-x)' = g'(x) \Rightarrow -g'(-x) = g'(x) \quad \text{άρα η } g' \text{ είναι περιπτή.}$$

(Ισχύει ότι: Αν μια συνάρτηση f είναι περιπτή, τότε η f' είναι άρτια. Επίσης αποδεικνύεται ότι αν μια συνάρτηση f είναι άρτια, τότε η f' είναι περιπτή.

Οι προτάσεις αυτές για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να αποδειχθούν).


Δ3. α) Έχουμε $f'(x) = -3\eta\mu^3 x > 0$ για κάθε $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα

στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$. Επίσης $f''(x) = -9\eta\mu^2 x \sigma\upsilon\nu x < 0$ για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right)$, άρα η f είναι

κοίλη. Η μονοτονία και η κυρτότητα της f φαίνεται συνοπτικά στον διπλανό πίνακα μεταβολών,

όπου παρατηρούμε ότι η f έχει ελάχιστο στο $-\frac{\pi}{2}$ το $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$, μέγιστο στο

0 το $f(0) = g(0) = 2$ και δεν έχει σημεία καμπής.


x	$-\pi/2$	0
$f'(x)$		+
$f''(x)$		-
$f(x)$		

β) Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, άρα και 1-1, άρα αντιστρέφεται.


Έχουμε: $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \Rightarrow f\left(-\frac{\pi}{2}\right) \leq f(x) \leq f(0) \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 2$

άρα το σύνολο τιμών είναι το σύνολο $[0, 2]$ το οποίο είναι και πεδίο ορισμού της f^{-1} .

Δ4 .Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο του 1ου και του 3ου τεταρτημορίου.



Δ5.



$$E = (I) + (II) + (III) + (IV) = E_{\text{AOB}} + E_{\text{AOG}} + E_{\text{TOΔ}} + E_{\text{ΔOB}}$$

Λόγω συμμετρίας τα χωρία (I) και (II) είναι ισεμβαδικά, άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = 2E_{\text{AOB}} + E_{\text{AOG}} + E_{\text{ΔOB}}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{AOB}} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (3\sin x - \sin^3 x) dx = 3 \left[\eta\mu x \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin^3 x dx = 3 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 x \sin x dx = \\ &= 3 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1 - \eta\mu^2 x) (\eta\mu x)' dx = 3 - \int_{-1}^0 (1 - u^2) du = \dots = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$u = \eta\mu x \Rightarrow du = \sigma\upsilon\nu x dx$$

*Θέτουμε $x = 0 \Rightarrow u = 0$, οπότε για,

$$x = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 1$$

$$E_{\text{AOG}} = \frac{(OA) \cdot (OG)}{2} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2 \text{ τ.μ. και } E_{\text{ΔOB}} = \frac{(OB) \cdot (OΔ)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi^2}{8} \text{ τ.μ.}$$

Άρα

$$E = 2E_{\text{AOB}} + E_{\text{AOG}} + E_{\text{ΔOB}} = 2 \cdot \frac{7}{3} + 2 + \frac{\pi^2}{8} = \frac{20}{3} + \frac{\pi^2}{8} \text{ τ.μ}$$

Δ6. α) Το σημείο

$$\begin{aligned} A \left(\frac{5\sqrt{2}}{4}, -\frac{\pi}{4} \right) \in C_{f^{-1}} &\Leftrightarrow f^{-1} \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \frac{5\sqrt{2}}{4} = f \left(-\frac{\pi}{4} \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{5\sqrt{2}}{4} = 3\sigma\upsilon\nu \left(-\frac{\pi}{4} \right) - \sigma\upsilon\nu^3 \left(-\frac{\pi}{4} \right) \Leftrightarrow \frac{5\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow \frac{5\sqrt{2}}{4} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

το οποίο ισχύει.

β) Η κλίση της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο $A \left(\frac{5\sqrt{2}}{4}, -\frac{\pi}{4} \right)$ είναι ο αριθμός $(f^{-1})' \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right)$.

Έχουμε:

$$(f \circ f^{-1})(x) = x \Rightarrow f(f^{-1}(x)) = x \Rightarrow (f(f^{-1}(x)))' = 1 \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1}(x))' = 1$$

Για $x = \frac{5\sqrt{2}}{4}$ έχουμε:

$$f' \left(f^{-1} \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) \right) \cdot \left((f^{-1})' \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) \right) = 1 \Leftrightarrow f' \left(-\frac{\pi}{4} \right) \cdot \left((f^{-1})' \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) \right) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot \left((f^{-1})' \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) \right) = 1 \Leftrightarrow (f^{-1})' \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Εστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 , όταν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

A2.

i. Αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει $x_1, x_2 \in \Delta$. Πράγματι:

♦ Αν $x_1 = x_2$, τότε προφανώς $f(x_1) = f(x_2)$.

♦ Αν $x_1 < x_2$, τότε στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής. Επομένως, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (1)$$

Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σημείο του Δ , ισχύει $f'(\xi) = 0$, οπότε, λόγω της (1), είναι $f(x_1) = f(x_2)$. Αν $x_2 < x_1$, τότε ομοίως αποδεικνύεται ότι $f(x_1) = f(x_2)$. Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις είναι $f(x_1) = f(x_2)$.

ii. Η πρόταση:

«Αν η f είναι κυρτή στο Δ , τότε $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ » είναι **Ψευδής**.


Αντιπαράδειγμα:

Η συνάρτηση $f(x) = x^4$ είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} με $f'(x) = 4x^3$. Η $f'(x) = 4x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} και άρα η f είναι κυρτή. Ωστόσο $f''(x) = 12x^2$ για την οποία δεν ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $f''(0) = 0$.

A3. α) Λάθος, **β)** Σωστό, **γ)** Σωστό, **δ)** Λάθος, **ε)** Σωστό.

ΘΕΜΑ Β

B1.



α.

♦ Η f στο διάστημα $[-1, 1]$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη σ'αυτό και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (-1, 1)$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-1, 1]$.

♦ Η f στο διάστημα $[1, 4]$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη σ'αυτό και ισχύει $f'(x) < 0$

για κάθε $x \in (1, 4)$. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, 4]$.

- ♦ Η f στο διάστημα $[4, 6]$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη σ' αυτό και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (4, 6)$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[4, 6]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[6, 8]$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη σ' αυτό και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (6, 8)$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[6, 8]$.
(Μπορούμε να πούμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[4, 8]$)
- ♦ Η f στο διάστημα $[8, 10]$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη σ' αυτό και ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (8, 10)$. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[8, 10]$.

β.


- ♦ Η f στο διάστημα $[-1, 0]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-1, 0)$. Επομένως η f είναι κυρτή (στρέφει τα κοίλα προς τα άνω) στο διάστημα $[-1, 0]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[0, 2]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 2)$. Επομένως η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω) στο διάστημα $[0, 2]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[2, 5]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(2, 5)$. Επομένως η f είναι κυρτή (στρέφει τα κοίλα προς τα άνω) στο διάστημα $[2, 5]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[5, 6]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(5, 6)$. Επομένως η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω) στο διάστημα $[5, 6]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[6, 7]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(6, 7)$. Επομένως η f είναι κυρτή (στρέφει τα κοίλα προς τα άνω) στο διάστημα $[6, 7]$.
- ♦ Η f στο διάστημα $[7, 10]$ είναι συνεχής και η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο
- ♦ διάστημα $(7, 10)$. Επομένως η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω) στο διάστημα $[7, 10]$.

γ.

- ♦ Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων είναι τα σημεία 1,4,6,8 που είναι εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού της και στα οποία η f'' μηδενίζεται, καθώς και τα σημεία -1,10 που είναι άκρα του πεδίου ορισμού της της f . Οι αριθμοί 1, 8 είναι θέσεις τοπικών μεγίστων, ενώ οι αριθμοί -1, 4, 10 είναι θέσεις τοπικών ελαχίστων. Ο αριθμός 6 δεν είναι θέση τοπικού ακροτάτου αφού η η f'' δεν αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του 6.

Τέλος τα σημεία 0, 2, 5, 6, 7 είναι θέσεις σημείων καμπής, αφού σε αυτά η f είναι συνεχής και αλλάζει η μονοτονία της f' .

B2.



α. Επειδή η συνάρτηση S είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, t_2]$ το κινητό για $t \in [0, t_2]$ κινείται κατά την αρνητική φορά.

Επειδή η S είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[t_2, +\infty)$ το κινητό για $t \geq t_2$ κινείται κατά την θετική φορά.

β. Γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα του κινητού είναι $u(t) = S'(t)$ και ότι τις χρονικές στιγμές t_1, t_3 παρουσιάζει καμπή. Από το δοθέν σχήμα έχουμε:

- ♦ Στο διάστημα $[0, t_1]$ η S στρέφει τα κοίλα κάτω και άρα η $u(t) = S'(t)$ είναι γνησίως φθίνουσα σε αυτό. Δηλαδή η ταχύτητα μειώνεται.
- ♦ Στο διάστημα $[t_1, t_3]$ η S στρέφει τα κοίλα άνω και άρα η $u(t) = S'(t)$ είναι γνησίως αύξουσα σε αυτό. Δηλαδή η ταχύτητα αυξάνεται.
- ♦ Στο διάστημα $[t_3, +\infty)$ η S στρέφει τα κοίλα κάτω και άρα η $u(t) = S'(t)$ είναι γνησίως φθίνουσα σε αυτό. Δηλαδή η ταχύτητα μειώνεται.

Ένας ενδεικτικός πίνακας μεταβολών της ταχύτητας είναι ο επόμενος:

t	0	t_1	t_3	$+\infty$
$u(t) = S'(t)$		↘	↗	↘

Άρα, ταχύτητα του κινητού αυξάνεται στο διάστημα $[t_1, t_3]$ και στα διαστήματα $[0, t_1]$ και $[t_3, +\infty)$ μειώνεται.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Για να είναι η f αντιστρέψιμη στο πεδίο ορισμού της $D_f = (-2, +\infty)$ αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι συνάρτηση «1-1». Έστω $x_1, x_2 > -2$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow e^{f(x_1)} = e^{f(x_2)} \Rightarrow f(e^{f(x_1)}) = f(e^{f(x_2)}) \Rightarrow \ln(x_1 + 4) = \ln(x_2 + 4) \Rightarrow \\ &\Rightarrow x_1 + 4 = x_2 + 4 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η συνάρτηση f είναι «1-1».

Γ2. Έχουμε:

$$(f \circ f)(e^{f(x)}) = \ln(\ln(x+4)+2) \Leftrightarrow f(f(e^{f(x)})) = \ln(\ln(x+4)+2) \Rightarrow f(\ln(x+4)) = \ln(\ln(x+4)+2) \quad (1)$$

Θέτουμε: $\ln(x+4) = y$, $y+2 > 0$ και η **(1)** γίνεται:

$$f(y) = \ln(y+2), y > -2 \quad \text{ή} \quad f(x) = \ln(x+2), x > -2$$

Η γραφική της παράσταση είναι η γνωστή λογαριθμική καμπύλη που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(-1, 0)$ (να την σχεδιάσετε).

Γ3. Το πεδίο ορισμού της $f \circ f$ είναι:

$$D_{f \circ f} = \left\{ x > -2 / f(x) > -2 \right\} = \left\{ x > -2 / \ln(x+2) > -2 \right\} = \left\{ x > -2 / x > \frac{1}{e^2} - 2 \right\} = \left(\frac{1}{e^2} - 2, +\infty \right)$$

Για κάθε $x \in \left(\frac{1}{e^2} - 2, +\infty \right)$ έχουμε:

$$(f \circ f)(x) = f(e^{-x} + 2) \Leftrightarrow f(f(x)) = f(e^{-x} + 2) \Leftrightarrow f(x) = e^{-x} + 2 \Leftrightarrow f(x) - e^{-x} - 2 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - e^{-x} - 2 = \ln(x+2) - e^{-x} - 2, x > -2$$

και εφαρμόζουμε το Θ. Bolzano στο διάστημα $[e^2 - 2, e^3 - 2] \subset \left(\frac{1}{e^2} - 2, +\infty \right)$. Είναι:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[e^2 - 2, e^3 - 2]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων στο $[e^2 - 2, e^3 - 2]$.
- ♦ $g(e^2 - 2) = \ln e^2 - e^{-(e^2-2)} - 2 = -e^{-(e^2-2)} < 0$
- ♦ $g(e^3 - 2) = \ln e^3 - e^{-(e^3-2)} - 2 = 1 - e^{-(e^3-2)} = 1 - \frac{1}{e^{(e^3-2)}} > 0$

δηλαδή: $g(e^2 - 2) \cdot g(e^3 - 2) < 0$, οπότε ισχύει το Θ. Bolzano.

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $x_0 \in (e^2 - 2, e^3 - 2)$ έτσι ώστε :

$$g(x_0) = 0 \Leftrightarrow (f \circ f)(x_0) = f(e^{-x_0} + 2)$$

Γ4. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για $x > -2$ με:

$$f'(x) = \frac{1}{x+2}, x > -2.$$

Η f' είναι επίσης παραγωγίσιμη $x > -2$ με:

$$f''(x) = -\frac{1}{(x+2)^2} < 0 \quad \text{για κάθε} \quad x > -2.$$

Επομένως η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω) ή ότι η f' είναι γνησίως φθίνουσα για $x > -2$. Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f στα διαστήματα:

$$\left[x_1, \frac{x_1 + x_2}{2} \right] \subset (-2, +\infty), \quad \left[\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2 \right] \subset (-2, +\infty)$$

αφού η f είναι παραγωγίσιμη σε αυτά (άρα και συνεχής) διότι είναι παραγωγίσιμη στο

$(-2, +\infty)$.

Άρα υπάρχουν αντίστοιχα, τουλάχιστον ένα $\xi_1 \in \left(x_1, \frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ και τουλάχιστον ένα

$\xi_2 \in \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2\right)$, τέτοια ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{\frac{x_1 + x_2}{2} - x_1} = 2 \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (I)$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2}} = 2 \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{x_2 - x_1} \quad (II)$$

Έχουμε διαδοχικά:

$$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f'(\xi_1) > f'(\xi_2) \Rightarrow 2 \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 2 \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{x_2 - x_1} \Rightarrow f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2+h) - g(2-h)}{h} = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2+h) - g(2) - [g(2-h) - g(2)]}{h} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(2+h) - g(2)}{h} - \frac{g(2-h) - g(2)}{h} \right] = 0 \quad (1)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2+h) - g(2)}{h} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x-2} = g'(2) \quad (2) \quad (2+h = x \text{ και } g \text{ παραγωγίσιμη})$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2-h) - g(2)}{h} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x-2} = g'(2) \quad (3) \quad (2-h = x \text{ και } g \text{ παραγωγίσιμη})$$

$$(1), (2), (3) \Rightarrow g'(2) - (-g'(2)) = 0 \Leftrightarrow 2g'(2) = 0 \Leftrightarrow g'(2) = 0$$

Δ2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(x^2 + x + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x + 2}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + x + 2)'}{(e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0$$

Άρα η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη.

Δ3. Έχουμε:

$$f'(x) = e^x(x^2 + x + 2) > 0 \Rightarrow f \uparrow \text{ στο } \mathbb{R} \quad \text{με:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(x^2 + x + 2) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

Άρα το σύνολο τιμών είναι $(0, +\infty)$

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η μονοτονία της f

x	$-\infty$	$+\infty$
f'	+	
f	0	$+\infty$

Δ4. Το σημείο $B(x, f(x))$ της C_h απέχει απόσταση από το $A(2, 0)$:

$$(AB) = d(x) = \sqrt{(x-2)^2 + (f(x)-0)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (\sqrt{f(x)})^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$d'(x) = \frac{2(x-2) + f'(x)}{2\sqrt{(x-2)^2 + f(x)}} = \frac{2(x-2) + e^x(x^2 + x + 2)}{2\sqrt{(x-2)^2 + f(x)}}$$

Θα μελετήσουμε πρώτα τη συνάρτηση $t(x) = 2(x-2) + e^x(x^2 + x + 2)$ ως προς το πρόσημό της.

Η εξίσωση $t(x) = 0$ έχει προφανής λύσης την $x = 0$ και:

$$t'(x) = 2 + e^x(x^2 + 5x + 7) > 0 \quad (e^x > 0, \quad x^2 + 5x + 7 > 0)$$

Το πρόσημο της $t(x)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
t'	+		
$d' = t$	-	0	+

Το πρόσημό της $d(x)$ φαίνεται στον πίνακα:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
d'	-		+
d	↘		↗

$$\min d(0) = \sqrt{7}$$

Οπότε το σημείο B είναι $B(0, h(0))$ ή $B(0, \sqrt{f(0)})$ ή $B(0, \sqrt{3})$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_h στο σημείο B είναι:

$$\lambda_\varepsilon = h'(0) = \frac{f'(0)}{2\sqrt{f(0)}} = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ και ο συντελεστής διεύθυνσης της } AB \text{ είναι}$$

$$\lambda_{AB} = \frac{0 - \sqrt{3}}{2 - 0} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ και άρα: } \lambda_{AB} \cdot \lambda_\varepsilon = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = -1$$

Επομένως: $(\varepsilon) \perp AB$

Δ5. Από τη σχέση: $g(2) + xg(x) - g(x+2) - (f(x) - 3)^2 \leq 0$ αν θέσουμε

$H(x) = g(2) + xg(x) - g(x+2) - (f(x) - 3)^2$ έχουμε $H(x) \leq H(0)$, δηλαδή η συνάρτηση $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ έχει μέγιστο στο 0. Το 0 είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού της $H(x)$ και παραγωγίσιμη στο 0 άρα ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Fermat, άρα $H'(0) = 0$.

Όμως ισχύει:

$$H'(x) = g(x) + xg'(x) - g'(x+2) - 2(f(x) - 3) \cdot f'(x), x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Για } x = 0 \Rightarrow H'(0) = 0 \Rightarrow g(0) - g'(2) - 2(f(0) - 3) \cdot f'(0) = 0 \Rightarrow g(0) = g'(2) = 0 \quad (1)$$

Έχουμε από τα παραπάνω και τη σχέση (I): $\int_{g(0)}^{g(a)} f(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_0^{g(a)} f(x) dx = 0$

♦ Αν $g(a) > 0$ και επειδή $f(x) > 0 \Rightarrow \int_0^{g(a)} f(x) dx > 0$ άτοπο.

♦ Αν $g(a) < 0$ και επειδή $f(x) > 0 \Rightarrow \int_0^{g(a)} f(x) dx < 0$ άτοπο.

Άρα $g(a) = 0$ (II).

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Rolle για τη συνάρτηση $W(x) = g(x) \cdot \sin x$ στο διάστημα

$[0, a]$.

- ♦ $W(x)$ παραγωγίσιμη στο $[0, a]$ (γινόμενο παραγωγίσιμων), οπότε και συνεχής στο $[0, a]$
- ♦ $W(0) = g(0) \cdot \sigma\upsilon\nu 0 = 0$
- ♦ $W(a) = g(a) \cdot \sigma\upsilon\nu a = 0$

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, a)$: $W(x_0) = 0$. Είναι όμως:

$$W'(x) = g'(x) \cdot \sigma\upsilon\nu x - g(x) \cdot \eta\mu x \quad .$$

Έχουμε:

$$g'(x_0) \cdot \sigma\upsilon\nu x_0 - g(x_0) \cdot \eta\mu x_0 = 0 \Leftrightarrow g'(x_0) = g(x_0) \cdot \frac{\eta\mu x_0}{\sigma\upsilon\nu x_0} \Leftrightarrow g'(x_0) = g(x_0) \cdot \varepsilon\varphi x_0$$

10^ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία-απόδειξη (Σχολικό βιβλίο)

A2. α) Θεωρία-διατύπωση (Σχολικό βιβλίο) **β)** Θεωρία-ορισμός (Σχολικό βιβλίο)

A3. α. Σωστό **β.** Λάθος **γ.** Σωστό **δ.** Σωστό **ε.** Λάθος

ΘΕΜΑ Β

B1. Έστω t_1 ο χρόνος που χρειάζεται ο κολυμβητής για να κολυμπήσει από το Κ στο Μ και t_2 ο που χρειάζεται για να περπατήσει από το Μ στο Σ. Έχουμε:

$$t_1 = \frac{(KM)}{u_1} = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{3} \quad \text{και} \quad t_2 = \frac{(M\Sigma)}{u_2} = \frac{300 - x}{5}$$

Επομένως, ο συνολικός χρόνος για να διανύσει τη διαδρομή ΚΜΣ είναι:

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{3} + \frac{300 - x}{5}$$

B2. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{3} + \frac{300 - x}{5}, \quad x \in (0, 300)$$

Είναι:

$$T'(x) = \frac{x}{3\sqrt{x^2 + 100^2}} - \frac{1}{5}$$

Οι ρίζες της $T'(x) = 0$ είναι το 75.

Το πρόσημο της $T'(x)$, η μονοτονία και τα ακρότατα της T φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

Δηλαδή η συνάρτηση T παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 75 \text{ ft}$

Άρα όταν, $x = 75 \text{ ft}$ τότε ο κολυμβητής χρειάζεται το λιγότερο δυνατό χρόνο για να φθάσει στο σπίτι του.

ΘΕΜΑ Γ

G1. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \ln(e^x - 1) - x$$

είναι:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / e^x - 1 > 0\} = \{x \in \mathbb{R} / e^x > 1\} = (0, +\infty)$$

G2. Η f είναι συνεχής και δεν έχει ρίζα διότι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, +\infty)$, ώστε:

$$\ln(e^{x_0} - 1) - x_0 = 0 \Leftrightarrow \ln(e^{x_0} - 1) = x_0 \Leftrightarrow \ln(e^{x_0} - 1) = \ln e^{x_0} \Leftrightarrow e^{x_0} - 1 = e^{x_0} \Leftrightarrow -1 = 0, \text{ που είναι}$$

άτοπο. Άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα $(0, +\infty)$. Δίνοντας μια τιμή στο

$$(0, +\infty) \text{ π.χ. για } x = 1: f(1) = \ln(e - 1) - 1 = \ln \frac{e-1}{e} < 0 \left(0 < \frac{e-1}{e} < 1 \right). \text{ Άρα } f(x) < 0,$$

για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

Γ3. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με: $f'(x) = \frac{e^x}{e^x - 1} - 1 = \frac{1}{e^x - 1} > 0$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, +\infty)$.

Γ4. Η f ως γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι και «1-1». Άρα η f αντιστρέφεται: Για την εύρεση της αντίστροφης έχουμε:

$$y = \ln(e^x - 1) - x \Leftrightarrow y = \ln(e^x - 1) - \ln e^x \Leftrightarrow y = \ln \frac{e^x - 1}{e^x} \Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{e^x} = e^y \Leftrightarrow e^x - 1 = e^y e^x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^x - e^y e^x = 1 \Leftrightarrow e^x(1 - e^y) = 1 \Leftrightarrow e^x = \frac{1}{1 - e^y} \Leftrightarrow x = \ln \frac{1}{1 - e^y}$$

Πρέπει: $1 - e^y > 0 \Leftrightarrow e^y < 1 \Leftrightarrow y < 0$. Άρα $f^{-1}(x) = \ln \frac{1}{1 - e^x}$, $x < 0$

Γ5. Θεωρούμε τη συνάρτηση: $\Phi(x) = f(x) - h(x)$, $x > 0$. Είναι:

$$\Phi'(x) = f'(x) - h'(x) = f'(x) + \frac{1}{x} > 0, \text{ για κάθε } x > 0$$

Άρα η $\Phi(x)$ είναι γνησίως αύξουσα και το σύνολο τομών της είναι:

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \Phi(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) \right) = (-\infty, +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) - h(x)) = -\infty - \infty = -\infty$$

διότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - h(x)) = 0 - (-\infty) = +\infty$$

Επομένως υπάρχει $x_0 > 0$ τέτοιο, ώστε:

$$\Phi(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) - h(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = h(x_0)$$

Γ6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(1)x^3 + x^2 + 2}{f(2)x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(1)x^3}{f(2)x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(1)}{f(2)} x = +\infty$ ($f(1) < 0, f(2) < 0$)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x)f'(x) dx = [xf(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf'(x) dx = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) dx = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - u\right) f(u) du = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u) du + \int_0^{\frac{\pi}{2}} uf(u) du \quad (1) \quad ^6$$

Επειδή ισχύει: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} uf(u) du = 1$ (2) έχουμε από τις σχέσεις (1) και (2):

$$1 = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} + 1 \Leftrightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

⁶ Θέτω $u = \frac{\pi}{2} - x$

Τώρα έχουμε:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u) du = 1$$

Άρα:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0) = 1 \Rightarrow 1 - f(0) = 1 \Rightarrow f(0) = 0$$

Ακόμα από τη σχέση: $f'(x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ για $x = 0 \Rightarrow f'(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Δ2. Η συνάρτηση g είναι σταθερή γιατί είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση με παράγωγο $g'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Πραγματικά, καθώς $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f'(x)$ για x το $\frac{\pi}{2} - x$ έχουμε:

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f'\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) \Rightarrow f'\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f(x) \text{ και } ,$$

$$g'(x) = 2f(x)f'(x) - 2f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)f'\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2f(x)f'(x) - 2f(x)f'(x) = 0$$

Μάλιστα η τιμή της συνάρτησης g είναι:

$$g(x) = g(0) \Leftrightarrow g(x) = f^2(0) + f^2\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow g(x) = 1 \quad (3)$$

Δ3. Εφόσον $g(x) = f^2(x) + f^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ολοκληρώνοντας προκύπτει:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx$$

Αλλά από την (3) έχουμε $g(x) = 1$, και με την αντικατάσταση $u = \frac{\pi}{2} - x$ στο 2^ο ολοκλήρωμα, παίρνουμε:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(u) du \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx \Leftrightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \frac{\pi}{4}$$

Δ4. Από τον ορισμό της συνάρτησης g και λόγω της (3) έχουμε ότι: $f^2(x) + f^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$

Από όπου προκύπτει ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $|f(x)| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq f(x) \leq 1$ (4)

Όμως στο Δ1 είδαμε ότι $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ (σχέση 1), που σε συνδυασμό με την προηγούμενη σχέση μας

δίνει $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό μέγιστο

στο $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

Δ5. Στο Δ1 αποδείξαμε ότι $f'(0) = 1$ και $f(0) = 0$. Σε συνδυασμό με τον ορισμό της παραγώγου έχουμε:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \Rightarrow 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

Λόγω της (4) παίρνουμε ότι $|f(e^x)| \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οπότε για $x \neq 0$ έχουμε:

$$\left| \frac{f(e^x)}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \Leftrightarrow -\frac{1}{|x|} \leq \frac{f(e^x)}{x} \leq \frac{1}{|x|}$$

Εφαρμόζοντας το κριτήριο παρεμβολής, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x)}{x}$ με

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x)}{x} = 0.$$

Οι λύσεις των διαγωνισμάτων διαγωνίσματα 11-15 θα δοθούν σε τακτικές ημερομηνίες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (που θα βρείτε στο iblogs.sch.gr/iokaragi).

2.2. Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων



ΘΕΜΑ Α

A1. Επειδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, x_0)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(\alpha, x_0]$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (\alpha, x_0] \quad (1)$$

Επειδή $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_0, \beta)$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in [x_0, \beta) \quad (2)$$



Επομένως, λόγω των (1) και (2), ισχύει:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in (\alpha, \beta),$$

που σημαίνει ότι το $f(x_0)$ είναι μέγιστο της f στο (α, β) και άρα τοπικό μέγιστο αυτής.

A2 Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν:

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και
- για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$.

Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες γράφουμε $f = g$.

A3

Διατύπωση:


Αν μια συνάρτηση f είναι:

- ♦ συνεχής στο κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ και
- ♦ παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (α, β)

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε: $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$

Γεωμετρική ερμηνεία:

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ένα $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη της ευθείας AB .



A4. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πηλίκου παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$(x^2 + 1)^2 > 0$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 0, η συνάρτηση f θα είναι:

- ♦ Γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$
- ♦ Γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$
- ♦ Έχει ακρότατο (ολικό ελάχιστο) στο 0, το $f(0) = 0$

Ο πίνακας μεταβολών (μονοτονίας-ακροτάτων) της συνάρτησης f είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	↓		↑

Ολ. ελάχιστο

B2. Η συνάρτηση f' είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πηλίκου και σύνθεσης παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f''(x) = \frac{1 - 3x^2}{(x^2 + 1)^3}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - 3x^2}{(x^2 + 1)^3} = 0 \Leftrightarrow 1 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(x^2 + 1)^3 > 0$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι:

- ♦ Κοίλη στα διαστήματα $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ και $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.
- ♦ Κυρτή στο διάστημα $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

Έχει σημεία καμπής τα $A\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{4}\right)$ και $B\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{4}\right)$.

Ο πίνακας μεταβολών (Κυρτότητας και Σημείων Καμπής) της f είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	+	-	
$f(x)$	∩	∪	∩	

B3. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο \mathbb{R} , οπότε δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη

($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \in \mathbb{R}$).

Πλάγιες-οριζόντιες: $y = \lambda x + \beta$ ($\lambda, \beta \in \mathbb{R}$) με:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$$

Επομένως η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την $y = 1$.

Ακόμα:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$$

Επομένως η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ την $y = 1$.

Παρατηρήσεις:

1. Μπορούμε να παρατηρήσουμε (και να αποδείξουμε) ότι η συνάρτηση f είναι άρτια


($f(-x) = f(x)$), για κάθε $x \in \mathbb{R}$) και άρα θα έχει την ίδια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$, αποφεύγοντας έτσι να ξαναβρούμε τα παραπάνω όρια στο $-\infty$.

2. Μπορούμε, επίσης, να βρούμε την οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$ και να δικαιολογήσουμε ότι μια συνάρτηση f δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα και πλάγια και οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$ αντίστοιχα (άρα δεν θα έχει πλάγια ασύμπτωτη).

B4. Συνοπτικά ο πίνακας μεταβολών της f είναι:

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	+	+	-	
f'	-	-	+	+	
$f(x)$	$\downarrow \cap$	$\downarrow \cup$	$\uparrow \cup$	$\uparrow \cap$	

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (αφού λάβουμε και υπόψη μας ότι είναι άρτια και θετική) είναι η επόμενη:



Σημείωση: Για την σωστή παρουσίαση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε, ότι αυτή είναι άρτια και θετική ($f(-x) = f(x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(x) \geq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο στο $x = 0$, δηλαδή να διέρχεται από το $O(0,0)$).

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η εξίσωση $e^{x^2} - x^2 - 1 = 0$ έχει προφανή ρίζα το $x_0 = 0$. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^{x^2} - x^2 - 1, x \in \mathbb{R} .$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x - 2x = 2x \cdot (e^{x^2} - 1), x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x \cdot (e^{x^2} - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow e^{x^2} > e^0 \Leftrightarrow e^{x^2} > 1 \Leftrightarrow e^{x^2} - 1 > 0, x \in \mathbb{R}$$

Ο πίνακας μεταβολών της συνάρτησης f είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	+	
$f(x)$	\downarrow	\uparrow	

Επομένως, η συνάρτηση f έχει ολικό ελάχιστο στο 0 το $f(0) = 0$ και άρα:

$f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow e^{x^2} - x^2 - 1 \geq 0$ (η ισότητα ισχύει μόνο στο $x = 0$, αφού στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ είναι γνησίως μονότονη άρα και «1-1»).

2ος Τρόπος

Από γνωστή εφαρμογή του σχολικού βιβλίου (εφαρμογή 2/ii στη σελίδα 266) γνωρίζουμε ότι:

$$\ln x \leq x - 1, \text{ για κάθε } x > 0 \text{ (η ισότητα ισχύει για } x = 1)$$

Θέτοντας όπου x το $e^{x^2} > 0$ (για κάθε $x \in \mathbb{R}$) έχουμε:

$$\ln e^{x^2} \leq e^{x^2} - 1 \Leftrightarrow x^2 \leq e^{x^2} - 1 \Leftrightarrow e^{x^2} - x^2 - 1 \geq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{(η ισότητα ισχύει για } e^{x^2} = 1 \Leftrightarrow e^{x^2} = e^0 \Leftrightarrow x = 0).$$

3ος Τρόπος

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση $g(x) = e^x - x - 1, x \in \mathbb{R}$, να μελετήσουμε την μονοτονία και τα ακρότατά της και να πάρουμε $g(x) \geq g(0) \Leftrightarrow g(x) \geq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Έπειτα να πάρουμε $g(x^2) \geq 0 \Leftrightarrow e^{x^2} - x^2 - 1 \geq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ2. Έχουμε ισοδύναμα:

$$f^2(x) = (e^{x^2} - x^2 - 1)^2 \Leftrightarrow |f(x)| = |e^{x^2} - x^2 - 1| \Leftrightarrow |f(x)| = e^{x^2} - x^2 - 1, x \in \mathbb{R}$$

(Επειδή, από το προηγούμενο ερώτημα: $f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow e^{x^2} - x^2 - 1 \geq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$).

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ και δεν έχει ρίζες σε αυτά, διότι αν υποθέσουμε ότι έχει μία ρίζα $\rho \in (-\infty, 0)$ ή $\rho \in (0, +\infty)$, τότε θα είναι από το θεώρημα του Fermat (που πληρούνται οι προϋποθέσεις του) ότι $f(\rho) = 0$. Οπότε έχουμε:

$$|f(\rho)| = 0 \Leftrightarrow e^{\rho^2} - \rho^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \rho = 0$$

άποπο.

Άρα η συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημο στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

Επομένως έχουμε τις περιπτώσεις:

$$x > 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(x) = e^{x^2} - x^2 - 1$$

$$x > 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(x) = -(e^{x^2} - x^2 - 1)$$

$$x < 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(x) = -(e^{x^2} - x^2 - 1)$$

$$x < 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(x) = e^{x^2} - x^2 - 1$$

Επειδή οι ζητούμενες συναρτήσεις πρέπει να είναι συνεχείς στο \mathbb{R} (και συνεχείς στο $x_0 = 0$ με $f(0) = 0$) θα έχουμε:

$$f(x) = e^{x^2} - x^2 - 1, x \in \mathbb{R} \quad \text{ή}$$

$$f(x) = -(e^{x^2} - x^2 - 1), x \in \mathbb{R} \quad \text{ή}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^2} - x^2 - 1, & x \geq 0 \\ -(e^{x^2} - x^2 - 1), & x < 0 \end{cases} \quad \text{ή}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^2} - x^2 - 1, & x < 0 \\ -(e^{x^2} - x^2 - 1), & x \geq 0 \end{cases}$$

Οι παραπάνω συναρτήσεις είναι οι μοναδικές οι οποίες επαληθεύουν την δοσμένη σχέση και είναι συνεχείς στο \mathbb{R} .

Γ3. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x - 2x = 2x \cdot (e^{x^2} - 1), \quad x \in \mathbb{R}$$

Η συνάρτηση f' είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f''(x) = 4x^2 e^{x^2} + 2(e^{x^2} - 1) > 0, \quad ,$$

για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ και για κάθε $x \in (0, +\infty)$, αφού $x^2 e^{x^2} \geq 0$ και $e^{x^2} - 1 > 0$

Επειδή η f' είναι συνεχής στο 0 (αφού είναι συνεχής σε όλο το \mathbb{R} ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων) η f είναι κυρτή στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$, δηλαδή σε όλο το \mathbb{R} .

Γ4. Προφανής λύση της εξίσωσης είναι η $x = 0$ (την επαληθεύει).

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x+3) - f(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα διαφοράς και σύνθεσης παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$g'(x) = f'(x+3) - f'(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

αφού $x+3 > x \Rightarrow f'(x+3) > f'(x)$ (η f' γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , διότι η f είναι κυρτή στο \mathbb{R}).

Για $x > 0$ έχουμε διαδοχικά:

$$|\eta\mu x| < x \Leftrightarrow g(|\eta\mu x|) < g(x) \Leftrightarrow f(|\eta\mu x| + 3) - f(|\eta\mu x|) < f(x+3) - f(x)$$

Επομένως μοναδική λύση της δοθείσας εξίσωσης είναι η $x = 0$

2ος Τρόπος

Προφανής λύση της εξίσωσης είναι η $x = 0$ (την επαληθεύει).

Εξετάζουμε τις επόμενες περιπτώσεις ($x > 0$):

1η περίπτωση) Αν $|\eta\mu x| + 3 > x$, τότε προκύπτει η διάταξη:

$$|\eta\mu x| < x < |\eta\mu x| + 3 < x + 3$$

- ♦ Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[x, |\eta\mu x|]$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[x, |\eta\mu x|]$ (επομένως και συνεχής στο $[x, |\eta\mu x|]$).

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi_1 \in (|\eta\mu x|, x)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(|\eta\mu x|)}{x - |\eta\mu x|} \quad (I)$$

- ♦ Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[|\eta\mu x| + 3, x + 3]$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[|\eta\mu x| + 3, x + 3]$ (επομένως και συνεχής στο $[|\eta\mu x| + 3, x + 3]$).

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi_2 \in (|\eta\mu x| + 3, x + 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x + 3) - f(|\eta\mu x| + 3)}{(x + 3) - (|\eta\mu x| + 3)} = \frac{f(x + 3) - f(|\eta\mu x| + 3)}{x - |\eta\mu x|} \quad (II)$$

Τώρα έχουμε διαδοχικά από τις σχέσεις (I) και (II) και αφού η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα:

$$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \Rightarrow \frac{f(x) - f(|\eta\mu x|)}{x - |\eta\mu x|} < \frac{f(x + 3) - f(|\eta\mu x| + 3)}{x - |\eta\mu x|}$$

Επειδή $|\eta\mu x| < x \Leftrightarrow x - |\eta\mu x| > 0$ έχουμε:

$$f(x) - f(|\eta\mu x|) < f(x + 3) - f(|\eta\mu x| + 3) \Leftrightarrow f(|\eta\mu x| + 3) - f(|\eta\mu x|) < f(x + 3) - f(x)$$

Επομένως, η δοθείσα εξίσωση **δεν** έχει άλλη ρίζα εκτός από την $x = 0$.

2η περίπτωση). Αν $|\eta\mu x| + 3 < x$, τότε προκύπτει η διάταξη:

$$|\eta\mu x| < |\eta\mu x| + 3 < x < x + 3.$$

- ♦ Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[|\eta\mu x|, |\eta\mu x| + 3]$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[|\eta\mu x|, |\eta\mu x| + 3]$ (επομένως και συνεχής στο $[|\eta\mu x|, |\eta\mu x| + 3]$).

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi_3 \in (|\eta\mu x|, |\eta\mu x| + 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_3) = \frac{f(|\eta\mu x| + 3) - f(|\eta\mu x|)}{(|\eta\mu x| + 3) - |\eta\mu x|} = \frac{f(|\eta\mu x| + 3) - f(|\eta\mu x|)}{3} \quad (III)$$

- ♦ Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[x, x + 3]$

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[x, x + 3]$ (επομένως και συνεχής στο $[x, x + 3]$).

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον $\xi_4 \in (x, x + 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_4) = \frac{f(x + 3) - f(x)}{(x + 3) - x} = \frac{f(x + 3) - f(x)}{3} \quad (IV)$$

Τώρα έχουμε διαδοχικά από τις σχέσεις (III) και (IV) και αφού η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα:

$$\begin{aligned} \xi_3 < \xi_4 &\Rightarrow f'(\xi_3) < f'(\xi_4) \Rightarrow \frac{f(|\eta\mu x|+3) - f(|\eta\mu x|)}{3} < \frac{f(x+3) - f(x)}{3} \Rightarrow \\ &\Rightarrow f(|\eta\mu x|+3) - f(|\eta\mu x|) < f(x+3) - f(x) \end{aligned}$$

Επομένως, η δοθείσα εξίσωση **δεν** έχει άλλη ρίζα εκτός από την $x = 0$.

Σημείωση: Ακόμα και αν $|\eta\mu x|+3 = x$, τα παραπάνω θεωρήματα και τα συμπεράσματα εφαρμόζονται χωρίς βλάβη της γενικότητας.

Εναλλακτικά:

Υποθέτουμε, αντίθετα, ότι υπάρχει $x_0 > 0$ που να είναι λύση της εξίσωσης. Ισχύει $|\eta\mu x_0| < x_0$

(από τη γνωστή ανισότητα $|\eta\mu x| \leq x$ με την ισότητα μόνο για $x = 0$) καθώς επίσης

$$|\eta\mu x_0| < |\eta\mu x_0| + 3 \text{ και } x_0 < x_0 + 3.$$

Αν διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- ♦ Αν $|\eta\mu x_0| + 3 \leq x_0$, τότε:

$$|\eta\mu x_0| < |\eta\mu x_0| + 3 < x_0 < x_0 + 3$$

- ♦ Αν $x_0 \leq |\eta\mu x_0| + 3$, τότε:

$$|\eta\mu x_0| < x_0 \leq |\eta\mu x_0| + 3 < x_0 + 3.$$

και εφαρμόσουμε ΘΜΤ σε κάθε ένα από τα διαστήματα $[|\eta\mu x_0|, |\eta\mu x_0| + 3]$ και $[x_0, x_0 + 3]$ και άρα υπάρχουν αντίστοιχα $\xi_1 \in (|\eta\mu x_0|, |\eta\mu x_0| + 3)$ και $\xi_2 \in (x_0, x_0 + 3)$ και καταλήγουμε σε $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ και αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα (ως κυρτή) άρα είναι και «1-1» παίρνουμε $\xi_1 = \xi_2$, πράγμα άτοπο αφού τα ξ_1, ξ_2 ανήκουν σε διαφορετικά διαστήματα. Επομένως σε κάθε περίπτωση η δοθείσα εξίσωση έχει μοναδική λύση την $x = 0$.

3ος Τρόπος

Θεωρούμε την συνάρτηση:

$$h(t) = f(t+3) - f(t), \quad t \geq 0$$

Επομένως αρκεί να λύσουμε την εξίσωση:

$$h(|\eta\mu x|) = h(x), \quad x \geq 0$$

Η συνάρτηση h είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα διαφοράς και σύνθεσης παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$) με:

$$h'(t) = f'(t+3) - f'(t), \quad t \geq 0$$

Επειδή η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα (αφού η f είναι κυρτή) έχουμε διαδοχικά:

$$t+3 > t \Rightarrow f'(t+3) > f'(t) \Rightarrow f'(t+3) - f'(t) > 0 \Rightarrow h'(t) > 0, \quad t \geq 0$$

Επομένως η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$ και άρα είναι «1-1» στο $[0, +\infty)$. Άρα η δοθείσα εξίσωση για $x \geq 0$ γράφεται ισοδύναμα:

$$h(|\eta\mu x|) = h(x) \Leftrightarrow |\eta\mu x| = x \Leftrightarrow |\eta\mu x| = |x| \Leftrightarrow x = 0,$$

Αφού στην ανισοσιότητα $|\eta\mu x| \leq |x|$ το = ισχύει **μόνο** για $x = 0$ (πρόταση σελίδας 171, σχολικό βιβλίο).

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά:

$$\int_0^\pi (f(x) + f'(x)) \cdot \eta\mu x dx = \pi \Leftrightarrow \int_0^\pi f(x)\eta\mu x dx + \int_0^\pi f'(x)\eta\mu x dx = \pi \Leftrightarrow$$

$$\int_0^\pi f(x)\eta\mu x dx + [f'(x)\eta\mu x]_0^\pi - \int_0^\pi f'(x)\sigma\upsilon\nu x dx = \pi \Leftrightarrow \int_0^\pi f(x)\eta\mu x dx - [f(x)\sigma\upsilon\nu x]_0^\pi - \int_0^\pi f(x)\eta\mu x dx = \pi$$

$$\Leftrightarrow f(\pi) + f(0) = \pi \quad (1)$$

Τώρα θέτουμε $g(x) = \frac{f(x)}{\eta\mu x} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \cdot \eta\mu x$. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.

Έχουμε διαδοχικά:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (g(x) \cdot \eta\mu x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu x = 1 \cdot 0 = 0$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 0 (αφού είναι παραγωγίσιμη στο 0) θα είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Από τη σχέση (1) έχουμε $f(\pi) = \pi$.

Ακόμα:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot \eta\mu x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[g(x) \cdot \frac{\eta\mu x}{x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1 \cdot 1 = 1$$

Επομένως, η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 1$.

Δ2. α) Έστω ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ακρότατο στο $x_0 \in \mathbb{R}$.

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} και το $x_0 = 0$ είναι εσωτερικό σημείο του \mathbb{R} , σύμφωνα με το Θεώρημα του Fermat, θα έχουμε ότι $f'(x_0) = 0$.

Παραγωγίζοντας τη δοσμένη σχέση (αφού τα μέλη της είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο \mathbb{R} , ως πράξεις και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) έχουμε:

$$e^{f(x)} \cdot f'(x) + 1 = f'(f(x)) \cdot f'(x) + e^x, x \in \mathbb{R}$$

Για $x = x_0$ από την προηγούμενη σχέση παίρνουμε:

$$e^{f(x_0)} \cdot f'(x_0) + 1 = f'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) + e^{x_0} \Leftrightarrow e^{x_0} = 1 \Leftrightarrow e^{x_0} = e^0 \Leftrightarrow x_0 = 0,$$

δηλαδή $f'(x_0) = f'(0) = 0$, άτοπο αφού $f'(0) = 1$.

Επομένως η συνάρτηση f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο \mathbb{R} .

β) Από το ερώτημα Δ2 (α) έχουμε ότι $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (δηλαδή η συνάρτηση f' δεν έχει ρίζες στο \mathbb{R} και είναι επίσης συνεχής (αφού f' παραγωγίσιμη στο \mathbb{R}). Επομένως η f' διατηρεί σταθερό πρόσημο στο \mathbb{R} και αφού $f'(0) = 1 > 0$ (Δ1 ερώτημα) θα είναι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Δ3. Αφού η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ θα είναι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty^1.$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \eta\mu x \leq 1 \\ -1 &\leq \sigma\nu x \leq 1 \end{aligned}$$

Προσθέτοντας τις προηγούμενες σχέσεις κατά μέλη και διαιρώντας με $f(x) > 0$

(αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, άρα $f(x) > 0$ «κοντά» στο $+\infty$) έχουμε:

$$-2 \leq \eta\mu x + \sigma\nu x \leq 2 \Rightarrow \frac{-2}{f(x)} \leq \frac{\eta\mu x + \sigma\nu x}{f(x)} \leq \frac{2}{f(x)}$$

Τώρα έχουμε: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{f(x)} = 0$ και, από το κριτήριο της παρεμβολής, παίρνουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x + \sigma\nu x}{f(x)} = 0$$

Δ4. Για ευκολία θέτουμε $I = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx$. Θα δείξουμε ότι $0 < I < \pi^2$. Θέτουμε (αλλαγή μεταβλητής στο ολοκλήρωμα):

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \Rightarrow du = \frac{1}{e^u} dx \Rightarrow e^u du = dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow x = e^u$$

$$x = 1 \Leftrightarrow u = 0$$

$$x = e^\pi \Leftrightarrow u = \pi$$

Οπότε :

$$I = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^\pi \frac{f(u)}{e^u} e^u du = \int_0^\pi f(u) du$$

Έχουμε, αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} :

$$0 \leq x \leq \pi \Rightarrow f(0) \leq f(x) \leq f(\pi) \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq \pi$$

Η ισότητα στην προηγούμενη σχέση δεν ισχύουν παντού και άρα έχουμε:

$$\int_0^\pi 0 dx < \int_0^\pi f(x) dx < \int_0^\pi \pi dx \Rightarrow 0 < \int_0^\pi f(x) dx < \pi^2 \Leftrightarrow 0 < I < \pi^2$$

2ος Τρόπος

Επειδή η συνάρτηση $\ln x$ και η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσες (από το ερώτημα Δ2(β))

¹ Στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός αυτός είναι το αντίστροφο γνωστής πρότασης του σχολικού βιβλίου. Για την πλήρη δικαιολόγηση μπορούμε να πούμε: Αν ήταν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$ θα είχαμε:

$$f(\mathbb{R}) = f((-\infty, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), l \right)$$

άτοπο αφού $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Επίσης αν ήταν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ θα είχαμε $f(x) < 0$ για κάποια $x > 0$ που είναι άτοπο (αφού η $f \uparrow$ και άρα $x > 0 \Rightarrow f(x) > f(0) \Rightarrow f(x) > 0$).

έχουμε διαδοχικά:

$$1 \leq x \leq e^\pi \Rightarrow \ln 1 \leq \ln x \leq \ln e^\pi \Rightarrow 0 \leq \ln x \leq \pi \Rightarrow f(0) \leq f(\ln x) \leq f(\pi)$$

Διαιρώντας με $x \in [1, e^\pi]$ (δηλαδή $x > 0$) έχουμε:

$$\frac{f(0)}{x} \leq \frac{f(\ln x)}{x} \leq \frac{f(\pi)}{x} \Leftrightarrow 0 \leq \frac{f(\ln x)}{x} \leq \frac{\pi}{x}$$

Δηλαδή έχουμε τις ανισώσεις:

♦ $\frac{f(\ln x)}{x} \geq 0, x \in [1, e^\pi]$ και η συνάρτηση $\frac{f(\ln x)}{x}$ δεν είναι παντού 0 (αφού π.χ

για $x = e^\pi$ δίνει $\frac{f(\ln e^\pi)}{\pi} = \frac{\pi}{\pi} = 1 \neq 0$). Επομένως έχουμε: $\int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx > 0$

♦ $\frac{f(\ln x)}{x} \leq \frac{\pi}{x} \Leftrightarrow \frac{f(\ln x)}{x} - \frac{\pi}{x} \leq 0, x \in [1, e^\pi]$ και η συνάρτηση $\frac{f(\ln x)}{x} - \frac{\pi}{x}$ δεν

είναι παντού 0 (αφού π.χ για $x = 1$ δίνει $\frac{f(\ln 1)}{1} - \frac{\pi}{1} = f(0) - \pi = -\pi \neq 0$).

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx - \int_1^{e^\pi} \frac{\pi}{x} dx < 0 &\Rightarrow \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \int_1^{e^\pi} \frac{\pi}{x} dx \Rightarrow \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi [\ln x]_1^{e^\pi} \Rightarrow \\ \Rightarrow \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi (\ln e^\pi - \ln 1) &\Rightarrow \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi (\pi - 0) \Rightarrow \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi^2 \end{aligned}$$

Άρα:

$$0 < \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx < \pi^2$$

3ος Τρόπος

Έστω F μία αρχική της f στο $[0, +\infty)$ (αυτό εξασφαλίζεται αφού η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$). Άρα ισχύει ότι η F είναι παραγωγίσιμη με $F'(x) = f(x), x \geq 0$.

Έτσι ισχύει ότι: $\frac{f(\ln x)}{x} = [F(\ln x)]', x \geq 0$

Έχουμε διαδοχικά: $1 = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_1^{e^\pi} [F(\ln x)]' dx = [F(\ln x)]_1^{e^\pi} =$ (*)

$$= F(\ln e^\pi) - F(\ln 1) = F(\pi) - F(0)$$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για την F στο διάστημα $[0, \pi]$, αφού F παραγωγίσιμη στο $[0, \pi]$ (άρα και συνεχής στο $[0, \pi]$), οπότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε:

$$F'(\xi) = \frac{F(\pi) - F(0)}{\pi} \Rightarrow f(\xi) = \frac{F(\pi) - F(0)}{\pi} \Rightarrow F(\pi) - F(0) = \pi f(\xi) \quad (**)$$

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (*) και (**) έχουμε:

$$0 < \xi < \pi \Rightarrow f(0) < f(\xi) < f(\pi) \Rightarrow 0 < f(\xi) < \pi \Rightarrow 0 < \pi f(\xi) < \pi^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow 0 < F(\pi) - F(0) < \pi^2 \Rightarrow 0 < 1 < \pi^2$$

4ος Τρόπος

Για το $I = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx$, θέτουμε (αλλαγή μεταβλητής):

$$u = \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$x = 1 \Leftrightarrow u = \ln 1 \Leftrightarrow u = 0$$

$$x = e^\pi \Leftrightarrow u = \ln e^\pi \Leftrightarrow u = \pi$$

και έχουμε ότι $I = \int_0^\pi f(u) du$.

Αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , έχουμε διαδοχικά:

$$0 \leq u \leq \pi \Rightarrow f(0) \leq f(u) \leq f(\pi) \Rightarrow 0 \leq f(u) \leq \pi$$

Επομένως έχουμε: $f(u) \geq 0$ και η f δεν είναι παντού 0, άρα $\int_0^\pi f(u) du > 0 \Leftrightarrow I > 0$ (1).

Ακόμα $f(u) \leq \pi \Leftrightarrow f(u) - \pi \leq 0$ και η συνάρτηση $f(u) - \pi$ δεν είναι παντού 0, άρα:

$$\int_0^\pi (f(u) - \pi) du < 0 \Leftrightarrow \int_0^\pi f(u) du - \int_0^\pi \pi du < 0 \Leftrightarrow I < \pi [x]_0^\pi \Leftrightarrow I < \pi^2 \quad (2)$$

Επομένως $0 < 1 < \pi^2$.

5ος Τρόπος

Εφαρμόζουμε κατά παράγοντες ολοκλήρωση στο $I = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx$ και έχουμε:

$$I = \int_1^{e^\pi} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_1^{e^\pi} f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = \int_1^{e^\pi} f(\ln x) (\ln x)' dx = \\ = [f(\ln x)(\ln x)]_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} (\ln x) \cdot [f(\ln x)] dx = \\ = f(\ln e^\pi)(\ln e^\pi) - 0 - \int_1^{e^\pi} (\ln x) \cdot f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = \\ = f(\pi) \cdot \pi - \int_1^{e^\pi} K(x) dx = \pi^2 - \int_1^{e^\pi} K(x) dx \quad (1)$$

, όπου $K(x) = (\ln x) \cdot f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \geq 0$, $x \in [1, e^\pi]$ διότι:

$$x \geq 1 \Rightarrow \ln x \geq \ln 1 \Rightarrow \ln x \geq 0$$

$$x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$$

Επομένως $f'(x) > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα και $f'(\ln x) > 0$.

Αφού η συνάρτηση $K(x)$ δεν είναι παντού 0, έχουμε (χρησιμοποιούμε και τη σχέση (1)):

$$\int_1^{e^\pi} K(x)dx > 0 \Leftrightarrow -\int_1^{e^\pi} K(x)dx < 0 \Leftrightarrow \pi^2 - \int_1^{e^\pi} K(x)dx < \pi^2 \Leftrightarrow I < \pi^2$$

Επομένως $0 < I < \pi^2$.

Σχόλιο: Η συνάρτηση $f'(x)$ είναι συνεχής στο \mathbb{R} (ως παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} από τα δεδομένα). Επίσης η συνάρτηση $\ln x$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ οπότε και η συνάρτηση $f'(\ln x)$ είναι συνεχής στο διάστημα $[1, e^\pi]$ που μας ενδιαφέρει.

Επομένως, η συνάρτηση:

$$K(x) = (\ln x) \cdot f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \geq 0, x \in [1, e^\pi]$$

είναι συνεχής και άρα το ολοκλήρωμα $\int_1^{e^\pi} K(x)dx$ έχει νόημα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Θεωρία, στη σελίδα 260 του σχολικού βιβλίου (Θ. Fermat).
A2. Θεωρία, στη σελίδα 169 του σχολικού βιβλίου.
A3. Θεωρία-Ορισμός, στη σελίδα 280 του σχολικού βιβλίου.
A4. α. Λάθος. β. Λάθος. γ. Σωστό. δ. Λάθος. ε. Λάθος.

ΘΕΜΑ Β

B1. Το πεδίο ορισμού D_f της συνάρτησης f είναι $D_f = (1, 5) \cup (5, 9]$.

Το σύνολο τιμών A είναι $A = f(D_f) = (-2, 5]$

B2. Έχουμε:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2$

β) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$ (Δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$)

γ) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 3 = \lim_{x \rightarrow 5} f(x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) = 4 \neq \lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 2$ (Δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$)

ε) $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = \lim_{x \rightarrow 9^+} f(x) = 3$

B3.

α) Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{f(x)} = -\infty, \text{ διότι } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0 \text{ και } f(x) < 0 \text{ για κάθε } x \in (1, 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{f(x)} = +\infty, \text{ διότι } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \text{ και } f(x) > 0 \text{ για κάθε } x \in (2, 3)$$

β) Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)} = +\infty, \text{ διότι } \lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 0 \text{ και } f(x) > 0 \text{ για κάθε } x \in (5, 7)$$

γ) Θέτουμε $f(x) = u$ και έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = u_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 8^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 8^-} f(x) = 5 = u_0 .$$

Επομένως έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 8} f(f(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = \lim_{u \rightarrow 5} f(u) = 3$$

B4. Η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στα σημεία $x_1 = 3$ και $x_2 = 7$ αφού:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 \text{ (Δεν υπάρχει το } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{) και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) = 4 \neq \lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) = 2 \text{ (Δεν υπάρχει το } \lim_{x \rightarrow 7} f(x) \text{)}$$

$$x_3 = 4$$

B5. Τα σημεία στα οποία έχουμε $f'(x) = 0$ είναι $x_4 = 6$, αφού από την παρατήρηση του δοσμένου

$$x_5 = 8$$

σχήματος σε αυτά δέχεται οριζόντια εφαπτομένη παράλληλη με τον άξονα $x'x$ οπότε (και επειδή στα σημεία αυτά είναι συνεχής) θα έχουμε:

$$f'(x_1) = f'(x_2) = f'(x_3) = 0 .$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε διαδοχικά:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^3 = x_2^3 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η συνάρτηση f είναι «1-1» και επομένως είναι αντιστρέψιμη.

Για την εύρεση της αντίστροφης έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = x^3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt[3]{y}, & \text{αν } y \geq 0 \\ x = -\sqrt[3]{-y}, & \text{αν } y < 0 \end{cases}$$

Άρα:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x}, & \text{αν } x \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-x}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Γ2. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως πολυωνυμική) με $f'(x) = 3x^2 > 0$, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ και $x \in (0, +\infty)$ και αφού η f είναι συνεχής στο 0 είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$, επομένως είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \eta\mu x - x + \frac{1}{6}x^3, \quad x \geq 0 .$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$) με:

$$g'(x) = \sigma\upsilon\nu x - 1 + \frac{1}{2}x^2, \quad x \geq 0$$

Η συνάρτηση $g'(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$) με:

$$g''(x) = -\eta\mu x + x > 0 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

(αφού $\eta\mu x < x \Leftrightarrow -\eta\mu x + x > 0$ για κάθε $x > 0$, η ισότητα $\eta\mu x = x$ ισχύει μόνο για $x = 0$).

Άρα η συνάρτηση $g'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα έχουμε:

$$x > 0 \Rightarrow g'(x) > g'(0) \Rightarrow g'(x) > 0 ,$$

δηλαδή η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Είναι:

$$x > 0 \Rightarrow g(x) > g(0) \Rightarrow g(x) > 0 .$$

Επομένως για κάθε $x > 0$ και επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} έχουμε:

$$g(x) > 0 \Leftrightarrow \eta\mu x > x - \frac{1}{6}x^3 \Rightarrow f(\eta\mu x) > f\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)$$

Γ3. Έστω $M(x(t_0), y(t_0))$ το σημείο της καμπύλης στο οποίο την χρονική στιγμή $t = t_0$ έχουμε $x'(t_0) = y'(t_0)$.

Για κάθε $t \geq 0$ έχουμε $y(t) = x^3(t)$. Παραγωγίζοντας τη σχέση αυτή για κάθε $t \geq 0$ έχουμε:

$$y'(t) = [x^3(t)]' \Leftrightarrow y'(t) = 3x^2(t) \cdot x'(t)$$

Για $t = t_0$ έχουμε:

$$y'(t_0) = 3x^2(t_0) \cdot x'(t_0) \Leftrightarrow x'(t_0) = 3x^2(t_0) \cdot x'(t_0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x^2(t_0) = 1 \Leftrightarrow x^2(t_0) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x(t_0) = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Άρα δεκτή τιμή η $x(t_0) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, οπότε $y(t_0) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}}{9}$.

Επομένως το ζητούμενο σημείο της καμπύλης για το οποίο $x'(t_0) = y'(t_0)$ είναι

$$M\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{9}\right).$$

Γ4. Για το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x)dx$$

(αφού η g είναι άρτια $g(x) = g(-x)$ για κάθε $x \in [-1, 1]$) θέτουμε:

$$-x = u \Leftrightarrow x = -u$$

$$dx = -du$$

$$x = -1 \Leftrightarrow u = 1$$

$$x = 1 \Leftrightarrow u = -1$$

Άρα έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x)dx = \int_{-1}^1 x^3 g(-x)dx = -\int_1^{-1} (-u)^3 g(u)du = \\ &= \int_{-1}^1 (-u)^3 g(u)du = -\int_{-1}^1 u^3 g(u)du = -I \end{aligned}$$

Επομένως $I = -I \Leftrightarrow 2I = 0 \Leftrightarrow I = 0$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

- ♦ Για κάθε $x \in (0,1)$ η συνάρτηση f είναι συνεχής (ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων στο $(0,1)$).
- ♦ Για κάθε $x > 1$ η συνάρτηση f είναι συνεχής (ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων στο $(0,1)$).

Θα εξετάσουμε τη συνέχεια της f στο $x_0 = 1$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{\ln x}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{x} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} = (D'L) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1$$

$$f(1) = 1$$

Άρα η f είναι συνεχής και στο $x_0 = 1$, επομένως είναι συνεχής και στο διάστημα $(0, +\infty)$.

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $(0, +\infty)$ και άρα δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες για $x_0 > 0$. Θα εξετάσουμε αν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο $x_0 = 0$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x \cdot \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln x}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} + 1 = -\infty$$

Επομένως η ευθεία $x = 0$ (δηλαδή ο άξονας $y'y'$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Δ2.

- ♦ Για $x \in (0,1)$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0,1)$) με :

Είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e \notin (0,1)$$

Άρα $f'(x) \neq 0$, $x \in (0,1)$. Είναι $f'(x) > 0$ για κάθε $0 < x < 1$

- ♦ Για $x > 1$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(1, +\infty)$) με :

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)' = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2}, x > 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = x-1-x \ln x, x > 0,$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $(0, +\infty)$) με:

$$h'(x) = 1 - (\ln x + 1) = -\ln x, x > 0$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow -\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Έχουμε:

- ♦ $x > 1 \Rightarrow h'(x) < 0$, άρα η $h(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$ (αφού είναι και συνεχής στο $[1, +\infty)$) και άρα:
 $x > 1 \Rightarrow h(x) < h(1) \Rightarrow h(x) < 0$ για κάθε $x > 1$

Επομένως $h(x) < 0, x \in (0, +\infty)$ άρα $f''(x) = \frac{h(x)}{x(x-1)^2} < 0, x > 1$.

Το μοναδικό πιθανό κρίσιμο σημείο είναι το $x_0 = 1$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(0)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{x}}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x(2x-1)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(0)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{\ln x}{x-1} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x} - 1}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x}{2x(x-1)} = -\frac{1}{2}$$

Άρα η f έχει μοναδικό κρίσιμο σημείο το $x_0 = 1$.

Δ3. α) Αφού $f'(x) > 0$ για κάθε $0 < x < 1$ η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ (αφού η f είναι συνεχής στο 1). Άρα έχουμε:

$$\diamond f((0, 1]) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right] = (-\infty, 1] \text{ επειδή } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \text{ και } f(1) = 1.$$

Αφού $0 \in (-\infty, 1]$ η f θα έχει μία ρίζα η οποία θα είναι μοναδική αφού η f είναι «1-1» ως γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$.

Αφού $f'(x) < 0$ για κάθε $x > 1$ η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$ (αφού η f είναι συνεχής στο 1). Άρα έχουμε:

$$\diamond f([1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right] = (0, 1] \text{ επειδή } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \text{ Όμως } 0 \notin (0, 1] \text{ και άρα η } f \text{ δεν έχει ρίζα στο } [1, +\infty).$$

Άρα η f έχει μοναδική ρίζα $x_0 \in (0, 1]$

β) Το Εμβαδόν του χωρίου είναι:

$$E(\Omega) = \int_{x_0}^1 |f(x)| dx, x_0 \in (0, 1].$$

Επειδή η είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ έχουμε:

$$x \geq x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow f(x) \geq 0$$

Άρα :

$$E(\Omega) = \int_{x_0}^1 f(x) dx = \int_{x_0}^1 \left(\frac{\ln x}{x} + 1 \right) dx = \int_{x_0}^1 \frac{\ln x}{x} dx + \int_{x_0}^1 1 dx = \int_{x_0}^1 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx + [x]_{x_0}^1 = I + 1 - x_0$$

$$1 = \int_{x_0}^1 \ln x \cdot (\ln x)' dx = \left[\ln^2 x \right]_{x_0}^1 - \int_{x_0}^1 \ln x \cdot (\ln x) dx = -\ln x_0 - I$$

$$2I = -\ln x_0 \Rightarrow I = \frac{-\ln x_0}{2}$$

$$E(\Omega) = \frac{-\ln x_0}{2} + 1 - x_0 \quad (1)$$

Επειδή το x_0 είναι ρίζα της f έχουμε:

$$f(x_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{\ln x_0}{x_0} + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\ln x_0 + x_0}{x_0} = 0 \Leftrightarrow \ln x_0 + x_0 = 0 \Leftrightarrow \ln x_0 = -x_0.$$

Άρα από τη σχέση (1) έχουμε:

$$E(\Omega) = -\frac{x_0^2}{2} + 1 - x_0 = \frac{-x_0^2 - 2x_0 + 2}{2} \quad \text{τ.μ.}$$

Δ4. Για κάθε $x > 1$ έχουμε $f'(x) < 0 \Rightarrow F''(x) < 0$. Η F' είναι συνεχής στο $[1, +\infty)$, αφού είναι συνεχής στο $x = 1$ λόγω της αντίστοιχης συνέχειας της f . Άρα η F' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$.

Ισχύει: $1 < x < x^2$ στο $[1, +\infty)$. Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την F στα διαδοχικά διαστήματα $[1, x]$, $[x, x^2]$ στα οποία ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις (Η F είναι παραγωγίσιμη άρα και συνεχής στο $[1, +\infty)$, οπότε και στα $[1, x]$, $[x, x^2]$).

Επομένως υπάρχουν αντίστοιχα $\xi_1 \in (1, x)$ και $\xi_2 \in (x, x^2)$ με:

$$F'(\xi_1) = \frac{F(x) - F(1)}{x - 1}, \quad F'(\xi_2) = \frac{F(x^2) - F(x)}{x^2 - x}$$

Έχουμε διαδοχικά :

$$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow F'(\xi_1) > F'(\xi_2) \Rightarrow \frac{F(x) - F(1)}{x - 1} > \frac{F(x^2) - F(x)}{x^2 - x} \Rightarrow \frac{F(x) - F(1)}{x - 1} > \frac{F(x^2) - F(x)}{x(x - 1)}$$

$$\Rightarrow F(x) - F(1) > \frac{F(x^2) - F(x)}{x} \Rightarrow xF(x) - xF(1) > F(x^2) - F(x) \Rightarrow xF(x) + F(x) > xF(1) + F(x^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x+1)F(x) > xF(1) + F(x^2)$$

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Θα δείξουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$. Πράγματι, στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

, οπότε έχουμε: $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$

Επειδή $f'(\xi) > 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε $f(x_2) - f(x_1) > 0$, οπότε $f(x_1) < f(x_2)$.

A2. (Το A2 των Ημερησίων Λυκείων 2016)

A3. (Το A3 των Ημερησίων Λυκείων 2016)

A4. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β (Το ΘΕΜΑ Γ των Ημερησίων Λυκείων 2016)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πηλίκου παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}, x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 0, η συνάρτηση f θα είναι:

- ♦ Γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.
- ♦ Γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$.
- ♦ Έχει ακρότατο (ολικό ελάχιστο) στο 0, το $f(0) = 0$.

Ο πίνακας μεταβολών (μονοτονίας-ακροτάτων) της συνάρτησης f είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$		↓	↑
	ΟΛ.	ελάχιστο	

Γ2. Η f' είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πηλίκου παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f''(x) = \frac{1-3x^2}{(x^2+1)^3}, x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1-3x^2}{(x^2+1)^3} = 0 \Leftrightarrow 1-3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1-3x^2}{(x^2+1)^3} > 0 \Leftrightarrow 1-3x^2 > 0 \Leftrightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1-3x^2}{(x^2+1)^3} < 0 \Leftrightarrow 1-3x^2 < 0 \Leftrightarrow \left(x > \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ ή } x < -\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

Ο πίνακας προσήμου της $f''(x)$ είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	+	-	

Γ3. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο \mathbb{R} , οπότε δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \in \mathbb{R} \right).$$

Πλάγιες-οριζόντιες: $y = \lambda x + \beta$ ($\lambda, \beta \in \mathbb{R}$) με:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$$

Επομένως η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την $y = 1$.

Ακόμα:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^3+x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$$

Επομένως η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ την $y = 1$.

Παρατήρηση:

Μπορούμε επίσης να βρούμε την οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$ και να δικαιολογήσουμε ότι μια συνάρτηση f δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα και πλάγια και οριζόντια στο $-\infty$ και στο $+\infty$ αντίστοιχα (άρα δεν θα έχει πλάγια ασύμπτωτη).

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f(x) \cdot f'(x) = x \Leftrightarrow 2f(x) \cdot f'(x) = 2x \Leftrightarrow [f^2(x)]' = (x^2)' \Leftrightarrow f^2(x) = x^2 + c$$

Για $x = 0 \Rightarrow f^2(0) = c \Rightarrow c = 1$. Άρα $f^2(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$. (1)

Η f είναι συνεχής στο \mathbb{R} (ως παραγωγίσιμη στο \mathbb{R}) και δεν έχει ρίζες στο \mathbb{R} , αφού αν είχε μία ρίζα $\rho \in \mathbb{R}$ θα είχαμε:

$$f^2(\rho) = \rho^2 + 1 \Leftrightarrow 0 = \rho^2 + 1 \Leftrightarrow \rho^2 = -1 \text{ που είναι άτοπο.}$$

Άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο \mathbb{R} και επειδή $f(0) = 1 > 0$ θα είναι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επομένως η (1) είναι ισοδύναμη με την $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$, $x \in \mathbb{R}$.

Δ2. Έχουμε:

$$x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - \lambda \right), \quad x > 0$$

Άρα:

$$A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - \lambda \right) = (1 - \lambda) \cdot (+\infty)$$

Διακρίνουμε τις επόμενες περιπτώσεις:

1η) $1 - \lambda > 0 \Leftrightarrow \lambda < 1$, τότε $A = +\infty$

2η) $1 - \lambda < 0 \Leftrightarrow \lambda > 1$, τότε $A = -\infty$

3η) $1 - \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$, τότε έχουμε:

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}, \quad x > 0$$

Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$$

Δ3. Η f είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.

Άρα:

$$f([0, +\infty)) = [1, +\infty)$$

$$f((-\infty, 0]) = [1, +\infty)$$

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι $f(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$.

Δ4. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $-1 \leq \sigma\upsilon\nu x \leq 1$ πρέπει για να έχει λύση η δοθείσα εξίσωση να είναι:

$$\sigma\upsilon\nu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

- A1.** (Το A1 των Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων)
A2. (Το A2 των Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων)
A3. (Το A3 των Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων)
A4. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό.

ΘΕΜΑ Β (Το ΘΕΜΑ Β των Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ ως πολυωνυμική.

Στο $x_0 = 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1, f(0) = 1$$

Επομένως $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(1)$ και άρα η f είναι συνεχής και στο $x_0 = 0$, δηλαδή είναι συνεχής στο \mathbb{R} .

Γ2. Η f είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ (ως συνεχής στο \mathbb{R}). Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 0)$ και $(0, 1)$. Θα εξετάσουμε αν είναι παραγωγίσιμη και στο $x_0 = 0$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x + 1 - 1}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2 + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

Επομένως η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και άρα η f δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού στο διάστημα $[-1, 1]$.

Γ3. Έστω $B(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής της C_f με την εφαπτομένη. Η εξίσωση της C_f στο σημείο B είναι:

- ♦ Για $x \leq 0$, έχουμε:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - (-x_0^2 + 1) = -2x_0(x - x_0)$$

$$y + x_0^2 - 1 = -2x_0x + 2x_0^2$$

Επειδή η C_f διέρχεται από το σημείο $A\left(0, \frac{5}{4}\right)$ θα είναι:

$$\frac{5}{4} + x_0^2 - 1 = 2x_0^2 \Leftrightarrow x_0 = \pm \frac{1}{2}$$

Δεκτή τιμή $x_0 = -\frac{1}{2}$. Άρα η ζητούμενη εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - f\left(-\frac{1}{2}\right) = f'\left(-\frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow y - \frac{3}{4} = x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = x + \frac{5}{4}$$

♦ $x > 0$, έχουμε:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow y - (-x_0 + 1) = -(x - x_0) \Rightarrow y + x_0 - 1 = -x + x_0 \Rightarrow y - 1 = -x \Rightarrow y = -x + 1$$

Η οποία δεν επαληθεύεται από το σημείο $A\left(0, \frac{5}{4}\right)$. Επομένως η ζητούμενη εξίσωση της

εφαπτομένης είναι $y = x + \frac{5}{4}$.

ΘΕΜΑ Δ (Το ΘΕΜΑ Γ των Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων)

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2016

ΘΕΜΑ Α

A1. Για κάθε $x \in \mathbb{R}_1$ έχουμε :

$$\begin{aligned} (\varepsilon\varphi x)' &= \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \right)' = \frac{(\eta\mu x)' \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x (\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \\ &= \frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x \cdot \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x + \eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \end{aligned}$$

A2. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει: $F'(x) = f(x)$, για κάθε $x \in \Delta$

A3. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό.

ΘΕΜΑ Β

B1. Για να διέρχεται η C_f από το σημείο $A(3, 2)$ πρέπει:

$$f(3) = 2 \Leftrightarrow \frac{3a-1}{4} = 2 \Leftrightarrow 3a = 9 \Leftrightarrow a = 3$$

B2. Για $a = 3$ η συνάρτηση γίνεται: $f(x) = \frac{3x-1}{x+1}$, $x \neq -1$.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-1\}$ με $f(x_1) = f(x_2)$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow \frac{3x_1-1}{x_1+1} = \frac{3x_2-1}{x_2+1} \Leftrightarrow 3x_1x_2 + 3x_1 - x_2 - 1 = 3x_1x_2 + 3x_2 - x_1 - 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3x_1 - x_2 = 3x_2 - x_1 \Leftrightarrow 4x_1 = 4x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η f είναι «1-1».

B3. Αφού η f είναι «1-1» υπάρχει η αντίστροφη της f^{-1} . Έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = \frac{3x-1}{x+1} \Leftrightarrow y(x+1) = 3x-1 \Leftrightarrow x(y-3) = -y-1$$

Αν $y \neq 3$, έχουμε $x = \frac{y+1}{3-y}$. Πρέπει, επιπλέον, να είναι:

$$x \neq -1 \Leftrightarrow \frac{y+1}{3-y} \neq -1 \Leftrightarrow y+1 \neq -3+y \Leftrightarrow 1 \neq -3$$

Η τελευταία σχέση είναι αληθής και επομένως έχουμε: $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3-x}$, $x \neq 3$.

B4. Έχουμε διαδοχικά:

$$f^{-1}(x) = f(x) \Leftrightarrow \frac{x+1}{3-x} = \frac{3x-1}{x+1} \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = -3x^2 + 10x - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 0 \Leftrightarrow 4(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(2, +\infty)$ ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$f'(x) = 1 - \frac{-1}{(x-2)^2} = 1 + \frac{1}{(x-2)^2} > 0, \text{ για κάθε } x \in (2, +\infty).$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, +\infty)$.

Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με:

$$f''(x) = -\frac{2}{(x-2)^3} < 0, \text{ για κάθε } x \in (2, +\infty).$$

Επομένως η f είναι κοίλη στο διάστημα $(2, +\infty)$.

Γ2. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(x + 1 - \frac{1}{x-2} \right) = +\infty$$

Επομένως η $x = 2$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f . Τώρα επειδή:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{1}{x-2} \right) = +\infty$$

η C_f δεν έχει οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες στο $+\infty$.

Γ3. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E(\lambda) = \int_{\lambda}^{\lambda+1} |f(x) - (x+1)| dx = \int_{\lambda}^{\lambda+1} \left| -\frac{1}{x-2} \right| dx = \int_{\lambda}^{\lambda+1} \frac{1}{x-2} dx =$$

$$= [\ln|x-2|]_{\lambda}^{\lambda+1} = [\ln(x-2)]_{\lambda}^{\lambda+1} = \ln(\lambda-1) - \ln(\lambda-2) = \ln \frac{\lambda-1}{\lambda-2}, \lambda > 2$$

Γ4. Έχουμε: $E(\lambda) > \ln 2 \Leftrightarrow \ln \frac{\lambda-1}{\lambda-2} > \ln 2 \Leftrightarrow \frac{\lambda-1}{\lambda-2} > 2 \Leftrightarrow \lambda < 3$

Επομένως $2 < \lambda < 3$.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η f είναι συνεχής στο $(0, 1)$ και στο $(1, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων). Θα εξετάσουμε τη συνέχεια της f στα σημεία $x_0 = 0$ και $x_1 = 1$.

Για $x_0 = 0$ έχουμε: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{x-1} = \frac{0}{-1} = 0$, αφού:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = -1$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ και επομένως η f είναι συνεχής και στο $x_0 = 0$

Για $x_1 = 1$ (σύμφωνα με τον κανόνα του D'L Hospital):

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x-1} = \frac{\ln x + 1}{1} = 1$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1$ και επομένως η f είναι συνεχής και στο $x_1 = 1$, οπότε η f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Δ2. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ και στο $(1, +\infty)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x-1) - x \ln x}{(x-1)^2} = \frac{x - \ln x - 1}{(x-1)^2} = \frac{h(x)}{(x-1)^2}$$

με $h(x) = x - \ln x - 1$, $x > 0$. Η h είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

$$h'(x) > 0, \quad x > 1$$

$$h'(x) < 0, \quad 0 < x < 1$$

Άρα η h έχει ελάχιστο στο $x_1 = 1$ και επομένως $h(x) \geq h(1) = 0$.

Άρα:

- ♦ $h(x) > 0$, $x \in (0, 1)$, δηλαδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 1)$ και επειδή η f είναι συνεχής στα σημεία $x_0 = 0$ και $x_1 = 1$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$.
- ♦ $h(x) > 0$, $x \in (1, +\infty)$, δηλαδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (1, +\infty)$ και επειδή η f είναι συνεχής στο σημείο $x_1 = 1$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Δ3. Για κάθε $x > 0$, έχουμε:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) + \ln x = \frac{\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} + \ln x = \frac{-\frac{\ln x}{x}}{\frac{1-x}{x}} + \ln x = -\frac{\ln x}{1-x} + \ln x = \frac{-\ln x + \ln x - x \ln x}{1-x} = \frac{x \ln x}{x-1} = f(x)$$

Δ4. Έχουμε διαδοχικά:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(e^x)}{e^{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \ln e^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{e^{f\left(\frac{1}{x}\right)} \cdot e^{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^x}{e^x - 1} \cdot \frac{1}{e^{f\left(\frac{1}{x}\right)}} \right] \quad (1)$$

Για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1}$ θέτουμε $u = e^x$ και έχουμε:

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow u \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u}{u - 1} = 1$$

Για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{f\left(\frac{1}{x}\right)}}$ θέτουμε $t = \frac{1}{x}$ και έχουμε (f συνεχής στο 0):

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{f\left(\frac{1}{x}\right)}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{e^{f(t)}} = \frac{1}{e^{f(0)}} = 1$$

Επομένως η (1) γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(e^x)}{e^{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{f\left(\frac{1}{x}\right)}} = 1 \cdot 1 = 1$$

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία-Απόδειξη θεωρήματος, παράγραφος 2.6.

A2. α) Ψευδής (Ψ)

β) 1^ο παράδειγμα (από το σχολικό βιβλίο²)

Η συνάρτηση $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

2^ο παράδειγμα (από το σχολικό βιβλίο)

Η συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

3^ο παράδειγμα (από το θέμα Δ)

Η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x^4}, & x \in [-1, 0) \\ e^x \eta \mu x, & x \in [0, \pi) \end{cases}$$

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{x^4} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x \eta \mu x) = 0$$

$$f(0) = 0$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Ακόμα:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^{\frac{4}{3}}}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^{\frac{1}{3}}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \eta \mu x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta \mu x}{x} = 1 \cdot 1 = 1$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$, οπότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

A3. Θεωρία-ορισμός παράγραφος 1.8 στο σχολικό βιβλίο.

A4. α) Λάθος, **β)** Σωστό, **γ)** Λάθος, **δ)** Σωστό, **ε)** Λάθος

ΘΕΜΑ Β

B1. Είναι: $D_f = (0, +\infty)$ και $D_g = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

Για να ορίζεται η $f \circ g$ πρέπει $D_{f \circ g} = \{x \in D_g / g(x) \in D_f\} \neq \emptyset$.

² Εφόσον υπάρχει στο σχολικό βιβλίο δεν απαιτείται απόδειξη της συνέχειας και της μη παραγωγισιμότητας στο $x_0 = 0$.

Έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{cases} x \in D_g \\ g(x) \in D_f \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ \frac{x}{1-x} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x(x-1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1$$

Άρα $D_{f \circ g} = (0, 1)$

Η $f \circ g$ έχει τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \ln(g(x)) = \ln \frac{x}{1-x}, \quad x \in (0, 1),$$

B2.

1^{ος} τρόπος

Η συνάρτηση: $h(x) = \ln \frac{x}{1-x}, \quad x \in (0, 1)$

Είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, 1)$ ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων f, g με:

$$h'(x) = \frac{1}{\frac{x}{1-x}} \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1-x}{x} \cdot \frac{1-x+x}{(1-x)^2} = \frac{1}{x(1-x)}$$

(Μπορούμε και $h'(x) = [\ln x - \ln(1-x)]' = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{x(1-x)}$)

Επομένως η $h(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, 1)$, άρα και συνάρτηση «1-1», οπότε αντιστρέφεται.

Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της h^{-1} αρκεί να βρούμε το σύνολο τιμών της h .

Είναι:

$$h((0, 1)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) \right)$$

Θέτουμε $u = \frac{x}{1-x}, \quad 0 < x < 1$ και έχουμε διαδοχικά:

$$\diamond \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} u = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{1-x} = 0, \quad \text{με } \frac{x}{1-x} > 0 \quad (u \rightarrow 0^+)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x}{1-x} \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

$$\diamond \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} u = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{1-x} = +\infty$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) = 0, 1-x > 0 \quad \gamma \tau \alpha \quad 0 < x < 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln \left(\frac{x}{1-x} \right) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$$

Άρα το σύνολο τιμών της h είναι $h((0, 1)) = \mathbb{R}$, οπότε $D_{h^{-1}} = \mathbb{R}$.

Για να βρούμε τον τύπο της h^{-1} έχουμε:

$$y = h(x) \Leftrightarrow y = \ln \frac{x}{1-x} \Leftrightarrow e^y = \frac{x}{1-x} \Leftrightarrow e^y - xe^y = x \Leftrightarrow e^y = xe^y + x \Leftrightarrow$$

$$e^y = x(e^y + 1) \Leftrightarrow x = \frac{e^y}{e^y + 1}, y \in \mathbb{R}$$

Άρα: $h^{-1}(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, x \in \mathbb{R}$

2ος τρόπος:

Θα αποδείξουμε άμεσα ότι η h είναι «1-1»:

Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, 1)$ με $h(x_1) = h(x_2)$ έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} h(x_1) = h(x_2) &\Leftrightarrow \ln\left(\frac{x_1}{1-x_1}\right) = \ln\left(\frac{x_2}{1-x_2}\right) \Leftrightarrow \frac{x_1}{1-x_1} = \frac{x_2}{1-x_2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1(1-x_2) = x_2(1-x_1) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η h είναι «1-1», οπότε αντιστρέφεται.

Για να βρούμε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της συνάρτησης h^{-1} έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = h(x) \\ x \in (0, 1) \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \ln\left(\frac{x}{1-x}\right) \\ x \in (0, 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^y = \frac{x}{1-x} \\ 0 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^y - xe^y = x \\ 0 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} e^y = xe^y + x \\ 0 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^y = x(e^y + 1) \\ 0 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{e^y}{e^y + 1}, y \in \mathbb{R} \text{ διότι } e^y + 1 > 0 \\ 0 < x < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Ισχύει: $0 < \frac{e^y}{e^y + 1} < 1$ για κάθε $y \in \mathbb{R}$.

Άρα η συνάρτηση h^{-1} έχει πεδίο ορισμού το \mathbb{R} και τύπο:

B3. Η συνάρτηση: $h^{-1}(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, x \in \mathbb{R}$

$$\varphi(x) = h^{-1}(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, x \in \mathbb{R}$$

Είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R} με:

$$\varphi'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}, x \in \mathbb{R}$$

Επειδή $\varphi'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η φ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} και δεν παρουσιάζει ακρότατα.

Η συνάρτηση φ' είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R} με:

$$\frac{e^x(e^x+1)^2 - 2e^x \cdot (e^x+1)e^x}{(e^x+1)^4} = \frac{(e^x+1)e^x[(e^x+1) - 2e^x]}{(e^x+1)^4} =$$

$$= \frac{e^x(1-e^x)}{(e^x+1)^3}, x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$\varphi''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x(1-e^x)}{(e^x+1)^3} = 0 \Leftrightarrow e^x(1-e^x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0$$

$$\varphi''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{e^x(1-e^x)}{(e^x+1)^3} > 0 \Leftrightarrow e^x(1-e^x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Rightarrow x > 0$$

Ο πίνακας μεταβολών της φ'' είναι:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi''(x)$		+	-
$\varphi(x)$		∪	∩

Σ.Κ.

Άρα η συνάρτηση $\varphi(x)$ είναι κυρτή στο διάστημα $(-\infty, 0]$ και κοίλη στο διάστημα $[0, +\infty)$

Η γραφική παράσταση της $\varphi(x)$ έχει σημείο καμπής το $A(0, \varphi(0))$, δηλαδή το $A\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

B4. Έχουμε:


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x+1} = \frac{0}{0+1} = 0$$

Άρα η γραφική παράσταση της φ έχει στο $-\infty$ οριζόντια ασύμπτωση την ευθεία $y = 0$ (άξονα

$x'x$). Επίσης: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$

Άρα η γραφική παράσταση της φ έχει στο $+\infty$ οριζόντια ασύμπτωση την ευθεία $y = 1$.

Η γραφική παράσταση της φ φαίνεται στο επόμενο σχήμα:



ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, \pi]$ με: $f'(x) = -\sin x$.

Η εφαπτομένη (ε) της C_f στο τυχαίο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$, $x_0 \in [0, \pi]$ έχει εξίσωση:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y + \eta\mu x_0 = -\sigma\upsilon\nu x_0(x - x_0)$$

Η (ε) διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$ αν και μόνο αν:

$$-\frac{\pi}{2} + \eta\mu x_0 = -\sigma\upsilon\nu x_0\left(\frac{\pi}{2} - x_0\right) \Leftrightarrow \left(\frac{\pi}{2} - x_0\right)\sigma\upsilon\nu x_0 + \eta\mu x_0 - \frac{\pi}{2} = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x - \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, \pi]$$

Είναι $h(0) = 0$ και $h(\pi) = 0$. Θα αποδείξουμε ότι η h δεν έχει άλλες ρίζες στο διάστημα $[0, \pi]$.

1ος τρόπος για την μοναδικότητα των δύο ριζών (με μονοτονία)

Η συνάρτηση h είναι παραγωγίσιμη στο $[0, \pi]$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[0, \pi]$) με:

$$h'(x) = -\sigma\upsilon\nu x - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)\eta\mu x, \quad x \in [0, \pi]$$

Έχουμε:

- ♦ $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{\pi}{2}\right)\eta\mu x = 0 \Leftrightarrow \left(x = 0 \text{ ή } x = \frac{\pi}{2} \text{ ή } x = \pi\right)$
- ♦ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{\pi}{2}\right)\eta\mu x > 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} < x < \pi$

Ο πίνακας μεταβολών της h' είναι ο επόμενος:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
h'		-	+
h		↘	↗

- ♦ Η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ και $0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Άρα η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα το 0.

- ♦ Η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα στο $0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ και

Άρα η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα το π .

2ος τρόπος για την μοναδικότητα των δύο ριζών (με άτοπο)

Έστω ότι υπάρχει και τρίτη ρίζα $x_0 \in (0, \pi)$ της εξίσωσης $h(x) = 0$. Έχουμε:

- ♦ Η h είναι συνεχής στα διαστήματα $[0, x_0]$ και $[x_0, \pi]$

- ♦ Η h είναι παραγωγίσιμη στα διαστήματα $(0, x_0)$ και (x_0, π)
- ♦ $h(0) = h(x_0) = h(\pi)$

Σύμφωνα με το θεώρημα του Rolle υπάρχουν $\xi_1 \in (0, x_0)$ και $\xi_2 \in (x_0, \pi)$ τέτοια, ώστε:

$$h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$$

Δηλαδή η εξίσωση:

$$h'(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \eta \mu x = 0 \quad (I)$$

έχει δύο ρίζες στο διάστημα $(0, \pi)$, που είναι άτοπο αφού η εξίσωση (I) έχει μόνο μία ρίζα στο $(0, \pi)$, την $x = \frac{\pi}{2}$.

Άρα η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει δύο ακριβώς ρίζες στο διάστημα $[0, \pi]$ που είναι το 0 και το π .


Άρα θα έχουμε δύο ακριβώς σημεία επαφής τα $M_1(0, h(0))$, $M_2(\pi, h(\pi))$

Οι δύο αντίστοιχες εφαπτομένες (ε_1) και (ε_2) στα σημεία M_1 και M_2 είναι:

$$(\varepsilon_1): y = -x$$

$$(\varepsilon_2): y = x - \pi$$

Γ2. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f καθώς και οι εφαπτομένες (ε_1) και (ε_2) :



$$E_2 = \int_0^\pi |f(x)| dx = -\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \eta \mu x dx = [-\sigma \nu \nu x]_0^\pi = 2 \tau. \mu$$

$$E_1 = (OAB) - E_2 = \frac{|\pi| \cdot \left| -\frac{\pi}{2} \right|}{2} - 2 = \frac{\pi^2}{4} - 2 \tau. \mu$$

Επομένως:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{\pi^2}{4} - 2}{2} = \frac{\pi^2}{8} - 1$$

Γ3. Θα αποδείξουμε πρώτα ότι:

$$f(x) - x + \pi = -\eta\mu x - x + \pi > 0 \quad (I) \text{ για κάθε } x \in [0, \pi)$$

1ος τρόπος (για τη σχέση (I))

Η f είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, \pi)$ με $f(x) = \eta\mu x > 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$.

Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, \pi)$ και η εφαπτομένη (ε_2) της C_f βρίσκεται «κάτω» από τη C_f με εξαίρεση το σημείο $B(\pi, 0)$.

Επομένως ισχύει: $f(x) > x - \pi \Leftrightarrow -\eta\mu x - x + \pi > 0, x \in [0, \pi)$

2ος τρόπος (για τη σχέση (I))

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = -\eta\mu x - x + \pi, x \in [0, \pi]$$

Η g είναι συνεχής στο διάστημα $[0, \pi]$ και παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, \pi)$ με $g'(x) = -\sigma\upsilon\nu x - 1 < 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$. Άρα η g είναι

γνησίως φθίνουσα στο $[0, \pi]$. Έχουμε:

$$0 \leq x < \pi \Leftrightarrow g(x) > g(\pi) \Leftrightarrow -\eta\mu x - x + \pi > 0$$

3ος τρόπος (για τη σχέση (I))

Για κάθε $x \in [0, \pi)$ ισχύει:

$$|\eta\mu(\pi - x)| < |\pi - x| \Leftrightarrow \eta\mu(\pi - x) < \pi - x \Leftrightarrow \eta\mu x < \pi - x \Leftrightarrow -\eta\mu x - x + \pi > 0$$

Άρα το ζητούμε όριο έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) + x}{f(x) - x + \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} \left[(f(x) + x) \cdot \frac{1}{f(x) - x + \pi} \right]$$

και

$$\lim_{x \rightarrow \pi} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow \pi} (-\eta\mu x + x) = \pi > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} (f(x) - x + \pi) = \lim_{x \rightarrow \pi} (-\eta\mu x - x + \pi) = 0, \text{ αφού } f(x) - x + \pi > 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{f(x) - x + \pi} = +\infty$$

Άρα :

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) + x}{f(x) - x + \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} \left[(f(x) + x) \cdot \frac{1}{f(x) - x + \pi} \right] = \pi \cdot (+\infty) = +\infty$$

4ος τρόπος του ερωτήματος Γ3

Θέτουμε $u = \pi - x$, οπότε $\lim_{x \rightarrow \pi} u = \lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) = 0$ και το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) + x}{f(x) - x + \pi} &= \lim_{x \rightarrow \pi} \left[(-\eta\mu x + x) \cdot \frac{1}{-\eta\mu x - x + \pi} \right] = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[(-\eta\mu(\pi - u) + \pi - u) \cdot \frac{1}{-\eta\mu(\pi - u) + u} \right] = \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[(-\eta\mu u + \pi - u) \cdot \frac{1}{u - \eta\mu u} \right] = \pi \cdot (+\infty) \end{aligned}$$

Γ4.

1ος τρόπος

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $(0, \pi)$ και δύο φορές παραγωγίσιμη με $f'(x) = \eta\mu x > 0$, $x \in (0, \pi)$. Άρα η f είναι κυρτή στο $[0, \pi]$, οπότε και η εφαπτομένη (ε_2) της C_f βρίσκεται «κάτω» από τη C_f με εξαίρεση το σημείο επαφής $B(\pi, 0)$.

Επομένως έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$f(x) > x - \pi \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} > 1 - \frac{\pi}{x}, \text{ για κάθε } x \in [1, e] \subseteq (0, \pi)$$

Άρα τελικά έχουμε:

$$\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > \int_1^e \left(1 - \frac{\pi}{x}\right) dx \Leftrightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > [x]_1^e - [\pi \ln |x|]_1^e \Leftrightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > e - 1 - \pi$$

2ος τρόπος

Για κάθε $x \in [1, e] \subseteq (0, \pi)$ ισχύει:

$$\eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow -\eta\mu x \geq -1 \Leftrightarrow \frac{-\eta\mu x}{x} \geq \frac{-1}{x} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} \geq -\frac{1}{x}$$

Επειδή η ισότητα δεν ισχύει παντού, είναι:

$$\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > \int_1^e \left(-\frac{1}{x}\right) dx \Leftrightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > -[\ln |x|]_1^e \Leftrightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > -1 > e - 1 - \pi$$

αφού $e - 1 - \pi < -1 \Leftrightarrow e - \pi < 0$

3ος τρόπος

$$\eta\mu e^u \leq 1 \Leftrightarrow -\eta\mu e^u \geq -1 \Leftrightarrow f(e^u) \geq -1$$

Επειδή η ισότητα δεν ισχύει παντού, είναι:

$$\int_0^1 f(e^u) du > \int_0^1 -1 du \Leftrightarrow \int_0^1 f(e^u) du > -[u]_0^1 \Leftrightarrow \int_0^1 f(e^u) du > -1$$

Θέτουμε $e^u = x \Leftrightarrow u = \ln x$ οπότε $du = \frac{1}{x} dx$ και έχουμε ισοδύναμα:

$$\int_0^1 f(e^u) du > -1 \Leftrightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > -1 > e - 1 - \pi$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $[-1, 0) \cup [0, \pi] = [-1, \pi]$.

Η f είναι συνεχής στο $[-1, 0)$ (ως σύνθεση συνεχών συναρτήσεων στο $[-1, 0)$)

Η f είναι συνεχής στο $(0, \pi]$ (ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων στο $(0, \pi]$)

Ακόμα έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{x^4} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x \eta \mu x) = 0$$

$$f(0) = 0$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ επομένως η f είναι συνεχής και στο 0 δηλαδή η f είναι συνεχής στο $[-1, \pi]$.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[-1, 0)$ με:

$$f'(x) = (\sqrt[3]{x^4})' = (|x|^{\frac{4}{3}})' = ((-x)^{\frac{4}{3}})' = \frac{4}{3}(-x)^{\frac{1}{3}}(-x)' = -\frac{4}{3}\sqrt[3]{-x}$$

Είναι $f'(x) = -\frac{4}{3}\sqrt[3]{-x} < 0$, $x \in (-1, 0)$, οπότε $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (-1, 0)$.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, \pi)$ με:

$$f'(x) = (e^x \eta \mu x)' = e^x \eta \mu x + e^x \sigma \upsilon \nu x = e^x (\eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x)$$

Για $x \in (0, \pi)$ έχουμε:

$e^x (\eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x) = 0 \Leftrightarrow \eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x = 0 \Leftrightarrow \sigma \upsilon \nu x = -\eta \mu x$ και αφού $\eta \mu x > 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$ είναι:

$$\sigma \varphi x = -1 \Leftrightarrow \sigma \varphi x = \sigma \varphi \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4}$$

Εξετάζουμε τώρα αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^{\frac{4}{3}}}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^{\frac{1}{3}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \eta \mu x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta \mu x}{x} = 1 \cdot 1 = 1$$

Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Επομένως τα κρίσιμα σημεία της f είναι τα 0 (σημείο που η f δεν είναι παραγωγίσιμη) και το

$\frac{3\pi}{4}$ (σημείο μηδενισμού της f').

Δ2. Είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{4}{3}\sqrt[3]{-x}, & x \in [-1, 0) \\ e^x (\eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x), & x \in (0, \pi] \end{cases}$$

♦ Αν $x \in [-1, 0)$ είναι $f'(x) < 0$

- ♦ Αν $x \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$ ισχύει $f(x) = e^x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) \neq 0$ και επειδή η f' είναι συνεχής στο $\left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$ η f' διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$. Είναι $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{\pi}{2}} > 0$ άρα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$.
- ♦ Αν $x \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$ ισχύει $f(x) = e^x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) \neq 0$ και επειδή η f' είναι συνεχής στο $\left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$ με $f'(\pi) = -e^\pi < 0$ άρα $f(x) < 0$ για κάθε $x \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$.

Ο πίνακας μεταβολών της f είναι ο επόμενος:

x	-1	0	$\frac{3\pi}{4}$	π
$f(x)$		-	+	-
$f'(x)$		↘	↗	↘

Μονοτονία της f

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 0)$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$

Ακρότατα της f

Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο -1 , το $f(-1) = 1$

Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο 0 , το $f(0) = 0$

Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $\frac{3\pi}{4}$, το $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}}$

Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο π , το $f(\pi) = 0$

Σύνολο τιμών της f :

1ος τρόπος: Το ολικό ελάχιστο της f είναι το $m = 0$ και το ολικό μέγιστο το $M = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}}$ διότι

ισχύει:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} > 1 \Leftrightarrow e^{\frac{3\pi}{4}} > \frac{2}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow e^{\frac{3\pi}{4}} > \sqrt{2}$$

Επιπλέον η f είναι συνεχής και άρα το σύνολο τιμών είναι $[m, M] = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \right]$

2ος τρόπος:

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_1 = [-1, 0]$, άρα:

$$f(\Delta_1) = [f(0), f(-1)] = [0, 1]$$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_2 = \left[0, \frac{3\pi}{4} \right]$, άρα:

$$f(\Delta_2) = \left[f(0), f\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right] = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \right]$$

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_3 = \left[\frac{3\pi}{4}, \pi \right]$, άρα:

$$f(\Delta_3) = \left[f(\pi), f\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right] = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \right]$$

Επομένως:

$$f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \right]$$

Δ3. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_0^{\pi} |f(x) - e^{5x}| dx = \int_0^{\pi} |e^x \eta \mu x - e^{5x}| dx \quad (1)$$

Έχουμε: $e^x \eta \mu x - e^{5x} = e^x (\eta \mu x - e^{4x}) < 0$

διότι: $x \geq 0 \Leftrightarrow e^{4x} \geq 1$ (η ισότητα ισχύει για $x = 0$) και $1 \geq \eta \mu x$ (η ισότητα ισχύει για $x = \frac{\pi}{2}$)

Άρα: $e^{4x} > \eta \mu x \Leftrightarrow \eta \mu x - e^{4x} < 0 \Leftrightarrow e^x \eta \mu x - e^{5x} < 0$

Επομένως η (1) γίνεται:

$$E = \int_0^{\pi} (e^{5x} - e^x \eta \mu x) dx = \int_0^{\pi} e^{5x} dx - \int_0^{\pi} e^x \eta \mu x dx = \frac{1}{5} [e^{5x}]_0^{\pi} - I = \frac{e^{5\pi} - 1}{5} - I,$$

όπου $I = \int_0^{\pi} e^x \eta \mu x dx$. Έχουμε:

$$I = \int_0^{\pi} (e^x)' \eta \mu x dx = [e^x \eta \mu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \sigma \nu \nu x dx = - \int_0^{\pi} (e^x)' \sigma \nu \nu x dx = - [e^x \sigma \nu \nu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \eta \mu x dx$$

Άρα $I = e^{\pi} + 1 - I \Leftrightarrow 2I = e^{\pi} + 1 \Leftrightarrow I = \frac{e^{\pi} + 1}{2}$

Επομένως: $E = \frac{e^{5\pi} - 1}{5} - \frac{e^{\pi} + 1}{2}$ τ.μ.

Δ4. 1ος τρόπος: Έχουμε:

$$16e^{-\frac{3\pi}{4}} f(x) - e^{-\frac{3\pi}{4}} (4x - 3\pi)^2 = 8\sqrt{2} \Leftrightarrow f(x) - \frac{(4x - 3\pi)^2}{16} = \frac{8\sqrt{2}}{16} e^{\frac{3\pi}{4}} \Leftrightarrow f(x) - \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{(4x - 3\pi)^2}{16} \quad (2)$$

Προφανής ρίζα της (2) είναι η $x = \frac{3\pi}{4}$. Θα αποδείξουμε ότι είναι η μοναδική.

Από το σύνολο τιμών έχουμε:

$$f(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \Leftrightarrow f(x) - \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(4x - 3\pi)^2}{16} \leq 0$$

Άρα ισχύει μόνο αν $4x - 3\pi = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4}$

2ος τρόπος

Από το ολικό μέγιστο της f έχουμε:

$$f(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}} \Leftrightarrow 16e^{-\frac{3\pi}{4}} f(x) \leq 8\sqrt{2} \quad (3) \text{ (Η ισότητα ισχύει μόνο για } x = \frac{3\pi}{4} \text{)}$$

Επίσης έχουμε: $-e^{-\frac{3\pi}{4}} (4x - 3\pi)^2 \leq 0 \quad (4) \text{ (Η ισότητα ισχύει μόνο για } x = \frac{3\pi}{4} \text{)}$

Με πρόσθεση των σχέσεων (3) και (4) κατά μέλη έχουμε:

$$16e^{-\frac{3\pi}{4}} f(x) - e^{-\frac{3\pi}{4}} (4x - 3\pi)^2 \leq 8\sqrt{2}. \text{ Η ισότητα ισχύει μόνο για } x = \frac{3\pi}{4}. \text{ Επομένως η}$$

μοναδική ρίζα της δοθείσας εξίσωσης είναι η $x = \frac{3\pi}{4}$.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Είναι το A1 του Ημερησίου Λυκείου 2017.

A2. Είναι το A2 του Ημερησίου Λυκείου 2017.

A3. Είναι το A3 του Ημερησίου Λυκείου 2017.

ΘΕΜΑ Β

B1. Η f είναι συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 0)$ (ως πολυωνυμική)

Η f είναι συνεχής στο διάστημα $(0, +\infty)$ (ως πολυωνυμική)

Πρέπει η f να είναι είναι συνεχής και στο 0.

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + x + \beta) = \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 5) = 5$$

$$f(0) = 5$$

Για να είναι η f συνεχής στο 0 πρέπει και αρκεί να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 5 \Leftrightarrow \beta = 5$$

B2. Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(-\infty, 0)$ με $f'(x) = 2x + 1, x < 0$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, +\infty)$ με $f'(x) = 1, x > 0$

Για $x_0 = 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + x + 5 - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 5 - 5}{x} = 1$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 1$

B3. Η εξίσωση (ε) της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ είναι:

$$(\varepsilon): y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 6 = x - 1 \Leftrightarrow y = x + 5$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Είναι $D_f = [1, +\infty)$, $D_g = \mathbb{R} - \{2\}$. Έχουμε: Άρα $D_{f \circ g} = \left[\frac{5}{6}, 2 \right)$

$$D_{f \circ g} = \left\{ x \in D_g / g(x) \in D_f \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ \frac{3-5x}{x-2} \geq 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ \frac{3-5x}{x-2} - 1 \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ \frac{5-6x}{x-2} \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ (5-6x)(x-2) \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ \frac{5}{6} \leq x < 2 \end{array} \right\}$$

Για τον τύπο της $f \circ g$ έχουμε για κάθε $x \in \left[\frac{5}{6}, 2 \right)$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{3-5x}{x-2}\right) = \sqrt{\frac{3-5x}{x-2} - 1} = \sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}$$

Γ2. Η συνάρτηση :

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}, \quad x \in \left[\frac{5}{6}, 2 \right)$$

είναι παραγωγίσιμη στο $\left[\frac{5}{6}, 2 \right)$ (ως σύνθεση και πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}} \cdot \left(\frac{5-6x}{x-2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}} \cdot \frac{-6(x-2) - (5-6x)}{(x-2)^2} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{5-6x}{x-2}}} \cdot \frac{7}{(x-2)^2}, \quad x \in \left[\frac{5}{6}, 2 \right)$$

Είναι $\varphi'(x) > 0$ για κάθε $x \in \left[\frac{5}{6}, 2 \right)$ και άρα η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{5}{6}, 2 \right)$. Η

φ έχει ελάχιστο στο $\frac{5}{6}$, το $\varphi\left(\frac{5}{6}\right) = 0$.

Γ3. Αφού η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{5}{6}, 2 \right)$, θα είναι και συνάρτηση «1-1», οπότε αντιστρέφεται. Για την εύρεση της φ^{-1} έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = \sqrt{\frac{5-6x}{x-2}} \Leftrightarrow y^2 = \frac{5-6x}{x-2} \Leftrightarrow y^2 x - 2y^2 = 5-6x \Leftrightarrow x(y^2+6) = 5+2y^2 \Leftrightarrow x = \frac{5+2y^2}{y^2+6}$$

Άρα $\varphi^{-1}(x) = \frac{5+2x^2}{x^2+6}$ με $D_{\varphi^{-1}} = [0, +\infty)$ αφού είναι το σύνολο τιμών της φ δηλαδή, επειδή η

φ είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{5}{6}, 2 \right)$. Είναι:

$$f\left(\left[\frac{5}{6}, 2\right)\right) = \left[f\left(\frac{5}{6}\right), \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)\right) = [0, +\infty)$$

αφού $f\left(\frac{5}{6}\right) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{\frac{5-6x}{x-2}} = +\infty$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στα διαστήματα $[-1, 0), (0, \pi]$. Θα αποδείξουμε ότι είναι συνεχής και στο 0. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \eta\mu x = 0$$

$$f(0) = 0$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, οπότε η f είναι συνεχής και στο 0.

Για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία θα βρούμε τα σημεία που μηδενίζεται η παράγωγος και τα σημεία στα οποία δεν υπάρχει η παράγωγος. Έχουμε:

- ♦ Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[-1, 0)$ με:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{-x}} (-x)' = -\frac{1}{2\sqrt{-x}}, \quad x \in [-1, 0)$$

Είναι $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [-1, 0)$

- ♦ Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, \pi]$ με:

$$f'(x) = \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in (0, \pi]$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

- ♦ Για $x = 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{-x} \cdot \sqrt{-x}}{x\sqrt{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2}}{x\sqrt{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x\sqrt{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x\sqrt{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{-x}} = +\infty$$

Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0. Επομένως τα κρίσιμα σημεία είναι τα $x = 0$ και $x = \frac{\pi}{2}$

Δ2. Η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της. Έχουμε:

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{-x}} < 0, \quad x \in [-1, 0) \quad \text{και για κάθε } x \in (0, \pi]:$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x < 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

Ο πίνακας μεταβολών της f η οποία είναι συνεχής παντού είναι ο επόμενος:

x	-1	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(x)$	-	+	-	
$f(x)$	↘	↗	↘	

Μονοτονία της f

- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 0)$
- ♦ Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

Ακρότατα:

- ♦ Η f έχει τοπικό ελάχιστο στο 0, το $f(0) = 0$
- ♦ Η f έχει τοπικό μέγιστο στο $\frac{\pi}{2}$, το $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Επίσης παίρνει τις τιμές στα άκρα $f(-1) = 1$ (μέγιστο) και $f(\pi) = 0$ (ελάχιστο)

Δ3. Έστω $x \in (0, \pi]$. Η εφαπτομένη (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(x_0, f(x_0))$ είναι:

$$(\varepsilon): y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y - \eta\mu x_0 = \sigma\upsilon\nu x_0(x - x_0)$$

Αφού η (ε) πρέπει να διέρχεται από το σημείο $M(0, 3)$ θα έχουμε:

$$3 - \eta\mu x_0 = \sigma\upsilon\nu x_0(0 - x_0) \Leftrightarrow 3 - \eta\mu x_0 = -x_0 \sigma\upsilon\nu x_0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση: $h(x) = x \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x + 3, x \in [0, \pi]$

Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $h(x_0) = 0$

Η h είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ (ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων) με:

$$h(0) = 3 > 0, h(\pi) = -\pi + 3 < 0$$

Άρα, από το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει $x_0 \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $h(x_0) = 0$.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία, Σχολικό βιβλίο σελίδα 142.

A2. α) Ψ

β) Για να είναι το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f πρέπει να ορίζεται η εφαπτομένη στο σημείο A και η f'' να αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 (να αλλάζει κοίλα). Αν πάρουμε τη συνάρτηση $f(x) = x^4$ και $x_0 = 0$ έχουμε:

- ♦ Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} με $f'(x) = 12x^2$.
- ♦ $f'(0) = 0$
- ♦ Όμως η f δεν έχει σημείο καμπής το 0 αφού $f'(x) = 12x^2 \geq 0$, για κάθε $x \geq 0$

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γραφική παράσταση της f (η οποία υπάρχει στο σχολικό βιβλίο στην παράγραφο 2.8).

A3. Το δ)

A4. α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Λάθος

ΘΕΜΑ Β

B1. Το τρίγωνο EBZ είναι ορθογώνιο και άρα από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε:

$$EZ^2 = EB^2 + BZ^2 \Leftrightarrow EZ^2 = x^2 + (2-x)^2 \Leftrightarrow EZ = \sqrt{2x^2 - 4x + 4}$$

B2. Επειδή το ΘΕΖΗ είναι τετράγωνο αν Ε το εμβαδόν του έχουμε:

$$E = EZ^2 = 2x^2 - 4x + 4 \text{ με } EB = x \geq 0, BZ = 2 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2.$$

Άρα $E = f(x) = 2x^2 - 4x + 4$, $0 \leq x \leq 2$

B3. Θα μελετήσουμε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα της. Η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ με:

$$f'(x) = 4x - 4, x \in (0, 2)$$

Ο πίνακας μονοτονίας της f είναι ο επόμενος:

x	0	1	2
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		↘	↗

Μονοτονία της f

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 1]$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, 2]$

Ακρότατα:

Η f έχει ελάχιστο στο 1, το $f(1) = 2$ και μέγιστο στα σημεία 0 και 2 με:

$$f(0) = f(2) = 4$$

B4. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει $x_0 \in [0, 2]$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 4e^{x_0} + 1$

Η f είναι συνεχής στο $\Delta_1 = [0, 1]$ και επειδή είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 θα είναι

$$f(\Delta_1) = [f(1), f(0)] = [2, 4]$$

Η f είναι συνεχής στο $\Delta_2 = [1, 2]$ και επειδή είναι γνησίως αύξουσα στο Δ_2 θα είναι:

$$f(\Delta_2) = [f(1), f(2)] = [2, 4] .$$

Άρα $f([0, 2]) = [2, 4]$. Επομένως για κάθε $x \in [2, 4]$ ισχύει $2 \leq f(x) \leq 4$. Έστω ότι υπάρχει $x_0 \in [0, 2]$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 4e^{x_0} + 1$. Έχουμε:

$$2 \leq 4e^{x_0} + 1 \leq 4 \Leftrightarrow 1 \leq 4e^{x_0} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq e^{x_0} \leq \frac{3}{4} \Leftrightarrow \ln \frac{1}{4} \leq x_0 \leq \ln \frac{3}{4}$$

Δηλαδή το $x_0 \in \left[\ln \frac{1}{4}, \ln \frac{3}{4} \right]$ (με $\ln \frac{1}{4} < 0$, $\ln \frac{3}{4} < 0$). Αυτό είναι άτοπο αφού $x_0 \in [0, 2]$. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο x_0 .

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ καθώς και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (2, 3)$, οπότε:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^3 |f'(x)| dx = -\int_0^2 f'(x) dx + \int_2^3 f'(x) dx = \\ &= -(f(2) - f(0)) + f(3) - f(2) = -2f(2) + 2 + f(3) \end{aligned}$$

Αφού $E = 8$ έχουμε:

$$E = 8 \Leftrightarrow -2f(2) + 2 + f(3) = 8 \Leftrightarrow f(3) - 2f(2) = 6 \quad (I)$$

Επειδή η f δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ.Ε.Τ. στο διάστημα $[0, 3]$ και επειδή είναι παραγωγίσιμη στο $[0, 3]$ (άρα και συνεχής στο $[0, 3]$) πρέπει να ισχύει: $f(0) = f(3) = 2$ (II)

Από τις σχέσεις (I) και (II) προκύπτει $f(2) = -2$.

Τώρα έχουμε (κανόνας του D'L):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} (xf'(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} x \cdot \lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1 \cdot (-3) = -3$$

διότι η f είναι συνεχής (δοθείσα γραφική παράσταση της f) και άρα $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = -3$.

Ακόμα έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f'(x)} = -\infty ,$$

διότι $f'(x) < 0$ «κοντά» στο 0 και $f(0) = 0$.

Γ2. Ισχύει: $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ καθώς και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (2, 3)$ και $f'(2) = 0$. Άρα η f έχει τοπικό ελάχιστο στο 2, το $f(2) = -2$. Επίσης από το δοθέν σχήμα διαπιστώνουμε ότι:

- ♦ Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, 3]$
- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 1]$
- ♦ $f'(1) = 0$ (διότι η C_f δέχεται εφαπτομένη στο σημείο $(1, f(1))$)

Ο πίνακας μονοτονίας-ακροτάτων της f είναι ο επόμενος:

x	0	2	3
$f(x)$		-	+
$f(x)$		↘	↗

Ο πίνακας για τα κοίλα της f είναι ο επόμενος:

x	0	1	3
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		∩	∪

Επομένως:

- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$
- ♦ Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 3]$
- ♦ Η f έχει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 2$, το $f(2) = -2$
- ♦ Η f έχει τοπικό μέγιστο στο $x_1 = 0$ και $x_2 = 3$, το $f(0) = f(3) = 2$
- ♦ Η f είναι κοίλη στο $[0, 1]$ και κυρτή στο $[1, 3]$
- ♦ Η f έχει σημείο καμπής στο σημείο $(1, f(1))$

Γ3. Για να μην υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$ θα πρέπει να υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (2, 3)$ τέτοιο, ώστε

$f(x_0) = 0$ και η f να αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 (διαφορετικά αν $f(x_0) \neq 0$ και

επειδή η f είναι συνεχής στο $[0, 3]$ το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$ υπάρχει). Τώρα ισχύουν:

- ♦ η f είναι συνεχής στο $[0, 3]$
- ♦ $f(2) \cdot f(3) = (-2) \cdot 2 = -4 < 0$

Από το θεώρημα Bolzano υπάρχει, τουλάχιστον ένα, $x_0 \in (2, 3)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$.


Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 3]$, άρα και συνάρτηση «1-1» το x_0 είναι μοναδικό.

Τώρα έχουμε:

- ♦ $2 < x < x_0 \Leftrightarrow f(x) < f(x_0) = 0$, οπότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$
- ♦ $x_0 < x < 3 \Leftrightarrow f(x) > f(x_0) = 0$, οπότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$

Επομένως το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$ δεν υπάρχει.

Η Γραφική παράσταση της f αφού λάβουμε υπόψη μας τους παραπάνω πίνακες είναι:



ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η f είναι συνεχής στο $(0, 2]$ (ως πολυωνυμική). Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - 3x^2 + 2) = 2 = f(0)$$

Άρα η f είναι συνεχής και στο 2, δηλαδή είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 2]$

Επίσης είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ με $f'(x) = 3x^2 - 6x, x \in (0, 2)$.

Επομένως η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[0, 2]$.

Δ2. Επειδή η f είναι συνεχής στο \mathbb{R} θα είναι συνεχής και στο $x_0 = 0$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\eta\mu x}{x} + a \right) = 2 \Rightarrow -1 + a = 2 \Rightarrow a = 3$$

Δ3. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ και στο $(0, +\infty)$ με:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x - x \sigma\upsilon\nu x}{x^2}, & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \\ 3x^2 - 6x, & x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

Θέτουμε $g(x) = \eta\mu x - x \sigma\upsilon\nu x, x \in \mathbb{R}$. Η g είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} με

$g'(x) = x\eta\mu x > 0$ για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, οπότε η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$. Άρα

έχουμε:

$$x < 0 \Leftrightarrow g(x) < g(0) = 0$$

Άρα:

$$f'(x) = \frac{\eta\mu x - x \sigma\upsilon\nu x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} < 0, \text{ για κάθε } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

Η f είναι συνεχής και στο 0 (άρα και στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$). Άρα, επειδή είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$.

Ακόμα για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow (x = 0, x = 2)$$

Ο πίνακας προσήμου της f' είναι ο επόμενος:

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	+	
$f(x)$	\searrow	\searrow	\nearrow	

Άρα, αφού η f είναι παντού συνεχής:

- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$
- ♦ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$
- ♦ Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$

Δ4. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^2 f(x) dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx + \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 2) dx = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx + \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + 2x \right]_0^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx + 0 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx \end{aligned}$$

Άρα αρκεί να αποδείξουμε ότι ισχύει:

$$\pi < \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx < \frac{3\pi}{2} - 1$$

Για κάθε $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 &\Rightarrow f\left(-\frac{\pi}{2}\right) \geq f(x) \geq f(0) \Rightarrow 3 - \frac{2}{\pi} \geq f(x) \geq 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \left(3 - \frac{2}{\pi}\right) dx &\geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 2 dx \Rightarrow \left(3 - \frac{2}{\pi}\right) \cdot \frac{\pi}{2} \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx \geq 2 \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \pi \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx \leq \frac{3\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

Δ5. Αρχικά θα αποδείξουμε ότι $-\frac{\pi}{2}x, -\frac{\pi}{2}e^{-x} \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ για κάθε $x \in [0, 1]$, προκειμένου να εκμεταλευτούμε το γεγονός ότι στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ η f είναι συνάρτηση «1-1» (ως γνησίως φθίνουσα

στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$). Έχουμε:

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2}x \leq 0$$

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -x \leq 0 \Rightarrow e^{-1} \leq e^{-x} \leq e^0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2}e^{-1} \geq -\frac{\pi}{2}e^{-x} \geq -\frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2}e^{-x} \leq -\frac{\pi}{2}e^{-1} < 0$$

Άρα η δοθείσα εξίσωση γίνεται:

$$f\left(-\frac{\pi}{2}x\right) = f\left(-\frac{\pi}{2}e^{-x}\right) \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2}x = -\frac{\pi}{2}e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x} - x = 0$$

και έτσι οι ρίζες της δοθείσας εξίσωσης στο $[0, 1]$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης $e^{-x} - x = 0$ στο $[0, 1]$. Θέτουμε: $K(x) = e^{-x} - x$, $x \in \mathbb{R}$.

♦ Η K είναι συνεχής στο $[0, 1]$

$$♦ \quad K(1) = \frac{1}{e} - 1 = \frac{1-e}{e} < 0$$

Άρα από το θεώρημα του Bolzano υπάρχει, τουλάχιστον ένα, $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $K(x_0) = 0$.

Όμως η K είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$K'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$, $x \in \mathbb{R}$, άρα η K είναι γνησίως φθίνουσα στο \mathbb{R} , δηλαδή και συνάρτηση «1-1», οπότε το x_0 είναι μοναδικό.

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2017

ΘΕΜΑ Α (Το ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΘΕΜΑ Β

B1. Η συνάρτηση $h(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$, $x \in \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} με:

$$h'(x) = \frac{e^x(1+e^x) - e^x e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} και δεν έχει ακρότατα (Η h είναι συνεχής στο \mathbb{R}).

B2. Η h είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , οπότε το σύνολο τιμών της είναι

$(\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x))$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1+e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

Επομένως $f(\mathbb{R}) = (0, 1)$.

B3. Η h δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \frac{e^{x_0}}{1+e^{x_0}} \in \mathbb{R}.$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ η h έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ την $y = 0$ (ο άξονας $x'x$). Επειδή

ακόμα $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$ η h έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την $y = 1$ (πλάγιες ασύμπτωτες δεν έχει, αφού:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^x}{x(1+e^x)} = 0).$$

B4. Έχουμε: $I = \int_0^1 e^x h(x) dx = \int_0^1 e^x \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} dx$

Θέτουμε: $e^{2x} = u \Rightarrow 2x = \ln u \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln u \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \frac{1}{u} du$ και έχουμε:

$$x = 0 \Leftrightarrow u = 1$$

$$x = 1 \Leftrightarrow u = e^2$$

$$\text{Άρα } I = \int_1^{e^2} \frac{u}{1+u} \frac{1}{2} \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \frac{1}{1+u} du = \frac{1}{2} [\ln(1+u)]_1^{e^2} = \frac{1}{2} [\ln(1+e^2) - \ln 2] = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e^2}{2}$$

ΘΕΜΑ Γ (Το ΘΕΜΑ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ)

ΘΕΜΑ Δ (Το ΘΕΜΑ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ)

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία-απόδειξη θεωρήματος, σχολικό βιβλίο σελίδα 216.

A2. α. Ψευδής

β. Η συνάρτηση που δίνεται στο σχολικό βιβλίο:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{η οποία είναι «1-1» και δεν είναι γνησίως μονότονη.}$$

Απόδειξη:

«1-1»: Το πεδίο ορισμού της f είναι το \mathbb{R} . Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{x_2} \text{ (απορρίπτεται αφού } x_1 \leq 0 \text{ και } x_2 > 0) \\ x_2 = \frac{1}{x_1} \text{ (απορρίπτεται αφού } x_2 \leq 0 \text{ και } x_1 > 0) \\ x_1 = x_2 \text{ (Δεκτή)} \end{cases}$$

Μονοτονία: Είναι $f'(x) = 1 > 0$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$ και άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Ακόμα $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ και άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$. Επομένως στο \mathbb{R} η f δεν είναι γνησίως μονότονη.

A3. Θεωρία-διατύπωση θεωρήματος, σχολικό βιβλίο σελίδα 216.

A4. α) Λάθος **β)** Λάθος **γ)** Σωστό **δ)** Σωστό **ε)** Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. Η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων.

Για $x \neq 0$ έχουμε:

$$f(x) = 1 + \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 + 8}{x^3}, x \neq 0$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 + 8}{x^3} > 0 \Leftrightarrow x^3(x^3 + 8) > 0 \Leftrightarrow x^3(x+2)(x^2 - 2x + 4) > 0$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 + 8}{x^3} < 0 \Leftrightarrow x^3(x^3 + 8) < 0 \Leftrightarrow x^3(x+2)(x^2 - 2x + 4) < 0$$

Τα πρόσημα των παραγόντων και της παραγώγου της f καθώς και η μονοτονία της φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$		↗	↘	↗

B2. Η f είναι παραγωγίσιμη για $x \neq 0$ (ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$f(x) = \left(\frac{x^3 + 8}{x^3} \right)' = \frac{3x^5 - (x^3 + 8) \cdot 3x^2}{x^6} = -\frac{24}{x^4} < 0, \quad x \neq 0$$

Επομένως η C_f είναι κοίλη σε κάθε ένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ και δεν έχει σημεία καμπής.

B3. Στα σημεία $x_0 \neq 0$ η f είναι συνεχής και άρα η C_f δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

Για $x_0 = 0$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{4}{x^2} \right) = -\infty$

Άρα η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x = 0$ (άξονας $y'y$)


Θα αναζητήσουμε τις πλάγιες-οριζόντιες ασύμπτωτες:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^3 - 4}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 4}{x^3} = 1$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^3 - 4}{x^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{4}{x^2} \right) = 0$$

Άρα η $y = \lambda x + \beta \Rightarrow y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f (η διχοτόμος του 1ου-3ου τεταρτημορίου)

B4. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα συμπεράσματα η γραφική παράσταση C_f της f είναι η επόμενη:



ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έστω x το μήκος του σύρματος που θα χρησιμοποιήσουμε για το τετράγωνο, τότε $8 - x$ το μήκος του σύρματος που θα χρησιμοποιήσουμε για τον κύκλο.

Η πλευρά του τετραγώνου είναι $a = \frac{x}{4}$ m. Το μήκος του κύκλου L είναι $L = 2\pi\rho$, όπου ρ η ακτίνα του.

Έχουμε:

$$L = 2\pi\rho = 8 - x \Leftrightarrow \rho = \frac{8-x}{2\pi} \text{ και}$$

$$E(x) = a^2 + \pi\rho^2 = \frac{x^2}{16} + \pi \frac{(8-x)^2}{4\pi} = \frac{(\pi+4)x^2 - 64x + 256}{16\pi}, \quad x \in (0, 8)$$

Γ2. Η συνάρτηση $E(x)$ (ολικό εμβαδό) είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, 8)$ (ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με:

$$E'(x) = \left(\frac{(\pi+4)x^2 - 64x + 256}{16\pi} \right)' = \frac{1}{16\pi} [(\pi+4)x^2 - 64x + 256]' = \frac{1}{16\pi} [2(\pi+4)x - 64] =$$

$$= \frac{1}{8\pi} [(\pi+4)x - 32], \quad x \in (0, 8)$$

Έχουμε:

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{8\pi} [(\pi+4)x - 32] = 0 \Leftrightarrow (\pi+4)x - 32 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{32}{\pi+4}$$

$$E'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{8\pi} [(\pi+4)x - 32] > 0 \Leftrightarrow x > \frac{32}{\pi+4}$$

$$E'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{8\pi} [(\pi+4)x - 32] < 0 \Leftrightarrow x < \frac{32}{\pi+4}$$

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η μονοτονία και τα ακρότατα της $E(x)$:

x	0	$\frac{32}{\pi+4}$	8
$E(x)$		-	+
$E'(x)$		↘	↗

Η πλευρά του τετραγώνου γίνεται ίση με τη διάμετρο του κύκλου όταν:

$$\frac{x}{4} = \frac{8-x}{2\pi} \Leftrightarrow x = \frac{32}{\pi+4}$$

Άρα για $x = \frac{32}{\pi+4}$ το $E(x)$ γίνεται ελάχιστο.

Επομένως όταν η πλευρά του τετραγώνου γίνεται ίση με τη διάμετρο του κύκλου, τότε το άθροισμα των δύο εμβαδών ελαχιστοποιείται.

Γ3. Είναι: $\lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) = \frac{16}{\pi}$

Η συνάρτηση $E(x)$ είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_1 = \left(0, \frac{32}{\pi+4}\right]$, άρα το σύνολο τιμών της είναι στο Δ_1 είναι το: $\left[E(0), E\left(\frac{32}{\pi+4}\right)\right] = \left[\frac{16}{\pi+4}, \frac{16}{\pi}\right)$.

Έχουμε:

$$5 \in \left[\frac{16}{\pi+4}, \frac{16}{\pi}\right) \Leftrightarrow \frac{16}{\pi+4} \leq 5 < \frac{16}{\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} 5\pi < 16 \\ 5(\pi+4) \geq 16 \end{cases}$$

και άρα υπάρχει $x_0 \in \Delta_1$ τέτοιο ώστε $E(x_0) = 5$. Το x_0 είναι μοναδικό, αφού η $E(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 , άρα και «1-1» στο Δ_1 .

Η συνάρτηση $E(x)$ είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\Delta_2 = \left[\frac{32}{\pi+4}, 8\right)$, άρα το σύνολο τιμών της είναι στο Δ_2 είναι το: $\left[E\left(\frac{32}{\pi+4}\right), E(8)\right) = \left[\frac{16}{\pi+4}, 4\right)$.

Έχουμε ότι $5 \notin \Delta_2$ και άρα δεν υπάρχει $x_0 \in \Delta_2$ τέτοιο, ώστε $E(x_0) = 5$

Άρα υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (0, 8)$ τέτοιο, ώστε $E(x_0) = 5$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η συνάρτηση $f(x) = 2e^{x-a} - x^2$, $a > 1$ είναι ορισμένη και παραγωγίσιμη, άρα και συνεχής, στο \mathbb{R} (ως διαφορά και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με:

$$f'(x) = 2e^{x-a} - 2x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Ακόμα η $f'(x)$ είναι παραγωγίσιμη, στο \mathbb{R} (ως διαφορά και σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο \mathbb{R}) με: $f''(x) = 2e^{x-a} - 2$, $x \in \mathbb{R}$.

Έχουμε:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^{x-a} - 2 = 0 \Leftrightarrow e^{x-a} = 1 \Leftrightarrow x - a = 0 \Leftrightarrow x = a$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2e^{x-a} - 2 > 0 \Leftrightarrow e^{x-a} > 1 \Leftrightarrow x - a > 0 \Leftrightarrow x > a$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2e^{x-a} - 2 < 0 \Leftrightarrow e^{x-a} < 1 \Leftrightarrow x - a < 0 \Leftrightarrow x < a$$

Ο πίνακας για την κυρτότητα και τα σημεία καμψής είναι ο επόμενος:

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	∩		∪

Άρα η παρουσίαζει μοναδικό σημείο καμψής το $A(a, f(a))$ η $A(a, 2 - a^2)$.

Δ2. Έχουμε:

$$f'(a) = 2e^{a-a} - 2a = 2 - 2a = 2(1 - a)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^{x-a} - 2x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2e^{x-a} - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2e^{x-a} \left(1 - \frac{x}{2e^{x-a}} \right) \right] = +\infty$$

(με χρήση του κανόνα De L'Hospital αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις). Έχουμε:

- ♦ Η $f(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, a]$, διότι η f είναι κόιλη στο $(-\infty, a]$. Αφού η $f(x)$ είναι συνεχής στο $(-\infty, a]$ (ως παραγωγίσιμη στο $(-\infty, a]$) είναι $f((-\infty, a]) = [f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)) = [2 - 2a, +\infty)$.
- ♦ Η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[a, +\infty)$, διότι η f είναι κυρτή στο $[a, +\infty)$. Αφού η $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, +\infty)$ (ως παραγωγίσιμη στο $[a, +\infty)$) είναι $f([a, +\infty)) = [f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)) = [2 - 2a, +\infty)$.

Ισχύει $0 \in [2 - 2a, +\infty)$ (αφού $0 > 2 - 2a \Leftrightarrow 2a > 2 \Leftrightarrow a > 1$ που είναι αληθής).

Άρα $0 \in f([a, +\infty))$ και $0 \in f((-\infty, a])$.

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία μοναδική ρίζα $x_1 \in (-\infty, a]$ και μία μοναδική ρίζα στο $x_2 \in [a, +\infty)$ (αφού η $f(x)$ είναι γνησίως μονότονη σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα).

Έχουμε:

- ♦ $x < x_1 \Rightarrow f(x) > f'(x_1) = 0 \Rightarrow f(x) > 0$ (άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, x_1]$)
- ♦ $x > x_1 \Rightarrow f(x) < f'(x_1) = 0 \Rightarrow f(x) < 0$ (άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_1, +\infty)$).
- ♦ $a < x < x_2 \Rightarrow f(x) < f'(x_2) = 0 \Rightarrow f(x) < 0$ (άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, x_2)$).
- ♦ $x > x_2 \Rightarrow f(x) > f'(x_2) = 0 \Rightarrow f(x) > 0$ (άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(x_2, +\infty)$).

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα συμπεράσματα για την η κυρτότητα και τα σημεία καμπής της C_f .

x	$-\infty$	x_1	a	x_2	$+\infty$
$f''(x)$		-	-	+	+
$f'(x)$		↘	↘	↗	↗
$f(x)$		∩	∩	∪	∪

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο a , άρα είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_1, x_2]$. Επομένως η f παρουσιάζει μοναδικό τοπικό μέγιστο στο $x_1 \in (-\infty, a]$ και μοναδικό τοπικό ελάχιστο στο $x_2 \in [a, +\infty]$.

Δ3. Αφού $f'(x_1) = 0 \Rightarrow 2e^{x_1-a} - 2x_1 = 0 \Rightarrow e^{x_1-a} = x_1$. Όμως:

$$x_1 \in (-\infty, a] \Rightarrow x_1 < a \Rightarrow x_1 - a < 0 \Rightarrow e^{x_1-a} < 1 \Rightarrow x_1 < 1$$

$x_1 < 1 < a < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(1) > f(a) > f(x_2)$ (αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_1, x_2]$)

Άρα η εξίσωση $f(x) = f(1)$ είναι αδύνατη στο (a, x_2) .

Δ4. Για $a = 2$ η συνάρτηση γίνεται:

$$f(x) = 2e^{x-2} - x^2 \text{ και } f'(x) = 2e^{x-2} - 2x.$$

είναι $f(2) = -2$, $f'(2) = -2$ και άρα η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(2, -2)$ είναι:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 2$$

Ισχύει: $f(x) \geq y \Leftrightarrow f(x) \geq f'(2)(x - 2) + f(2)$ (αφού η f είναι κυρτή στο $[0, 3]$)

Έχουμε:

$$f(x) \geq -2x + 2 \Rightarrow f(x) \cdot \sqrt{x-2} \geq (-2x + 2) \cdot \sqrt{x-2} \Rightarrow f(x) \cdot \sqrt{x-2} \geq -2(x-1)\sqrt{x-2}$$

Άρα:

$$\int_2^3 f(x) \cdot \sqrt{x-2} dx \geq \int_2^3 -2(x-1)\sqrt{x-2} dx = I$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα I: Θέτουμε $u = x - 2$ και έχουμε:

$$u = x - 2 \Rightarrow x = u + 2 \Rightarrow dx = du$$

$$x = 2 \Rightarrow u = 0$$

$$x = 3 \Rightarrow u = 1$$

Άρα:

$$\int_0^1 -2(u+1)\sqrt{u} du = -2 \int_0^1 u\sqrt{u} du - 2 \int_0^1 \sqrt{u} du = \dots = -\frac{32}{15}$$

Επομένως:

$$\int_2^3 f(x) \cdot \sqrt{x-2} dx \geq -\frac{32}{15}$$

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α (Το ΘΕΜΑ Α των Ημερησίων Λυκείου 2018)

ΘΕΜΑ Β

B1. Για να είναι η f συνεχής στο \mathbb{R} πρέπει να είναι συνεχής και στο $x_0 = 3$, αφού για $x > 3$ και $x < 3$ είναι συνεχής ως πολυωνυμική.

Πρέπει:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} (2ax + 6) = \lim_{x \rightarrow 3^-} [-x^2 + (3-a)x + 3a] \Leftrightarrow 6a + 6 = 0 \Leftrightarrow a = -1$$

B2. Για να είναι η f παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} πρέπει να είναι παραγωγίσιμη και στο $x_0 = 3$, αφού για $x > 3$ και $x < 3$ είναι παραγωγίσιμη ως πολυωνυμική.

Πρέπει τα όρια $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$ να υπάρχουν στο \mathbb{R} και επιπλέον να

ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-x^2 + 4x - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-(x-3)(x-1)}{x-3} = -\lim_{x \rightarrow 3^+} (x-1) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-2x + 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-2(x-3)}{x-3} = -2$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 3$ επομένως είναι παραγωγίσιμη και στο \mathbb{R} .

B3. Στο διάστημα $[3, +\infty)$ η συνάρτηση είναι $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ η οποία ως πολυωνυμική είναι παραγωγίσιμη στο $[3, +\infty)$ με παράγωγο $f'(x) = -2x + 4$, $f'(x) = -2x + 4$, $x > 3$ (από το ερώτημα B2 είναι $f(3) = -2$).

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$x > 3 > 2 \Rightarrow -2x + 4 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[3, +\infty)$.

ΘΕΜΑ Γ (Το ΘΕΜΑ Β των Ημερησίων Λυκείου 2018)

ΘΕΜΑ Δ (Το ΘΕΜΑ Γ των Ημερησίων Λυκείου 2018)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. Η απόδειξη της σελίδας 145 του Σχολικού Βιβλίου.

A2. Ο Ορισμός της σελίδας 15 του Σχολικού Βιβλίου.

A3. Της T μπορεί να είναι η f .

Της H μπορεί να είναι η g .

A4. α) Ψευδής.

β) Το παράδειγμα της παραγράφου 1.6 στο σχολικό βιβλίο με:

$$f(x) = -\frac{1}{x^2} + 1, \quad g(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = 1 \neq 0$$

A5. α) Σωστή **β)** Σωστή **γ)** Λάθος

ΘΕΜΑ Β

Για τη συνάρτηση: $f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x}, & x > 1 \\ x^2 + \alpha, & x \leq 1 \end{cases}$

B1.

- ♦ Η f είναι συνεχής στο διάστημα $(1, +\infty)$, ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων
- ♦ (πολυωνυμικών)
- ♦ Η f είναι συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 1)$, ως πολυωνυμική.

Η f Θα πρέπει να είναι συνεχής και στο σημείο $x_0 = 1$, δηλαδή πρέπει και αρκεί:

Στα παρακάτω ερωτήματα θεωρήστε ότι $\alpha = 1$.

B2. Η συνάρτηση είναι:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x}, & x > 1 \\ x^2 + 1, & x \leq 1 \end{cases}$$

- ♦ Η f είναι συνεχής στο διάστημα $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$
- ♦ Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ με παράγωγο $f'(x) = 2x$
- ♦ Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(1, 4)$, με παράγωγο $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
- ♦ Θα εξετάσουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{x+1}{x} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x}{x-1} = -1$$

Επομένως η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ και άρα η f δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος του Rolle.

B3. Αν $A_x(x_0, f(x_0))$ τα σημεία στα οποία η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης είναι

παράλληλη προς την ευθεία $y = -\frac{1}{4}x + 2018$, τότε πρέπει να ισχύει: $f'(x_0) = -\frac{1}{4}$

Είναι:

♦ Αν $x_0 < 1$, τότε $f'(x_0) = 2x_0$ και άρα:

$$f'(x_0) = 2x_0 \Leftrightarrow 2x_0 = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow x_0 = -\frac{1}{8}. \text{ Το αντίστοιχο σημείο είναι:}$$

$$A_1\left(-\frac{1}{8}, f\left(-\frac{1}{8}\right)\right) \quad \text{ή} \quad A_1\left(-\frac{1}{8}, \frac{65}{64}\right).$$

♦ Αν $x_0 > 1$ τότε $f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}$ και άρα:

$$f'(x_0) = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{x_0^2} = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow x_0 = \pm 2 \text{ και επειδή } x_0 > 1 \text{ δεκτή τιμή είναι η } x_0 = 2. \text{ Το}$$

αντίστοιχο σημείο είναι $A_2(2, f(2))$ ή $A_2\left(2, \frac{3}{2}\right)$.

♦ Αν $x_0 = 1$ η f δεν είναι παραγωγίσιμη.

Οι εξισώσεις των εφαπτομένων στα σημεία αυτά είναι:

♦ Στο A_1 :

$$y - f\left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{1}{4}\left(x + \frac{1}{8}\right) \Leftrightarrow y - \frac{65}{64} = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{32} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{63}{64}$$

♦ Στο A_2 :

$$y - f(2) = -\frac{1}{4}(x + 2) \Leftrightarrow y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x + 2$$


B4.

- ♦ Στο $-\infty$ η f δεν έχει πλάγιες και οριζόντιες ασύμπτωτες, ως πολυώνυμο 2^{ου} βαθμού.
- ♦ Δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες, αφού είναι συνεχής στο \mathbb{R} .
- ♦ Στο $+\infty$ έχουμε:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2} = 0$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = 1$$

Άρα η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.
 Η γραφική παράσταση της f δίνεται στο επόμενο σχήμα:



Γραφική παράσταση της f

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, \pi]$ με $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu x - 1, x \in [0, \pi]$. Έχουμε:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3}$$

Ο πίνακας προσήμου της f' δίνεται στον επόμενο πίνακα:

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

(Το πρόσημο της f' βρίσκεται με την σκέψη ότι επειδή η f' είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ θα διατηρεί σταθερό πρόσημο μεταξύ των ριζών. Δίνοντας μια οποιαδήποτε τιμή μεταξύ των ριζών π.χ.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1 > 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 - 1 = -1 < 0$$

Γ2. Η f είναι δύο φορές με $f''(x) = -2\eta\mu x, x \in [0, \pi]$. Άρα η f είναι κοίλη στο διάστημα $[0, \pi]$ και επομένως η γραφική της παράσταση θα βρίσκεται «πάνω» από την εφαπτομένη της στο σημείο A, εκτός του ίδιου του σημείου A. Άρα η εφαπτομένη και η γραφική παράσταση της f έχουν κοινό μόνο το σημείο A.

$$\Gamma 3. \int_0^{\pi} f(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} (2\eta\mu x - x) \sin x dx = 2 \int_0^{\pi} \eta\mu x \sin x dx - \int_0^{\pi} x \sin x dx = 2I - J,$$

$$\text{όπου } I = \int_0^{\pi} \eta\mu x \sin x dx, \quad J = \int_0^{\pi} x \sin x dx.$$

Για το I : Θέτουμε:

$$u = \eta\mu x \Rightarrow du = \sigma\upsilon\nu x$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$x = \pi \Rightarrow u = 0$$

και άρα $I = 0$. Για το J έχουμε:

$$J = \int_0^{\pi} x \sin x dx = \int_0^{\pi} x (\eta\mu x)' dx = [x\eta\mu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \eta\mu x dx = 0 + [\sigma\upsilon\nu x]_0^{\pi} = -2$$

$$\text{Άρα: } \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin x dx = 2$$

Γ4.

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\eta\mu x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \frac{\eta\mu x}{x} - 1 \right) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [(f(x) - f(2x)) \ln x] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(2x)}{x} x \ln x \right] \quad (1)$$

$$K = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(2x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} = 1 - 2 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$K = (-1) \cdot 0 = 0$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$\ln(1+x) > \frac{x}{x+1} \Leftrightarrow (x+1) \ln(1+x) > x \Leftrightarrow (x+1) \ln(1+x) - x > 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση: $h(x) = (x+1) \ln(1+x) - x > 0, x \geq 0$.

h είναι παραγωγίσιμη για $x \geq 0$ με:

$$h(x) = (x+1) \ln(1+x) - x > 0, x \geq 0$$

$$h'(x) = \ln(1+x), x \geq 0$$

$$x > 0 \Leftrightarrow x+1 > 1 \Leftrightarrow \ln(1+x) > 0 \Leftrightarrow h'(x) > 0$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα για $x \geq 0$. Επομένως:

$$x > 0 \Leftrightarrow h(x) > h(0) \Leftrightarrow (x+1) \ln(x+1) - x > 0$$

Δ2. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1». f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x > 0$ με:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1} \cdot x - \ln(x+1)}{x^2} = \frac{x - (x+1) \ln(1+x)}{(x+1)x^2} = -\frac{h(x)}{(x+1)x^2} < 0$$

$$(h(x) > 0, (x+1)x^2 > 0)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, άρα και «1-1».

Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f που, επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$ έχουμε:

$$f((0, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \right) = (0, 1), \text{ διότι:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $(0, 1)$.

Δ3. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα (αφού $f(x) > 0$):

$$f(x)+1 > 2^{f(x)} \Leftrightarrow \ln(f(x)+1) > f(x) \ln 2 \Leftrightarrow \frac{\ln(f(x)+1)}{f(x)} > \ln 2 \Leftrightarrow f(f(x)) > f(1) \Leftrightarrow f(x) < 1 \quad (f' \searrow)$$

Η τελευταία σχέση είναι αληθής άρα, ισοδύναμα, αποδείχθηκε το ζητούμενο.

Δ4. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = x(x-2)f(a) + x(x-1)f^{-1}(a) + (x-1)(x-2)\eta\mu(\alpha\pi), x \in [0, 2]$$

Η δοσμένη εξίσωση είναι ισοδύναμη:

$$\frac{f(a)}{x-1} + \frac{f^{-1}(a)}{x-2} + \frac{\eta\mu(\pi\alpha)}{x} = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (ως πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού)
- ♦ $g(0) = 2\eta\mu(\alpha\pi) > 0$ ($0 < \alpha < 1 \Leftrightarrow 0 < \alpha\pi < \pi$)
- ♦ $g(1) = -f(a) < 0$ ($a > 0 \Leftrightarrow 0 < f(a) < 1$)

Άρα η g έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$

Στο διάστημα $[1, 2]$ έχουμε:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$ (ως πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού)

- ♦ $g(1) = -f(a) < 0 \quad (a > 0 \Leftrightarrow 0 < f(a) < 1)$
- ♦ $g(2) = 2f^{-1}(a) > 0$ (αφού το σύνολο τιμών της f^{-1} είναι το $(0, +\infty)$).

Άρα η g έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. Επειδή η εξίσωση

$g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ είναι πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού θα έχει το πολύ 2 πραγματικές ρίζες.

Άρα η εξίσωση $g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ θα έχει ακριβώς 2 πραγματικές ρίζες, μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο διάστημα $(1, 2)$.

Σχόλιο: Ο βαθμός της πολυωνυμικής εξίσωσης $g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ είναι 2, διότι ο συντελεστής του x^2 είναι :

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow (f(a) + f^{-1}(a) + \eta\mu(\alpha\pi))x^2 + (2f(a) - f^{-1}(a) - 3\eta\mu(\alpha\pi))x + 2 \text{ και} \\ f(a) + f^{-1}(a) + \eta\mu(\alpha\pi) > 0.$$

Δ5. Θα εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. για την F στο διάστημα $[1, e]$.

- ♦ F συνεχής στο $[1, e]$
- ♦ F παραγωγίσιμη στο $(1, e)$

Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (1, e)$: $F'(\xi) = \frac{F(e) - F(1)}{e - 1} \Leftrightarrow f(\xi) = \frac{F(e) - F(1)}{e - 1}$. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα [αφού η F είναι αρχική της της f στο διάστημα $(0, +\infty)$ έπεται ότι $F'(x) = f(x)$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$]: Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$1 < \xi < e \Rightarrow f(1) > f(\xi) > f(e) \Leftrightarrow \ln 2 > \frac{e \ln 2 - F(1)}{e - 1} > \frac{\ln(e + 1)}{e} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (e - 1) \ln 2 > e \ln 2 - F(1) > \frac{(e - 1) \ln(e + 1)}{e} \Leftrightarrow \frac{(e - 1) \ln(e + 1)}{e} < e \ln 2 - F(1) < (e - 1) \ln 2 \\ \Leftrightarrow \frac{(e - 1) \ln(e + 1) - e^2 \ln 2}{e} < -F(1) < (e - 1) \ln 2 - e \ln 2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow e \ln 2 - (e - 1) \ln 2 < F(1) < \frac{e^2 \ln 2 - (e - 1) \ln(e + 1)}{e} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln 2 < F(1) < \frac{e^2 \ln 2 - (e - 1) \ln(e + 1)}{e} \Leftrightarrow \frac{e^2 \ln 2 - (e - 1) \ln(e + 1)}{e} < \ln \left(\frac{2^{e+1}}{e+1} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow e^2 \ln 2 - (e - 1) \ln(e + 1) < \ln 2^{e+1} - \ln(e + 1) \Leftrightarrow e^2 \ln 2 - (e - 1) \ln(e + 1) < e \ln 2^{e+1} - e \ln(e + 1)$$

Η τελευταία σχέση είναι αληθής και άρα αποδείχθηκε ότι $\ln 2 < F(1) < \ln \left(\frac{2^{e+1}}{e+1} \right)$.

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2018

ΘΕΜΑ Α (Το ΘΕΜΑ Α των επαναληπτικών εξετάσεων Ημερησίου-Εσπερινού Λυκείου 2018)

ΘΕΜΑ Β (Το ΘΕΜΑ Β των επαναληπτικών εξετάσεων Ημερησίου-Εσπερινού Λυκείου 2018)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η f είναι συνάρτηση «1-1»

Η f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x > 1$, ως ημίτιο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} > 0, \quad x > 1$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$, άρα και «1-1».

Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f που, επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{x} = e, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $(e, +\infty)$.

Γ2. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = x(x-2)f(a) + x(x-1)f^{-1}(a) + (x-1)(x-2)(\eta\mu\alpha - 2), \quad x \in [0, 2]$$

Η δοσμένη εξίσωση είναι ισοδύναμη:

$$\frac{f(a)}{x-1} + \frac{f^{-1}(a)}{x-2} + \frac{\eta\mu\alpha - 2}{x} = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0, \quad x \in (0, 1) \cup (1, 2)$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (ως πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού)
- ♦ $g(0) = 2\eta\mu\alpha - 2 = 2(\eta\mu\alpha - 1) < 0$ ($-1 < \eta\mu\alpha < 1, \alpha > e$)
- ♦ $g(1) = -f(a) < 0$ ($a > 1 \Leftrightarrow f(a) > e$)

Άρα η g έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$

Στο διάστημα $[1, 2]$ έχουμε:

- ♦ Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$ (ως πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού)
- ♦ $g(1) = -f(a) < 0$ ($a > 0 \Leftrightarrow 0 < f(a) < 1$)
- ♦ $g(2) = 2f^{-1}(a) > 0$ (αφού το σύνολο τιμών της f^{-1} είναι το $(1, +\infty)$).

Άρα η g έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. Επειδή η εξίσωση

$g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ είναι πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού θα έχει το πολύ 2 πραγματικές ρίζες.

Άρα η εξίσωση $g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ θα έχει ακριβώς 2 πραγματικές ρίζες, μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο διάστημα $(1, 2)$.

Σχόλιο: Ο βαθμός της πολυωνυμικής εξίσωσης $g(x) = 0, x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ είναι 2, διότι ο συντελεστής του x^2 είναι:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow (f(a) + f^{-1}(a) + (\eta\mu\alpha - 2))x^2 + (2f(a) - f^{-1}(a) - 3(\eta\mu\alpha - 2))x + 2\eta\mu(\alpha - 2) \text{ και } f(a) + f^{-1}(a) + \eta\mu\alpha - 2 > 0.$$

Γ3. Έχουμε διαδοχικά και ισοδύναμα:

$$f(x)+1 > e + \ln f(x) \Leftrightarrow e^{f(x)+1} > e^{e+\ln f(x)} \Leftrightarrow e^{f(x)} \cdot e > e^e \cdot e^{\ln f(x)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e \cdot e^{f(x)} > e^e f(x) \Leftrightarrow \frac{e^{f(x)}}{f(x)} > \frac{e^e}{e} \Leftrightarrow f(f(x)) > f(e) \Leftrightarrow f(x) > e \quad (f \nearrow)$$

Η τελευταία σχέση είναι αληθής και, ισοδύναμα, αποδείχθηκε το ζητούμενο.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, \pi]$ με: $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu x - 1, x \in [0, \pi]$.

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3}$$

Ο πίνακας προσήμου της f' δίνεται στον επόμενο πίνακα:

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		\nearrow	\searrow

(Το πρόσημο της f' βρίσκεται με την σκέψη ότι επειδή η f' είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ θα διατηρεί σταθερό πρόσημο μεταξύ των ριζών. Δίνοντας μια οποιαδήποτε τιμή μεταξύ των ριζών π.χ.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1 > 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 - 1 = -1 < 0$$

Δ2. Η f είναι δύο φορές με $f''(x) = -2\eta\mu x, x \in [0, \pi]$. Άρα η f είναι κοίλη στο διάστημα

$[0, \pi]$ και επομένως η γραφική της παράσταση θα βρίσκεται «πάνω» από την εφαπτομένη της στο σημείο A , εκτός του ίδιου του σημείου A . Άρα η εφαπτομένη και η γραφική παράσταση της f έχουν κοινό μόνο το σημείο A .

Δ3. $\int_0^\pi f(x)\sigma\upsilon\nu x dx = \int_0^\pi (2\eta\mu x - x)\sigma\upsilon\nu x dx = 2\int_0^\pi \eta\mu x\sigma\upsilon\nu x dx - \int_0^\pi x\sigma\upsilon\nu x dx = 2I - J$,

όπου $I = \int_0^\pi \eta\mu x\sigma\upsilon\nu x dx, J = \int_0^\pi x\sigma\upsilon\nu x dx$.

Για το I : Θέτουμε:

$$u = \eta\mu x \Rightarrow du = \sigma\upsilon\nu x$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$x = \pi \Rightarrow u = 0$$

και άρα $I = 0$. Για το J έχουμε:

$$J = \int_0^\pi x\sigma\upsilon\nu x dx = \int_0^\pi x(\eta\mu x)' dx = [x\eta\mu x]_0^\pi - \int_0^\pi \eta\mu x dx = 0 + [\sigma\upsilon\nu x]_0^\pi = -2$$

Άρα: $\int_0^\pi f(x) \cdot \sigma\upsilon\nu x dx = 2$

Δ4.

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\eta\mu x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \frac{\eta\mu x}{x} - 1 \right) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [(f(x) - f(2x)) \ln x] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(2x)}{x} x \ln x \right] \quad (1)$$

$$K = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(2x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} = 1 - 2 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$K = (-1) \cdot 0 = 0$$

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Σχολικό Βιβλίο Γ' Λυκείου: «Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» των Ανδρεαδάκη Σ., Κατσαργύρη Β, κ.α..
2. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα του Υπουργείου (study4exams.gr).
3. Δημήτρης Μπούζας, Χρήστος Λινζερίνος, Οδυσσέας Βέρρας, «Μαθηματικά για το τελευταίο θρανίο», maths4people.blogspot.gr.
4. Καραγιάννης Ιωάννης, «Διδακτική και Μεθοδολογία στα Ολοκληρώματα», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.
5. Μαθηματικός Περιηγητής (blogs.sch.gr/iokaragi).
6. Σημειώσεις Α. Ρουμελιώτη.
7. Καραγιάννης Ιωάννης, Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου, Αυτοέκδοση, Ρόδος 2016.
8. Καραγιάννης Ιωάννης, Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου, Αυτοέκδοση, Ρόδος 2017.
9. ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr), θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.