

## Κάβουρας ο ποτάμιος (*Potamon Potamios Rhodium Parisi*)

Είναι κάβουρας του **γλυκού νερού** με καφέ χρωματισμούς. Το κέλυφός του είναι λείο, λαμπερό και τόσο σκληρό που αποτελεί πραγματική θωράκιση. Οι ενήλικες το αλλάζουν μια φορά το χρόνο κατά τη διαδικασία της έκδυσης ώστε το νέο κέλυφος να προσαρμόζεται στο εκάστοτε αναπτυγμένο σώμα του.

Απαντάται στη Μεσόγειο, Κασπία και Μαύρη θάλασσα, σε νησιά του Αιγαίου (Κρήτη, Νάξο, Κάρπαθο, Σάμο, Ικαρία, Κω, Ρόδο), Ιορδανία, Τουρκία, Συρία, Ισραήλ και στην Κύπρο. Μπορεί κανείς να τον συναντήσει κοντά σε ρυάκια, λίμνες, ποτάμια και γενικά σε βρεγμένο έδαφος κοντά σε νερό. Μπορεί ακόμα να βρεθεί κοντά σε συστήματα άρδευσης ή σε πισίνες.

Στο νησί της Ρόδου τον συναντάμε κυρίως στην κοιλάδα των πεταλούδων με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, **στην πλάτη του υπάρχει ένα σχήμα το οποίο μοιάζει με πεταλούδα**



Αυτό το είδος **τρέφεται με μικρά μαλάκια, νεκρά ψάρια, σκουλήκια, σαλιγκάρια και φύκια**. Η αναπαραγωγή του γίνεται την άνοιξη όταν η θερμοκρασία του νερού ξεπερνά τους +18 °C. Η επώαση μπορεί να διαρκέσει από 20 μέχρι 30 ημέρες.

Ωστόσο, αυτά τα καβούρια έχουν εξαφανιστεί από πολλά μέρη πιθανόν ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης του DDT και άλλων εντομοκτόνων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά της ελονοσίας στα παλαιότερα χρόνια. Επίσης απειλούνται από τη ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα, από την αποψίλωση των δασών και την απώλεια νερού στους οικισμούς του λόγω ξηρασίας. Παράλληλα κάποιοι άλλοι εχθροί του είναι τα κοράκια, οι σκαντζόχοιροι, οι κίτσες ή και τα μεγάλα ψάρια όπως είναι οι πέστροφες.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης, ο κάβουρας ο ποτάμιος κατατάσσεται στα **σχεδόν απειλούμενα είδη**, διότι οι πληθυσμοί του, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές όπως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στη νότια Τουρκία και στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζουν πιθανόν κίνδυνο εξαφάνισής στο μέλλον.



**Potamon Potamios Rhodium Parisi**