

**ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**

**2<sup>ο</sup> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) - ΘΕΜΑΤΑ**

**ΘΕΜΑ Α**

**Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.**

- A1.** Ένα σύστημα μάζας ελατηρίου εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και ολικής ενέργειας Ε. Για να διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης του σώματος, θα πρέπει να προσφέρουμε στο σύστημα επιπλέον ενέργεια
- α.** Ε.
  - β.** 2Ε.
  - γ.** 3Ε.
  - δ.** 4Ε.
- A2.** Ένα σύστημα μάζας ελατηρίου εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται το σύστημα θα μεταβληθεί αν μεταβάλλουμε
- α.** τη μάζα του σώματος.
  - β.** τη σταθερά απόσβεσης b.
  - γ.** τη σταθερά του ελατηρίου.
  - δ.** τη συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναμης.
- A3.** Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του είναι μέγιστος σε απόλυτη τιμή όταν
- α.** η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος είναι μηδέν.
  - β.** η ορμή του σώματος είναι μηδέν.
  - γ.** η δύναμη επαναφοράς που δέχεται το σώμα είναι μηδέν.
  - δ.** η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη.
- A4.** Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
- α.** για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, η περίοδος μειώνεται σε σχέση με το χρόνο.
  - β.** η κίνηση γίνεται απεριοδική για πολύ μικρές τιμές της σταθεράς απόσβεσης b.
  - γ.** όταν η σταθερά απόσβεσης μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα.
  - δ.** η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται μόνο από το σχήμα του σώματος που ταλαντώνεται.

**A5.** Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη **Σωστό**, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη **Λάθος**, για τη λανθασμένη.

- A.** Στην απλή αρμονική ταλάντωση, η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος της.
- B.** Στα εκκρεμή ρολόγια θέλουμε πολύ μικρή σταθερά απόσβεσης b.
- Γ.** Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται μόνο στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
- Δ.** Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο.
- Ε.** Σε όλες τις φθίνουσες ταλαντώσεις, το πλάτος μειώνεται εκθετικά σε σχέση με το χρόνο.

(Μονάδες 25)

## ΘΕΜΑ Β

**B1.** Ένα σώμα  $\Sigma_1$  μάζας  $m_1$  είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  $k$  και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους  $A$  σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν το  $\Sigma_1$  διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα  $\Sigma_2$  μάζας  $m_2$ . Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση είναι ίση με το  $\frac{1}{4}$  της ενέργειας της ταλάντωσης του  $\Sigma_1$  πριν την κρούση, τότε ο λόγος  $m_1/m_2$  των μαζών των δύο σωμάτων είναι ίσος με

a. 3.

b. 1/3.

γ. 1.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(Μονάδες 7)

**B2.** Το σύστημα του σχήματος περιλαμβάνει τα δύο σώματα  $\Sigma_1$  και  $\Sigma_2$ , με μάζες  $m_1$  και  $m_2$  αντίστοιχα τα οποία είναι δεμένα στις ελεύθερες άκρες των ιδανικών ελατηρίων που έχουν σταθερές  $k_1$  και  $k_2$ , όπου  $k_2=2k_1$ . Οι άλλες άκρες των ελατηρίων είναι δεμένες ακλόνητα σε κατακόρυφους τοίχους, ενώ τα σώματα  $\Sigma_1$ ,  $\Sigma_2$ , είναι δεμένα μεταξύ τους με αβαρές και μη εκτατό νήμα με τα ελατήρια να είναι επιμηκυμένα και το όλο σύστημα να ισορροπεί.



Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και τα σώματα εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Το πηλίκο της μέγιστης κινητικής ενέργειας του  $\Sigma_1$  προς τη μέγιστη κινητική ενέργεια του  $\Sigma_2$ ,  $\frac{K_{max1}}{K_{max2}}$ , είναι ίσο με

α. 2 .

β.  $\frac{1}{2}$

γ. 4.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(Μονάδες 6)

**B3.** Τα ελατήρια των δύο ταλαντωτών A και B του σχήματος έχουν ίδιο φυσικό μήκος και σταθερές που συνδέονται με τη σχέση  $k_A=2k_B$ . Τα σώματα που κρέμονται από τα ελατήρια είναι ίδια. Φέρνουμε τα σώματα στη θέση που τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος και τα αφήνουμε ελεύθερα να εκτελέσουν κατακόρυφη ταλάντωση. Λόγω των τριβών, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα σώματα θα σταματήσουν να ταλαντώνονται. Αν η θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων του σώματος A είναι  $2J$  η θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων του σώματος B είναι


α. 1J

β. 2J

γ. 4J



Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.


Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.




**B4.** Ένα σύστημα μάζας - ελατηρίου ( $m=1\text{kg}$ ,  $k=400\text{N/m}$ ) εκτελεί κατακόρυφη εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη βοήθεια ενός περιστρεφόμενου δίσκου (διεγέρτη). Το διάγραμμα απομάκρυνσης - χρόνου δείχνεται στο διπλανό σχήμα.

Αντικαθιστούμε το σώμα με άλλο τετραπλάσιας μάζας και θέτουμε το σύστημα σε νέα εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς να μεταβάλλουμε τη συχνότητα του διεγέρτη. Θεωρούμε ότι στις δύο καμπύλες συντονισμού τα μέγιστα πλάτη έχουν την ίδια τιμή. Το διάγραμμα απομάκρυνσης χρόνου για τη νέα ταλάντωση μπορεί να είναι το






(I)



(II)



(III)

a. (I)

β. (II)

γ. (III)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(Μονάδες 6)

### ΘΕΜΑ Γ

Ένα σώμα μάζας  $m=2\text{kg}$  εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η δύναμη επαναφοράς που του ασκείται, μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση

$$\Sigma F = -40 \eta m \omega t \quad (\text{SI})$$

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων του σώματος από τη θέση ισορροπίας του είναι  $\Delta t = (\pi/10)\text{s}$ .

Γ1. Να βρείτε πόσο απέχουν μεταξύ τους οι ακραίες θέσεις της ταλάντωσης του σώματος.  
 (Μονάδες 6)

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της δύναμης επαναφοράς σε συνάρτηση με την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του σε αριθμημένους άξονες.  
 (Μονάδες 6)

Γ3. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση καθώς και το διάστημα που διένυσε το σώμα στο χρονικό διάστημα από τη στιγμή  $t_1=0$ , έως τη χρονική στιγμή  $t_2=(5\pi/60)\text{s}$ .  
 (Μονάδες 6)

Γ4. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος τη χρονική στιγμή που το σώμα διέρχεται από τη θέση  $x=+A/2$ , όπου  $A$  είναι το πλάτος της ταλάντωσης και επιταχύνεται. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.  
 (Μονάδες 7)

## ΘΕΜΑ Δ

Στην ελεύθερη άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  $k=100\text{N/m}$ , του οποίου η άλλη άκρη είναι στερεωμένη σε οροφή, δένουμε σώμα  $\Sigma_1$  μάζας  $m_1=2\text{kg}$  και το αφήνουμε να ισορροπήσει. Σε κατακόρυφη απόσταση  $h=4,4\text{m}$  κάτω από το σώμα  $\Sigma_1$  βρίσκεται σώμα  $\Sigma_2$  μάζας  $m_2=2\text{kg}$  το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε το σώμα  $\Sigma_2$  κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου  $u_0$  και όταν φτάσει στο  $\Sigma_1$  συγκρούεται πλαστικά με αυτό. Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται μετά την κρούση, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους  $0,4\text{m}$ .

**Δ1.** Να βρείτε πόσες φορές μηδενίζεται η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου σε κάθε περίοδο της ταλάντωσης. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 6)

**Δ2.** Να βρείτε την αρχική ταχύτητα  $u_0$  του σώματος  $\Sigma_2$ .

(Μονάδες 8)

**Δ3.** Να βρείτε την ορμή του συσσωματώματος όταν αυτό διέρχεται από τη θέση που έγινε η πλαστική κρούση για δεύτερη φορά, θεωρώντας τα θετικά προς τα πάνω.


(Μονάδες 5)

**Δ4.** Να γράψετε την εξίσωση της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου σε συνάρτηση με την απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε αριθμημένους άξονες.

(Μονάδες 6)

Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας  $g=10\text{m/s}^2$ .

---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----



Τα θέματα επιμελήθηκαν οι **Ιστάπολος Βασίλειος** και **Ποντικός Ηλίας**, **Φυσικοί**.

Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον **Παλόγο Αντώνιο**, **Φυσικό**.