


Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από μόλυβδο παρουσιάζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα του μολύβδου στο αίμα.

Συμπτώματα από την τοξική επίδραση του Μολύβδου	
Χαμηλό επίπεδο	Υψηλό επίπεδο
Ελλειμματική προσοχή	Πόνος στην κοιλιά
Προβλήματα συμπεριφοράς	Πονοκέφαλος
Μαθησιακές δυσκολίες	Σύγχυση
Μείωση του δείκτη νοημοσύνης	Εμετό
	Μυϊκή αδυναμία
	Σπασμοί
	Θάνατος

Ακτινογραφία με χαρακτηριστικό εύρημα της δηλητηρίασης από μόλυβδο. Παρουσία γραμμών αυξημένης πυκνότητας κατά την μετάφυση των οστών στα μικρά παιδιά.



Απεικόνιση εγκεφάλων ενηλίκων που εκτέθηκαν σε μόλυβδο. Απώλεια περιοχών με το χρώμα πάνω από ένα πρότυπο φυσιολογικού εγκεφάλου



- Η έκθεση στο μόλυβδο συσχετίζεται με [υψηλή αρτηριακή πίεση](#) , [στεφανιαία καρδιακή νόσο](#) , [μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού](#) , και θάνατο από [εγκεφαλικό επεισόδιο](#) . Αυτό προκύπτει και από μελέτες . Είναι δυνατόν ο μόλυβδος να υπάρχει σε μορφή σκόνης στον αέρα. Ειδικότερα κατά τις μέρες [που το όζον](#) και τα αιωρούμενα σωματίδια είναι σε υψηλό επίπεδο ρύπανσης, έχουμε μία απότομη αύξηση των καρδιοπάθειων και των εγκεφαλικών. **Σαχινίδης Συμεών**

Σαχινίδης Συμεών Δες παραπομπή