

6.3.3 Φροντίδες διατροφής, βόσκηση και ανάγκες σε νερό

(1) Φροντίδες διατροφής

Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για τη διατροφή τους. **Στις ομάδες με υψηλή παραγωγή τα μισά τουλάχιστο ζώα θα πρέπει να μπορούν να τρέφονται την ίδια στιγμή.** Το κλειδί είναι να παρακολουθούνται οι αγελάδες την ώρα της διατροφής. Εάν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες διατροφής δεν είναι οι άριστες. Επίσης, καλό είναι οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής να χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την γαλακτοπαραγωγή τους.

Για να καταναλώνουν οι αγελάδες όσο το δυνατόν περισσότερη τροφή, ιδίως την περίοδο της υψηλής γαλακτοπαραγωγής, θα πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα από και προς τις εγκαταστάσεις διατροφής τους. Υπερβολική κοπριά, νερό, πάγος, σκουπίδια κτλ. δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την κίνησή τους. Στόχος για τα πολύ παραγωγικά ζώα είναι να καταναλώνουν έστω και λίγο περισσότερη τροφή από το κανονικό.

Με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τροφοδοσίας οι αγελάδες καταναλώνουν την ποσότητα του μίγματος που τους αναλογεί με πολλά και μικρά γεύματα καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, γεγονός που βοηθά τη σωστότερη διατροφή τους. Όμως, τα συστήματα αυτά κοστίζουν πολύ και η χρήση τους απαιτεί εξειδίκευση.



Εικόνα 6.23: Τροφοδοσία βοοειδών

Επίσης, δεδομένου ότι **το γάλα αποτελείται κατά 87% από νερό** θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ποτιστρών (κατά μέσο όρο μια ποτίστρα ανά 20 αγελάδες) στα σημεία διατροφής και στην είσοδο του αρμεκτήριου.

Στη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σιτηρέσια με ποικίλη περιεκτικότητα σε χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές. Τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα σε αγελάδες μεγάλων αποδόσεων χορηγούνται με μορφή σκευασμάτων. Το