



То диаграмма $i=f(V)$ σто фотолектрико φαινόμενο

Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα της έντασης του ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση μεταξύ ανόδου-καθόδου σε ένα φωτοκύτταρο, όπου φωτίζουμε την κάθοδο με την βοήθεια μιας λάμπας A, η οποία τοποθετείται σε απόσταση d.

- i) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δίνει την μορφή της καμπύλης (κόκκινη γραμμή), στην περίπτωση που πλησιάσουμε την λάμπα σε απόσταση $d_1 < d$;



- ii) Απομακρύνουμε την λάμπα φωτισμού σε απόσταση $d_2 > d$. Να χαράξετε πάνω στο αρχικό διάγραμμα, την νέα καμπύλη $i=f(V)$.
- iii) Αλλάζουμε λάμπα φωτισμού πλησιάζοντας σε απόσταση d, μια άλλη B η οποία εκπέμπει σε μικρότερα μήκη κύματος, στέλνοντας στην κάθοδο, τον ίδιο αριθμό φωτονίων, με την A. Ποια θα είναι τώρα η μορφή της καμπύλης $i=f(V)$. Η νέα καμπύλη να χαραχθεί πάνω στο αρχικό διάγραμμα.
- iv) Ποια η αντίστοιχη καμπύλη αν η λάμπα B εξέπεμπε ακτινοβολία της ίδιας έντασης με την αρχική λάμπα A;

Θεωρούμε ότι ο αριθμός των εξερχομένων φωτολεκτρονίων είναι ίσος με ένα σταθερό ποσοστό του αριθμού των φωτονίων, τα οποία προσπίπτουν στην κάθοδο.


Апантенс:

- i) Η τάση αποκοπής είναι ίση με 1V (η διαφορά δυναμικού ανόδου-καθόδου είναι ίση με -1V). Άλλα τότε από την φωτολεκτρική εξίσωση του Einstein παίρνουμε:

$$K_{max} = hf - \varphi \rightarrow q_e V_a = hf - \varphi$$

Άλλα αν έχουμε μια λάμπα που εκπέμπει φως με διαφορετικές συχνότητες, η μεγαλύτερη συχνότητα θα καθορίσει και την τάση αποκοπής. Και αν δεν αλλάξει η λάμπα, δεν θα αλλάξει και η τάση αποκοπής η οποία θα παραμείνει στην τιμή $V_o=1V$. Τι συμβαίνει όμως με το πλησίασμα της λάμπας;

Έστω μια φωτεινή πηγή Λ , ας την θεωρήσουμε αμελητέων διαστάσεων, η οποία εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με ισχύ P. Τότε παίρνοντας μια σφαίρα με




көнтрө тην πηγή και ακτίνα R, στην επιφάνειά της θα φτάνει ενέργεια W=Pt, іση με αυτήν που εκπέμπει η πηγή, οπότε η ένταση της ακτινοβολίας στην επιφάνειά της, θα είναι ίση:

$$I = \frac{W}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi R^2}$$

Аφού η επιφάνεια της σφαίρας έχει εμβαδόν $4\pi R^2$.


Βλέπουμε δηλαδή ότι η ένταση της ακτινοβολίας είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της απόστασης της πηγής από την επιφάνεια πρόσπτωσης.

Αλλά τότε πλησιάζοντας την λάμπα στην κάθοδο, αυξάνουμε την ένταση της ακτινοβολίας, στην κάθοδο προσπίπτουν περισσότερα φωτόνια, συνεπώς θα ελευθερώνονται και περισσότερα ηλεκτρόνια και θα αυξάνεται η ένταση του ρεύματος.




Σύμφωνα με όλα αυτά, το σωστό διάγραμμα είναι το (β), όπως στο διπλανό σχήμα.

- ii) Με βάση τα παραπάνω, απομακρύνοντας την λάμπα από το φωτοκύτταρο, δεν θα αλλάξει η τάση αποκοπής, αλλά θα μειωθεί η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και η καμπύλη θα πάρει τη μορφή του διπλανού σχήματος, με πράσινο χρώμα.



- iii) Αφού όταν φωτίζεται η κάθοδος από την λάμπα B, δέχεται τον ίδιο αριθμό φωτονίων με πριν, θα εξέρχονται και ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων (ένα ποσοστό των φωτονίων που προσπίπτουν θα απορροφηθούν από ηλεκτρόνια, τα οποία θα εξέλθουν της επιφάνειας), συνεπώς και θα έχουμε την ίδια μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος. Όμως τώρα η λάμπα B εκπέμπει σε μικρότερα μήκη κύματος, συνεπώς τα φωτόνια θα μεταφέρουν μεγαλύτερη ενέργεια από τα αντίστοιχα της A λάμπας, με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται να έχουν μεγαλύτερες κινητικές ενέργειες και άρα μεγαλύτερη K_{max} άρα και πιο «μεγάλη» τάση αποκοπής, αφού:



$$q_e V_a = hf - \varphi$$


Έτσι το διάγραμμα παίρνει την μορφή του διπλανού σχήματος.

- iv) Αν η λάμπα B εξέπεμπε ακτινοβολία της ίδιας έντασης, αλλά με μεγαλύτερες συχνότητες, τότε στην κάθοδο θα έφταναν λιγότερα φωτόνια. Πράγματι για την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην κάθοδο (ας την πάρουμε ως μονοχρωματική...) θα έχουμε:

$$W_k = I \cdot A = \frac{W_A}{4\pi R^2} \cdot A = \frac{N \cdot hf}{4\pi R^2} \cdot A$$

Όπου I η ένταση της ακτινοβολίας που πέφτει στην κάθοδο η οποία έχει εμβαδόν A, W_A η συνολική ενέργεια που ακτινοβολεί η λάμπα και N ο αριθμός των φωτονίων που εκπέμπονται.


Прáгma πou σημαίνει ότι για την ίδia ένταση, όσo μεγαλύterη eίnai η συχνότηta, tóso μikrótēros ariθmós (N) φωτονίow απαιτούntai γιa τηn δiádosiη tηs εnέrgyiaς autήs. Katá sūnepetia θa eξéρχetai apó tηn káthodo kai enaç μikrótēros ariθmós ηlektroñiow, me apotélesma na eχoumē kai μikrótērē mēgistē έnτasē rēumatoç, (rēumatoç kórou). Antítheteta η tásē apokopήs θa eίnai idia me autήn tου proiøgoýmenou erøtēmatos.



Me βáσiη autá η kampúlē pāirnei tē mōrphē tōu díplanoú s̄chymatoç.

Σxόlio γia κaθyηtēs:

H pārapánō θeωrηtikή meléte, p̄oblēpeι óti η éntasē tōu rēumatoç m̄hdeñzetai γia tásēis m̄ikrótēres apó -1V enó statheroptoiéitai se mia mēgistē έntasē (rēuma kórou). Stηn p̄raγmatikótēta mia peiramatikή meléte, maç dínei tē kampúlē me tēn mōrphē tōu díplanoú s̄chymatoç, ópoū oúte tō rēuma kórou statheroptoiéitai, oúte m̄hdeñzetai γia tásēis V < -1V.



Aξízei na epis̄ymañthei óti stiç arnētikēs tásēis tōn rōlo tēs «kaθódou» p̄aízei η ánodos η opoía kai autή φotízetai, me apotélesma na ekpémpet φototelktrónia enó tauñórona eχoumē kai rēumata ñiaffroñs πou auñánonata me tēn aúñhstē tēs tásēs.

Үлкін Физика-Хемия

Гiaτi to na m̄oqâzetai p̄ođymata, eίnai kało γia ñlouñs...

Epiméleia:

[Aionúsñs Márγapñs](#)